

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)  
考前压轴密卷**

**内科护理学**

**模拟试卷(二)**

金英杰国家医学考试研究中心 编



## 答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

## 模拟试卷(二)

### 基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 肝门静脉压力增高时,下列病理变化中最早出现的是
  - 腹水
  - 充血性脾大
  - 上消化道出血
  - 食管胃底静脉曲张
  - 腹壁静脉怒张
- 属于手术室限制区的是
  - 走廊
  - 更衣室
  - 手术间及刷手间
  - 休息室
  - 敷料准备间
- 肛裂好发生于膝胸位时的
  - 12 点处
  - 8 点处
  - 10 点处
  - 4 点处
  - 3 点和 6 点处
- 在普查和诊断肺癌时,下列检查占重要地位的是
  - 肺功能检查
  - 胸部 X 线摄片检查
  - 痰细胞学检查
  - 纤维支气管镜检查
  - 胸腔积液检查
- 胎盘早剥的病因除外
  - 妊娠高血压综合征
  - 外伤
  - 肾炎
  - 母体有血管病变
  - 胎膜早破
- 肿瘤转移途径最常见的是
  - 直接蔓延
  - 跳跃性转移
  - 血行转移
  - 种植性转移
  - 淋巴道转移
- 股骨下 1/3 骨折,易造成
  - 股动脉损伤
  - 腓动脉损伤
  - 皮神经损伤
  - 肱静脉损伤
  - 坐骨神经损伤
- 阴道毛滴虫最适合的生长环境 pH 为
  - 2~3.5
  - 3.6~4.2
  - 4.3~5.2
  - 5.5~6
  - 6.3~6.8
- 导致产后出血原因中最常见的是
  - 胎盘残留
  - 胎盘嵌顿
  - 软产道损伤
  - 血友病
  - 子宫收缩乏力
- 外科最常见的脱水类型是
  - 原发性脱水
  - 慢性脱水
  - 高渗性脱水

- D.低渗性脱水  
E.等渗性脱水
- 11.胃癌的转移途径中主要是
- A.直接浸润  
B.淋巴转移  
C.血行转移  
D.腹腔种植  
E.肝肾转移
- 12.可以反映心脏后负荷的指标是
- A.血压  
B.脉搏  
C.中心静脉压  
D.肺动脉楔压  
E.周围血管阻力
- 13.阻塞性肺气肿的病理分型按累及肺小叶的部位,可分为
- A.小叶中央型、气肿型、混合型  
B.小叶中央型、气肿型、全小叶型  
C.小叶中央型、全小叶型、混合型  
D.气肿型、全小叶型、混合型  
E.全小叶型、气肿型、支气管炎型
- 14.病毒性脑炎最常见的病原体是
- A.肠道病毒  
B.科萨奇病毒  
C.EB病毒  
D.腺病毒  
E.疱疹病毒
- 15.临床最主要导致新生儿颅内出血的原因是
- A.窒息、产伤  
B.脑血管先天畸形  
C.脑膜炎  
D.血友病  
E.输注高渗液体
- 16.以下疾病可表现为前囟早闭或过小的是
- A.佝偻病  
B.小头畸形  
C.呆小病  
D.早熟  
E.脑肿瘤
- 17.乳牙出齐的年龄一般在
- A.10~12个月  
B.12~18个月  
C.20~24个月  
D.2~2.5岁  
E.3~3.5岁
- 18.最严重的肾损伤类型是
- A.肾挫伤  
B.肾盂部分裂伤  
C.肾实质部分裂伤  
D.肾横断  
E.肾蒂损伤
- 19.微循环的灌注状态取决于
- A.心功能、血容量、血压  
B.心功能、周围血管张力、脉压  
C.血容量、血压、周围血管张力  
D.心功能、血容量、周围血管张力  
E.血容量、脉压、周围血管张力
- 20.每人每天需要氨基酸的量是
- A.0.6~1.0 g/(kg·d)  
B.1.0~1.5 g/(kg·d)  
C.1.3~1.8 g/(kg·d)  
D.2.0~2.5 g/(kg·d)  
E.2.6~3.0 g/(kg·d)
- 21.确诊恶性肿瘤最可靠的方法是
- A.血清酶学检查  
B.CT  
C.MRI  
D.病理检查  
E.X线造影
- 22.确诊菌血症的可靠证据是
- A.表现脉搏、呼吸快,体温高  
B.神志淡漠、嗜睡  
C.出现黄疸、皮下淤血  
D.肝、脾大  
E.血细菌培养阳性
- 23.成年人体液量约占体重的

- A.35%  
B.45%  
C.50%  
D.60%  
E.65%
- 24.丹毒指的是  
A.急性管状淋巴管炎  
B.急性网状淋巴管炎  
C.疖病  
D.淋巴结炎  
E.痈
- 25.肠套叠病人特征性 X 线表现为  
A.杯口状阴影  
B.鸟嘴状阴影  
C.立位 X 线片见多个气-液平面  
D.鱼肋骨刺征  
E.充盈缺损
- 26.正常 5 个月小儿的体重是出生体重的  
A.1.5 倍  
B.2 倍  
C.3 倍  
D.3.5 倍  
E.5 倍
- 27.输卵管通液检查的禁忌情况是  
A.月经干净 5 天  
B.术前体温 36.8 °C  
C.阴道炎治疗中  
D.婚后 2 年不孕  
E.脂肪瘤
- 28.暴发性脑膜炎的病原体是  
A.大肠埃希菌  
B.肺炎链球菌  
C.金黄色葡萄球菌  
D.流感嗜血杆菌  
E.脑膜炎双球菌
- 29.急性心肌梗死临床上特征性的心电图改变是  
A.ST 段弓背向上抬高  
B.ST 段弓背向下  
C.高大的 R 波  
D.ST 段水平下移  
E.T 波倒置
- 30.与慢性胃炎发病有关的细菌为  
A.大肠埃希菌  
B.沙门球菌  
C.空肠弯曲菌  
D.幽门螺杆菌  
E.嗜盐杆菌
- 31.胃壁细胞的功能是分泌  
A.盐酸  
B.胃蛋白酶  
C.血清促胃液素  
D.胃泌素  
E.雌激素
- 32.出生时存在但 3~4 个月后消失的反射是  
A.拥抱反射  
B.喉反射  
C.腹壁反射  
D.角膜反射  
E.吞咽反射
- 33.引起新生儿颅内出血的病因除外  
A.产伤  
B.臀位产  
C.滴注高渗性溶液  
D.新生儿窒息  
E.妊娠早期母患风疹
- 34.易导致枕骨大孔疝的是  
A.小脑蚓部  
B.小脑扁桃体  
C.大脑颞叶  
D.下丘脑  
E.小脑绒球小结叶
- 35.导致前列腺增生的主要原因是  
A.慢性咳嗽  
B.雌激素和雄激素水平失调  
C.膀胱结石

- D.老龄化  
E.雄激素增多
- 36.下列最常引起心搏、呼吸骤停的是  
A.感染  
B.冠心病  
C.颅内高压  
D.麻醉  
E.溺水
- 37.妊娠期母体心脏负荷最重的时间是妊娠  
A.24~28周  
B.30~32周  
C.32~34周  
D.34~36周  
E.36~40周
- 38.习惯性流产定义为  
A.连续2次流产  
B.连续2次自然流产  
C.连续3次流产  
D.连续3次自然流产  
E.连续3次人工流产
- 39.CO中毒时最先受损的器官是  
A.肝  
B.肺部  
C.胃肠道  
D.肾  
E.心、脑
- 40.导致心肌炎最主要的病原体是  
A.病毒  
B.细菌  
C.药物中毒  
D.螺旋体  
E.寄生虫
- 41.法洛四联症患者,2岁,喜蹲踞,其原理是  
A.保证重要器官供血  
B.缓解腹部不适  
C.腔静脉回心血量增加  
D.休息,缓解疲劳  
E.增加体循环阻力,减少右向左分流血量
- 42.肝硬化腹水的性质是  
A.渗出液  
B.漏出液  
C.乳糜液  
D.黏液性  
E.血性液
- 43.我国产妇死亡第一位的原因是  
A.妊娠合并心脏病  
B.产后出血  
C.羊水栓塞  
D.产褥感染  
E.妊娠期高血压疾病
- 44.细菌引发细菌性肝脓肿的最主要入侵途径是  
A.胆道系统  
B.肝动脉  
C.门静脉系统  
D.淋巴系统  
E.直接入侵
- 45.发生急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是  
A.肿大胆囊压迫胆总管  
B.胆总管狭窄  
C.胆总管结石  
D.胆总管肿瘤合并梗阻  
E.肝脓肿并发出血,阻塞胆管
- 46.引起颅内压增高的主要原因  
A.颅内、外感染  
B.颅内占位性病变  
C.颅外占位性病变  
D.脑缺血缺氧  
E.脑脊液循环异常
- 47.胸膜腔内的压力为负压,其生理意义正确的是  
A.组成肺的弹性回缩力  
B.使肺维持扩张状态  
C.降低肺泡表面张力

- D.维持肺泡稳定性  
E.不能促进淋巴液的回流
- 48.典型的苯丙酮尿症是因肝脏缺乏
- A.苯丙氨酸羟化酶  
B.酪氨酸羟化酶  
C.谷氨酸羟化酶  
D.二氢生物蝶呤合成酶  
E.羟苯丙酮酸氧化酶
- 49.慢性阻塞性肺气肿患者不会出现的体征是
- A.胸廓呈桶状  
B.呼吸运动减弱  
C.两肺语颤增强  
D.双肺叩诊过清音  
E.两肺肺泡呼吸音减弱
- 50.引起新生儿窒息的因素不包括
- A.母亲患糖尿病  
B.急产  
C.脐带绕颈  
D.早产儿  
E.胎粪吸入
- 51.引起早产儿发生新生儿颅内出血的主要原因是
- A.缺氧  
B.产伤  
C.过快输入高渗液体  
D.机械通气不当  
E.脑血管畸形
- 52.慢性呼吸系统疾病发生急性呼吸衰竭最常见的诱因是
- A.呼吸道感染  
B.吸烟  
C.剧烈活动  
D.电解质紊乱  
E.营养不良
- 53.符合产后循环系统变化特征的是
- A.循环血容量于产后3天恢复至未孕状态  
B.血小板数量减少  
C.红细胞计数和血红蛋白值变化不大  
D.白细胞于产褥早期较高  
E.血液处于低凝状态,易出血
- 54.阑尾炎直接蔓延可引起急性盆腔炎,其主要病原体是
- A.淋病奈瑟菌  
B.支原体  
C.链球菌  
D.结核杆菌  
E.大肠埃希菌
- 55.子宫脱垂的主要病因是
- A.营养不良  
B.盆底组织先天发育不良  
C.长期站立工作  
D.便秘或长期咳嗽等致腹压增力  
E.分娩损伤
- 56.子宫颈癌普查常用的检查方法是
- A.阴道镜检查  
B.宫颈脱落细胞学检查  
C.宫颈活组织检查  
D.诊断性刮宫  
E.女性激素测定
- 57.判断心肌梗死最具敏感性和特异性的生化指标是
- A.肌钙蛋白  
B.酸激酶  
C.肌酸激酶同工酶  
D.C反应蛋白  
E.中性粒细胞
- 58.非特异性感染病理改变不包括
- A.炎症介质、细胞因子释放  
B.血管通透性增加  
C.血浆成分渗出  
D.干酪样坏死  
E.转为慢性炎症
- 59.不属于闭合性单根单处肋骨骨折治疗原则的是
- A.手术治疗  
B.对症止痛

- C.固定胸廓  
 D.防止并发症  
 E.鼓励患者咳嗽咳痰
- 60.急性心肌梗死最基本的病因是  
 A.体力活动  
 B.情绪激动  
 C.血压剧升  
 D.冠状动脉张力增高  
 E.冠状动脉粥样硬化
- 61.慢性浅表性胃炎的最主要病因是  
 A.幽门螺杆菌感染  
 B.自身免疫  
 C.饮食和环境因素  
 D.十二指肠液反流  
 E.长期食用刺激性食物和药物
- 62.符合铁代谢特征的是  
 A.缺铁时正常肠黏膜对铁吸收减少  
 B.铁主要在回肠吸收  
 C.在肠黏膜内能合成铁蛋白  
 D.人体所需铁完全依靠从食物中摄取  
 E.血清铁一般是亚铁离子
- 63.急性白血病出血的主要原因是  
 A.弥散性血管内凝血  
 B.血小板数量减少  
 C.血小板功能异常  
 D.凝血因子减少  
 E.血管损伤
- 64.不符合糖尿病临床特征的是  
 A.糖尿病是一组常见的内分泌代谢疾病  
 B.糖尿病是由多种原因导致的,绝对或相对胰岛素分泌不足或作用的缺陷而引起的代谢紊乱  
 C.糖尿病特征为高血糖、糖尿、葡萄糖耐量降低及胰岛素释放试验异常  
 D.糖尿病可引起糖、蛋白质、脂肪、水及电解质等代谢紊乱  
 E.糖尿病是一种遗传病
- 65.与宫缩乏力导致的产后出血无关的因素是  
 A.巨大儿  
 B.双胞胎妊娠  
 C.胎膜早破  
 D.羊水过多  
 E.产程延长
- 66.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性  
 A.不变  
 B.升至正常人的70%以上  
 C.降至正常人的70%以下  
 D.升至正常人的90%以上  
 E.降至正常人的90%以下
- 67.微生态失衡会引起  
 A.自身和交叉感染  
 B.菌群失调和移位  
 C.定植抵抗力提高  
 D.内源性和外源性感染  
 E.非特异性免疫功能增强
- 68.不符合内脏性疼痛临床特点的是  
 A.疼痛过程缓慢、持续  
 B.痛感弥散,定位不准确  
 C.痛觉迟钝,对刺、割、灼等刺激不敏感  
 D.感觉敏锐,定位准确  
 E.对较强的张力及缺血、炎症等刺激较敏感
- 69.下肢深静脉血栓形成的原因之一是  
 A.吸烟  
 B.静脉腔狭窄  
 C.静脉内膜损伤  
 D.长久站立  
 E.大隐静脉曲张
- 70.良性前列腺增生好发于  
 A.外周区  
 B.移行区  
 C.中央区  
 D.纤维区  
 E.基质区
- 71.骨折早期并发症不包括



- A. 血管损伤  
B. 内脏损伤  
C. 脂肪栓塞  
D. 畸形愈合  
E. 神经损伤
72. 正常成人颅内压的范围是  
A. 20~30 mmH<sub>2</sub>O  
B. 50~100 mmH<sub>2</sub>O  
C. 70~200 mmH<sub>2</sub>O  
D. 80~200 mmH<sub>2</sub>O  
E. 100~220 mmH<sub>2</sub>O
73. 供移植器官的保存原则是  
A. 常温保存  
B. 低温原则  
C. 延长热缺血时间  
D. 变冷缺血为热缺血  
E. 中断血流后不应立即降温
74. 新生儿低血糖的病因中属于葡萄糖消耗增加的是  
A. 早产儿  
B. Rh 溶血病患儿  
C. 小于胎龄儿  
D. 败血症患儿  
E. 先天性心脏病患儿
75. 猩红热的主要传染源是  
A. 患者及带菌者  
B. 恢复期患者  
C. 链球菌携带者  
D. 家畜  
E. 蚊蝇
76. 中毒性痢疾多见于  
A. 新生儿  
B. 婴幼儿  
C. 儿童  
D. 青年  
E. 成人
77. 卵子排出后如未受精, 黄体开始萎缩的时间是  
A. 排卵后第 24 小时  
B. 排卵后第 7 日  
C. 排卵后 9~10 日  
D. 排卵后 14 日  
E. 下次月经来潮前
78. 符合产后泌乳特征的是  
A. 雌激素是产后泌乳的基础  
B. 产后雄激素水平急剧下降, 解除了对垂体催乳素的抑制作用  
C. 雌磁素有抑制垂体催乳素对乳腺的发育作用  
D. 乳汁的分泌很大程度上取决于哺乳时的吸吮刺激  
E. 吸吮动作可以反射性地引起腺垂体释放缩宫素, 促进乳汁排出
79. 软产道裂伤多见于  
A. 阴道手术操作不当  
B. 胎盘植入  
C. 凝血功能障碍  
D. 软产道充分扩张  
E. 产程延长
80. 青春期功能失调性子宫出血的主要发病机制是  
A. 黄体功能不足  
B. 缺乏雌激素的负反馈作用  
C. 孕激素分泌不足, 导致子宫内膜分泌反应不良  
D. 垂体分泌 FSH 相对不足, 无 LH 高峰, 卵巢不能排卵  
E. 子宫内膜含有过多前列腺素
81. 患者, 女性, 37 岁。孕 1 产 0, 孕 14 周出现口渴多饮症状, 孕 24 周糖筛查血糖值为 10.5 mmol/L, 下一步检查为  
A. 尿糖检测  
B. 空腹血糖  
C. OGTT  
D. 尿酮体  
E. 羊水穿刺

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(82~84 题共用备选答案)

- A. 第一心音
- B. 第二心音
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 杂音

82. 主动脉瓣肺动脉关闭时产生的振动音为

83. 二尖瓣和三尖瓣关闭时振动产生的为

84. 心室舒张早期血流自心房急流入心室使心室振动产生的为

(85~86 题共用备选答案)

- A. 病史
- B. 临床表现
- C. 脑脊液病原学检查
- D. 脑电图检查
- E. 头部 CT

85. 确诊化脓性脑膜炎的主要依据是

86. 确诊脑积水的主要依据是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 正常
- B. 延长
- C. 减少
- D. 正常或增多
- E. 正常或减少

87. 特发性血小板减少性紫癜巨核细胞数目

88. 特发性血小板减少性紫癜白细胞数目

(89~90 题共用备选答案)

- A. 尿培养
- B. 痰培养
- C. 血培养
- D. 粪便培养
- E. 骨髓培养

89. 临床诊断败血症的重要方法是

90. 临床诊断白血病的重要依据是

(91~94 题共用备选答案)

- A. 大片炎症浸润影或实变影
- B. 肺蜂窝状肺脓肿
- C. 肺部多种形态浸润影,见于肺下野为
- D. 双肺弥漫性结节性浸润
- E. 肺下叶斑片状浸润

91. 军团菌肺炎 X 线所见是

92. 肺炎支原体肺炎 X 线所见是

93. 肺炎克雷伯杆菌肺炎 X 线所见是

94. 肺炎链球菌肺炎 X 线所见是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 麻疹
- D. 水痘
- E. 猩红

95. 由带状疱疹病毒引起的疾病是

96. 发热 3~4 天出现斑丘疹,疹间皮肤正常,出疹后热度增高见于

(97~98 题共用备选答案)

- A. 高血压
- B. 低血压
- C. 呼吸道梗阻
- D. 头痛
- E. 全脊髓麻醉

97. 全麻时麻醉过深可能引起

98. 硬膜外麻醉最危险的并发症是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 易复性疝
- B. 滑动性疝
- C. 难复性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

99. 疝内容物很容易纳入腹腔多见于

100. 疝内容物不能或不能完全回纳入腹腔内多见于

## 相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 医院感染漏报调查年监测患者数及漏报率分别为

- A. 不少于 5%, 漏报率应低于 10%
- B. 不少于 10%, 漏报率应低于 10%
- C. 不少于 10%, 漏报率应低于 15%
- D. 不少于 10%, 漏报率应低于 20%
- E. 不少于 10%, 漏报率应低于 30%

2. 糖尿病病人学习皮下注射方法时, 常采用

- A. 无意模仿
- B. 有意模仿
- C. 强迫模仿
- D. 主动交往
- E. 被动交往

3. 计划工作中, 评估形势的主要内容

包括

A. 社会关系、社会经济、社会竞争、服务对象的需求

B. 社会需求、社会竞争、组织资源、社会

经济的需求

C. 社会竞争、社会关系、社会需求、服务对象的需求

D. 社会需求、社会竞争、组织资源、服务对象的需求

E. 社会需求、社会关系、社会竞争、组织资源的需求

4. 下列是协调活动的重要手段和依据准则的为

- A. 规章制度
- B. 行政法规
- C. 基本法
- D. 刑法
- E. 民法

5. 拉斯韦尔模式的正确表述是

A. 传者 → 信息 → 传播途径 → 受者 → 效果

B. 传者 → 传播途径 → 信息 → 效果 → 受者

C. 信息 → 传者 → 传播途径 → 受者 → 效果

D. 信息 → 传者 → 传播途径 → 效果 → 受者

E. 传者 → 信息 → 传播途径 → 效果 → 受者

6. 授权的步骤不包括

A. 选择授权对象

B. 明确授权内容

C. 形成沟通渠道

D. 实施授权计划

E. 排除被授权者的工作障碍

7. 医患关系要做到真诚相处, 最主要的是

A. 关系和谐

B. 尽职尽责

C. 平等相待

D. 互相尊重

E. 互相信任

8. 属于多线型组织结构的为

A. 直线型

B. 直线-参谋型

C. 职能型

D. 主导型

E. 综合型

9. 脓性指头炎若需要切开引流, 应采用

A. 鱼口状切开

B. 手指侧面纵切开

C. 手指掌面纵切开

D. 在波动明显处横行切开

- E.从原伤口处放射状切开
- 10.空气消毒不宜使用
- A.紫外线照射
- B.臭氧消毒
- C.甲醛熏蒸
- D.醋酸熏蒸
- E.过氧化氢喷雾消毒
- 11.肠道隔离使用的标志是
- A.黄色标志
- B.蓝色标志
- C.橙色标志
- D.红色标志
- E.棕色标志
- 12.健康教育的核心为
- A.促进人们自身护理能力和行为
- B.促进人们住院适应能力
- C.促进人们自我保健能力和行为
- D.促进人们的健康行为和生活方式
- E.帮助人们建立健康行为
- 13.领导效能的内容不包括
- A.时间效能
- B.用人效能
- C.决策办事效能
- D.组织整体贡献效能
- E.结构效能
- 14.三度原位菌群失调的主要原因为
- A.免疫功能降低
- B.大量应用广谱抗菌药物
- C.慢性病诱发
- D.插管或介入治疗
- E.细菌结构变化
- 15.护理部发现问题及时纠正,遵循的管理原则是
- A.整分合原则
- B.能级原则
- C.激励原则
- D.随机制宜原则
- E.反馈原则
- 16.从健康计划实施时开始,并贯穿于计划执行全过程的评价活动是指
- A.形成评价
- B.总结评价
- C.过程评价
- D.效应评价
- E.结局评价
- 17.不适宜血液病病区采用的空气净化方法是
- A.紫外线灯照射消毒
- B.化学消毒
- C.自然通风
- D.空气消毒器
- E.集中空调通风系统
- 18.不需要洗手的情况是
- A.护理两名病人之间
- B.穿隔离衣前
- C.给病人输液后,准备导尿管
- D.给病人伤口换药后
- E.与病人交谈后
- 19.吸毒行为应属于
- A.日常危害健康行为
- B.致病性行为模式
- C.不良疾病行为
- D.违规行为
- E.不良嗜好行为
- 20.不需进行消化道隔离的疾病是
- A.麻疹
- B.甲型肝炎
- C.脊髓灰质炎
- D.霍乱
- E.细菌性痢疾
- 21.以下可能导致偏倚的因素,哪项属于测量对象因素
- A.霍桑效应
- B.暗示效应
- C.评定错误
- D.干预组和对照组选择不均衡
- E.测量者成熟性
- 22.开放性肺结核应采取

- A.保护性隔离  
B.血液隔离  
C.呼吸道隔离  
D.消化道隔离  
E.抗酸杆菌隔离
- 23.直线参谋型组织结构的优点是  
A.组织适应性好  
B.组织反应灵敏  
C.满足统一指挥和严格责任制要求  
D.直线领导和职能部门职权明确  
E.联系便捷,管理成本低
- 24.抗感染药物的作用机制不包括  
A.抑制细菌核酸的合成  
B.影响细菌细胞壁的合成  
C.细菌缺乏药物的靶位点  
D.干扰细菌蛋白质的合成  
E.损伤细菌的细胞膜
- 25.不属于责任心差引起的护患冲突表现在  
A.在班不在岗  
B.在岗不尽责  
C.医嘱执行不严格  
D.查对不认真  
E.知识有限
- 26.手术前预防性应用抗生素方法错误的是  
A.术前 0.5~1 小时通过静脉给予一次足量抗生素  
B.需有明确指征  
C.总的预防用药时间不超过 24 小时  
D.择期的结直肠手术前,还需通过导泻或灌肠进行肠道准备  
E.污染手术使用万古霉素作为预防药物
- 27.通风的目的与哪项无关  
A.调节室内温湿度  
B.降低微生物密度  
C.避免噪音的刺激  
D.使患者心情舒畅  
E.增加室内空气中含氧量
- 28.炭疽患者用过的治疗性废物和有机垃圾应  
A.熟石灰浸泡消毒  
B.丢弃  
C.焚烧  
D.过氧乙酸喷洒  
E.深埋
- 29.医院的 I 类环境的空气消毒适用于  
A.层流洁净手术室和层流洁净病房  
B.产房、婴儿室、早产儿室  
C.供应室无菌室  
D.注射室、治疗室、换药室  
E.急诊室、化验室及各类普通病房
- 30.美国管理学家莱金提出的 ABC 时间管理方法中,C 级目标指  
A.必须完成的目标  
B.最重要的目标  
C.较重要的目标  
D.很想完成的目标  
E.不太重要的目标
- 31.门诊教育往往侧重于以下哪项的防治教育  
A.危重疾病的教育  
B.慢性病的教育  
C.常见疾病的教育  
D.发病机制的教育  
E.传染性疾病的教育
- 32.组织或个人为了完成某一目标而制订具体行动方案称为  
A.程序化决策  
B.非程序化决策  
C.目标决策  
D.战略决策  
E.战术决策
- 33.“鱼和熊掌不可兼得”属于  
A.双趋式冲突  
B.双避式冲突  
C.趋避式冲突

- D.双趋双避式冲突  
 E.多重趋避式冲突
- 34.用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能,称为
- A.程序  
 B.结构图  
 C.规划图  
 D.政策  
 E.组织图
- 35.“动态”原理中管理工作动态特性是指
- A.稳定状态是相对的,运动状态是绝对的  
 B.稳定状态是绝对的,运动状态也是绝对的  
 C.稳定状态是绝对的,运动状态是相对的  
 D.稳定状态是相对的,运动状态也是相对的  
 E.稳定和运动状态的变化互不干扰
- 36.有效训导的方法错误的是
- A.用平等客观的态度对待下属  
 B.对于反复发生的错误,逐步加重处罚  
 C.批评对事不对人  
 D.以行动强化语言  
 E.提出防范错误的建议
- 37.关于抗菌药物的作用机制,错误的叙述是
- A.干扰细胞壁的合成  
 B.抑制细菌芽孢生成  
 C.抑制细菌核酸合成  
 D.影响细菌蛋白质的合成  
 E.损伤细胞膜
- 38.常规器械消毒灭菌合格率的评价属于
- A.基础质量评价  
 B.服务质量评价  
 C.环节质量评价  
 D.综合评价  
 E.终末质量评价
- 39.梅毒的病原体是
- A.奈瑟菌  
 B.钩端螺旋体  
 C.苍白螺旋体  
 D.汉坦病毒  
 E.人类乳头瘤病毒
- 40.四象限时间管理法的两个维度是指事情的
- A.战略性和战术性  
 B.集体性和个人性  
 C.时间性和紧迫性  
 D.权威性和重要性  
 E.重要性和紧迫性
- 41.不属于行政管理方法优点的是
- A.市管理系统达到高度统一  
 B.利于对常规问题处理  
 C.受决策者水平的限制  
 D.保证整个系统计划、目标的实现  
 E.灵活有效的解决各种例外问题
- 42.护理管理是现代医院管理的重要组成部分,其管理内容不包括
- A.角色管理  
 B.组织管理  
 C.人员管理  
 D.业务管理  
 E.质量管理
- 43.“霍桑实验”发现决定工作效率最重要的因素是
- A.人际关系  
 B.严格的纪律  
 C.统一的指挥  
 D.科学的领导  
 E.自我控制
- 44.不属于时间管理策略的是
- A.标准化消耗时间  
 B.将一般事件安排在不干扰时间  
 C.保持时间连续性  
 D.充分利用最佳工作时间

- E.选择好的助手
- 45.经常出现的活动的决策是
- A.程序化决策
- B.非程序化决策
- C.战术决策
- D.不确定性决策
- E.确定性决策
- 46.护理组织文化建设不正确的是
- A.易接受性
- B.群众关注
- C.针对性
- D.独特性
- E.交流性
- 47.护理组织文化的核心是
- A.护理群体文化
- B.护理哲理
- C.社会文化
- D.护理价值观
- E.护理专业
- 48.不属于医院院外培训方法的是
- A.全脱产学习
- B.业余培训
- C.电视大学
- D.科室轮转
- E.自学高考
- 49.属于沟通过程中的一个步骤但却包括了信息沟通过程的几个环节的是
- A.信息源
- B.编码
- C.传递信息
- D.解码
- E.反馈
- 50.制定护理质量标准的原则不包括
- A.可衡量性原则
- B.科学性和先进性原则
- C.实用性原则
- D.严肃性和相对稳定性原则
- E.经济原则
- 51.“降低平均住院天数”属于评估指标分类中的
- A.年度评估指标
- B.质量评估指标
- C.差异度评估指标
- D.临床成果评估指标
- E.患者满意度评估指标
- 52.小组讨论是指在一位主持人的带领下,一小组人围绕某个主题进行座谈讨论。确保小组讨论效果的关键点不包括
- A.选择适当的主持人
- B.做好充分准备工作
- C.掌握小组讨论的技巧
- D.安排好小组人员座位排列
- E.现场提出讨论主题
- 53.影响传播效果的因素有多种,其中属于社会环境因素的是
- A.环境布置
- B.传播活动地点、场所
- C.相关的政策法规
- D.传播者的行为动机
- E.患者的心理需求
- 54.健康教育活动的目标是
- A.开展卫生宣传
- B.配合调查研究
- C.普及保健知识
- D.改善人类的健康相关行为
- E.实施系统的健康相关行为干预
- 55.下列不属于按教育目的分类的健康教育研究范畴的是
- A.营养健康教育
- B.生殖健康教育
- C.职业人群健康教育
- D.环境保护健康教育
- E.疾病防治健康教育
- 56.0~3岁时期,个体所处的行为发展阶段是
- A.初试发展阶段
- B.被动发展阶段
- C.主动发展阶段

- D.自主发展阶段  
E.巩固发展阶段
- 57.以下属于“日常危害健康行为”的是  
A.药物滥用  
B.讳疾忌医  
C.不遵医嘱  
D.缺乏体育锻炼  
E.违反法律法规
- 58.“您今天的气色好多了,是吧?”属于常见提问方式中的  
A.封闭式  
B.开放式  
C.复合式  
D.探索式  
E.偏向式
- 59.选择健康传播途径的原则除准确性外还包括  
A.针对性、速度性、经济性  
B.科学性、速度性、经济性  
C.针对性、科学性、通用性  
D.速度性、通用性、经济性  
E.针对性、速度性、科学性
- 60.关于健康教育计划目标的叙述,下列错误的是  
A. Who 是指对象  
B. What 是指实现什么变化  
C. When 是指在多长时间内实现这种变化  
D. How much 是指有多少对象发生行为变化  
E. Where 是指在什么范围内实现这种变化
- 61.降低烟草的价格对吸烟行为来讲是一种  
A.倾向因素  
B.促成因素  
C.强化因素  
D.抑制因素  
E.强制因素
- 62.为减少回归因素对评价结果正确性的影响,可采用的方法是  
A.设立对照组  
B.重复测量  
C.抽样测量  
D.比较分析  
E.随机调查
- 63.适度变化语音引起对方注意属于非语言传播技巧中的  
A.面部表情  
B.仪表形象  
C.动态语言  
D.同类语言  
E.体态语言
- 64.医院感染学是研究医院感染  
A.发生、发展和控制的一门学科  
B.病原体特征的一门学科  
C.流行病学特征的一门学科  
D.管理制度建立和完善的一门学科  
E.控制措施的一门学科
- 65.去污染就是人为地将机体的  
A.正常菌群或已定植的细菌部分去除  
B.正常菌群或已定植的细菌全部去除  
C.已定植的细菌部分或全部去除  
D.正常菌群部分或全部去除  
E.正常菌群或已定植的细菌部分或全部去除
- 66.ICU 最常见的条件致病菌是  
A.肺炎克雷伯菌  
B.大肠埃希菌  
C.铜绿假单胞菌  
D.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌  
E.洋葱伯克霍德菌
- 67.医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中,短时间内突然发生  
A.许多医院感染病例  
B.医院感染流行  
C.医院感染集中  
D.医院感染失控



- E. 医院感染蔓延
68. 手术器械和物品属于
- A. 消毒物品
- B. 无危险性物品
- C. 低度危险性物品
- D. 中度危险性物品
- E. 高度危险性物品
69. 腹腔镜使用前必须经过
- A. 清洁
- B. 消毒
- C. 减菌
- D. 灭菌
- E. 无害
70. 接触下列物品护士不需戴手套的是
- A. 患者的血液
- B. 患者的分泌物
- C. 患者的药物
- D. 患者的排泄物
- E. 污染的敷料
71. 下列属于决策步骤的是
- A. 列出对象
- B. 目标分类
- C. 追踪评价
- D. 排列顺序
- E. 分配时间
72. 护士长担任咨询、协调、激励者角色

的护理组织方式是

- A. 个案护理
- B. 功能制护理
- C. 小组护理
- D. 责任制护理
- E. 综合护理

73. 领导在日常工作中有权调度人、财、物、时间等,体现了领导的

- A. 管理权
- B. 决策权
- C. 决定权
- D. 用人权
- E. 指挥权

74. 各要素配置达到科学化、最优化的基本要求是

- A. 解决问题要注重根本
- B. 及时协调出现的问题
- C. 调动组织成员积极性
- D. 协调问题注意合理原则
- E. 协调过程要相互尊重

75. 实施护理质量控制应注意

- A. 检查标准应人性化
- B. 重视细节的控制
- C. 质量控制应具体化
- D. 控制方法应体现管理技巧
- E. 强调综合系统的控制

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(76~77 题共用备选答案)

- A. 护士工作兴趣与满意度高
- B. 责任护士技能水平要求高
- C. 患者安全感与归属感增强
- D. 所需要的人力物力费用高
- E. 护士职责明确,责任心增强

76. 责任制护理的优点是

77. 综合护理的优点是

(78~80 题共用备选答案)

- A. 吸烟
- B. 戒烟
- C. 及时就医
- D. 讳疾忌医
- E. 药物滥用

78. 属于保健行为的是

79. 属于不良疾病行为的是

80. 属于戒除不良嗜好行为的是

(81~85 题共用备选答案)

- A. 消化道隔离  
 B. 呼吸道隔离  
 C. 血液、体液隔离  
 D. 接触隔离  
 E. 严密隔离
81. 皮肤白喉采取的隔离是  
 82. 腮腺炎采取的隔离是  
 83. 艾滋病采取的隔离是  
 84. 伤寒采取的隔离是  
 85. 疟疾采取的隔离是  
 (86~89 题共用备选答案)
- A. 5%  
 B. 10%  
 C. 50%  
 D. 80%  
 E. 90%
86. 下排式灭菌剂的装载量不得超过柜室内容积的  
 87. 预真空灭菌剂的装载量不得超过柜室容积的  
 88. 预真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的  
 89. 脉动真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的  
 (90~91 题共用备选答案)
- A. 2 小时  
 B. 4 小时  
 C. 12 小时  
 D. 24 小时  
 E. 48 小时
90. 医疗机构发生 5 例以上疑似医院感染暴发事件的报告时限为  
 91. 医疗机构发生 10 例以上的医院感染暴发事件的报告时限为  
 (92~93 题共用备选答案)
- A. 个案护理  
 B. 功能制护理  
 C. 小组护理  
 D. 责任制护理  
 E. 综合护理
92. 由一名护理人员在当班期间承担一名患者所需要的全部护理, 被称为  
 93. 由一组护理人员应用护理程序的工作方法, 共同完成对一组患者的护理工作, 被称为  
 (94~96 题共用备选答案)
- A. 肯定性反馈  
 B. 否定性反馈  
 C. 模糊性反馈  
 D. 动态体语  
 E. 仪表形象
94. 护士小王在和患者交谈中, 适时插入了一些“是的”“很好”等语言或点头、微笑等非语言形式给予对方肯定和鼓励, 对患者的言行表示了赞同和支持, 小王在交谈中的反馈行为属于  
 95. 当小王发现患者的言行不正确时, 她应当使用的恰当反馈形式是  
 96. 在交谈中, 小王以关注的眼神注视患者, 表示在专心倾听对方的话, 小王的交流行为属非语言交流中的  
 (97~98 题共用备选答案)
- A. 先天性  
 B. 习得性  
 C. 偶然性  
 D. 一致性  
 E. 可控性
97. 属于促进健康行为的特点是  
 98. 属于危害健康行为的特点是  
 (99~100 题共用备选答案)
- A. 食用生的污染贝类  
 B. 直接接触有传染性的分泌物感染  
 C. 破损的皮肤接触被病原菌污染的物品感染  
 D. 输血感染  
 E. 吸入被病原菌污染的空气感染
99. 淋病的传播途径是  
 100. 炭疽的传播途径是

## 专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1.慢性肺心病病人经常有 CO<sub>2</sub> 潴留,若吸入纯 O<sub>2</sub> 可致呼吸暂停,因为这种病人呼吸中枢兴奋性的维持主要靠

- A.高 CO<sub>2</sub> 刺激外周化学感受器
- B.高 CO<sub>2</sub> 刺激呼吸中枢
- C.缺 O<sub>2</sub> 刺激中枢化学感受器
- D.缺 O<sub>2</sub> 刺激外周化学感受器
- E.缺 O<sub>2</sub> 直接刺激呼吸中枢

2.患者,女性,24 岁。主诉咽痛、畏寒、发热,体温 39℃。体查:咽部充血,扁桃体充血、肿大,有黄色点状渗出物,颌下淋巴结肿大,有压痛。诊断:细菌性咽、扁桃体炎。最常见的细菌病原体为

- A.流感嗜血杆菌
- B.溶血性链球菌
- C.肺炎球菌
- D.葡萄球菌
- E.革兰阴性杆菌

3.支气管扩张大咯血病人最危险且最常见的并发症是

- A.严重贫血
- B.休克
- C.窒息
- D.继发感染
- E.肺不张

4.不属于支气管扩张治疗原则的是

- A.保持呼吸道引流通畅
- B.控制感染
- C.处理咯血
- D.必要时手术治疗
- E.长期家庭氧疗

5.有关肺炎支原体肺炎的临床表现描述错误的是

- A.潜伏期约 1~3 周,起病缓慢

B.头痛显著

C.咳嗽不重,初为干咳,后大量咳黏液痰

D.退热后咳嗽可继续存在

E.累及胸膜时,可有胸膜摩擦音或胸水体征

6.军团菌肺炎治疗首选

- A.庆大霉素
- B.青霉素
- C.红霉素
- D.氧氟沙星
- E.甲硝唑

7.对巨噬细胞外碱性环境中结核分枝杆菌作用最强,对细胞内结核分枝杆菌作用较小的抗结核药是

- A.异烟肼
- B.利福平
- C.链霉素
- D.乙胺丁醇
- E.对氨基水杨酸钠

8.肺脓肿的治疗原则是

- A.抗感染治疗
- B.抗感染治疗及手术
- C.抗感染治疗及体位引流
- D.抗结核化学治疗
- E.抗结核化学治疗及手术

9.患者,男性,24 岁。高热 3 天,咳嗽,咯铁锈色痰,白细胞增高,胸片示右上叶片状阴影,正确选用抗生素为

- A.青霉素
- B.青霉素+链霉素
- C.青霉素+庆大霉素
- D.先锋 V
- E.先锋 V+丁胺卡那霉素

10.患者,男性,40岁。发热、咳脓臭痰2周,偶有痰中带血。既往吸烟史20年,白细胞计数 $23 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞90%;胸片示右下肺大片状阴影,内有空洞和液平面,最可能的诊断是

- A.右上肺癌
- B.继发性肺结核
- C.慢性纤维空洞性肺结核
- D.右肺脓肿
- E.右上肺炎

11.喘息型慢性支气管炎病人合理使用支气管扩张剂后,仍有明显呼吸道阻塞时,应使用

- A.抗生素
- B.镇咳剂
- C.祛痰剂
- D.糜蛋白酶
- E.肾上腺皮质激素

12.支气管扩张病人咳痰的特点是

- A.草绿色脓痰
- B.黄绿色脓痰
- C.白色泡沫痰
- D.粉红色泡沫痰
- E.铁锈色痰

13.原发性支气管肺癌最常见的早期症状是

- A.刺激性咳嗽
- B.持续性胸痛
- C.胸闷、气急
- D.锁骨上淋巴结肿大
- E.霍纳(Horner)综合征

14.关于晚期肺癌压迫侵犯邻近器官、组织时,不正确的是

- A.侵犯膈神经,引起同侧膈肌麻痹
- B.侵犯喉返神经,引起声带麻痹,声音嘶哑
- C.骨关节病综合征
- D.侵犯胸膜,引起胸膜腔积液
- E.侵入纵隔,压迫食管,引起吞咽困难

15.患者,男性,37岁。右上叶肺癌切除术后24小时,肺癌的非转移性全身症状即逐渐消失。此类症状包括

- A.骨关节痛
- B.重症肌无力
- C.男性乳腺增大
- D.Cushing综合征
- E.颈交感神经综合征

16.不需要抽气治疗、可自行吸收的单纯性气胸,其肺萎陷程度

- A.<35%
- B.<20%
- C.<25%
- D.<30%
- E.<50%

17.患者,男性,59岁。慢性咳嗽20余年,3天前因感冒咳喘加重、发绀、发热,血气分析 $PaO_2$  45 mmHg, $PaCO_2$  >85 mmHg,并伴有精神症状,间歇抽搐、扑翼样震颤,考虑诊断为

- A.呼吸衰竭
- B.脑出血
- C.代谢性酸中毒
- D.肺性脑病
- E.心力衰竭

18.关于慢性呼吸衰竭用呼吸兴奋剂的描述正确的是

- A.尼可刹米可以使呼吸加快变浅,改善组织换气
- B.多沙普仑不能通过颈动脉化学感受器反射性兴奋呼吸中枢
- C.尼可刹米给药方法只能是静脉缓慢推注
- D.尼可刹米比多沙普仑作用强大,安全范围广
- E.尼可刹米有复苏作用

19.能够收缩血管的是

- A.乙酰胆碱
- B.儿茶酚胺

- C. 前列环素  
D. 一氧化氮  
E. 钾离子
20. 心悸的描述中不正确的是  
A. 各种器质性心血管病可致心悸  
B. 心律失常可致心悸  
C. 情绪激动可致心悸  
D. 心悸的严重程度和病情成正比  
E. 心悸一般无危险性
21. 急性左心衰竭时最典型的表现是  
A. 咳嗽  
B. 咳痰  
C. 突发严重的呼吸困难  
D. 面色灰暗  
E. 皮肤潮湿
22. 急性左心衰竭治疗药物中不包括  
A. 吗啡  
B. 西地兰  
C. 氨茶碱  
D. 呋塞米  
E. 沙丁胺醇
23. 心力衰竭伴快速心房颤动时首选静脉使用的正性肌力药物是  
A. 西地兰  
B. 地高辛  
C. 多巴胺  
D. 氨力农  
E. 多巴酚丁胺
24. 患者, 男性。查体听诊时发现, 心率 130 次/分左右, 第一心音强弱变化不定, 心律绝对不规则, 有脉搏短绌, 其诊断是  
A. 房颤  
B. 房扑  
C. 窦速  
D. 室上速  
E. 室速
25. 心绞痛发病诱因描述不正确的是  
A. 天气炎热时  
B. 饱餐时  
C. 情绪激动时  
D. 心动过速时  
E. 体力劳动时
26. 超声心动示二尖瓣瓣口面积为  $0.5 \text{ cm}^2$ , 该病人二尖瓣狭窄的程度是  
A. 正常  
B. 轻度狭窄  
C. 中度狭窄  
D. 中重度狭窄  
E. 重度狭窄
27. 二尖瓣狭窄治疗原则不包括  
A. 预防风湿热复发  
B. 呼吸困难者减少体力活动  
C. 避免和控制急性感染、贫血等诱发急性肺水肿的因素  
D. 定期复查  
E. 口服 ACEI 类药物
28. 心绞痛发作处理不正确的是  
A. 立即停止活动卧床休息  
B. 给予氧气吸入, 维持血氧饱和度 90% 以上  
C. 给予硝酸甘油舌下含服, 可多次给药, 直至症状缓解  
D. 24 小时心电监护  
E. 避免情绪紧张激动
29. 对急性心肌梗死描述不正确的是  
A. 常有先兆症状  
B. 多发生于清晨安静时  
C. 体温可升高至  $38^\circ\text{C}$  左右  
D. 可伴有伴恶心、呕吐、上腹胀痛和肠胀气  
E. 疼痛时间不超过 24 小时
30. 心脏骤停的心电图表现包括  
A. 室性心动过速  
B. 心房颤动  
C. 心室颤动  
D. 房速  
E. 室性早搏
31. 高血压病人眼底病变 III 级的表现为

- A. 视网膜动脉狭窄  
 B. 视网膜动脉痉挛  
 C. 视网膜动脉变细  
 D. 眼底出血或絮状渗出  
 E. 出血伴视神经乳头水肿
32. 指导病人服用枸橼酸铋钾(CBS)时,错误的叙述是
- A. 可有恶心、一时性血清转氨酶升高  
 B. 可用吸管直接吸入  
 C. 可出现便秘和黑色大便  
 D. 最好在餐后半小时服用  
 E. 极少数病人可出现急性肾衰竭
33. 原发性肝癌病人不适宜手术的指征是
- A. 明显腹水、黄疸  
 B. 无严重肝硬化  
 C. 肝功能代偿期  
 D. 肿瘤未超过半肝  
 E. 肿瘤未侵犯第一肝门
34. 关于上消化道大出血的饮食护理描述错误的是
- A. 急性大出血时应禁食  
 B. 少量出血但是无呕吐者可进清淡流食  
 C. 出血停止后即可进温热流质  
 D. 消化性溃疡出血停止后应少量多餐,以营养丰富的半流质为主  
 E. 食管胃底静脉曲张破裂出血的病人急性期应禁食
35. 肠结核病人的腹痛特点,叙述正确的是
- A. 刀割样疼痛  
 B. 痉挛性阵痛  
 C. 烧灼痛  
 D. 进食后可缓解  
 E. 排便后可缓解
36. 患者,男性,45岁。既往有消化性溃疡病和不规则服药史。因突发性中上腹剧痛12小时来院急诊,体检发现板状腹,腹部立位平片示膈下有游离气体,生命体征尚平稳。对该病人目前首先应采取的必要措施为
- A. 高浓度吸氧  
 B. 使用镇静剂  
 C. 立即输血  
 D. 禁食并胃肠减压  
 E. 立即使用抗生素
37. 在肝性脑病的治疗中,禁止使用的药物是
- A. 西咪替丁  
 B. 安定  
 C. 谷氨酸钾  
 D. 精氨酸钾  
 E. 硫酸镁
38. 患者,50岁。慢性肝病病人,近日时有嗜睡,护士今晨巡视病房时发现其呼之不应,压迫眶上仍有痛苦表情。此种情况应判断为
- A. 病情无变化  
 B. 肝性脑病前驱期  
 C. 肝性脑病昏迷前期  
 D. 肝性脑病昏睡期  
 E. 肝性脑病昏迷期
39. 急性肾小球肾炎的治疗措施中不正确的是
- A. 1~2年内避免重体力活动和劳累  
 B. 有水肿及高血压者每日盐摄入量2~3 g/d  
 C. 鼓励病人摄入优质蛋白,摄入量约1 g/d  
 D. 应用激素及免疫抑制剂  
 E. 可用中药辅助治疗
40. 有助于减轻肾病综合征病人尿蛋白的药物为
- A. 细胞毒药物  
 B. 血小板解聚剂  
 C. 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI类)  
 D. 免疫抑制剂

- E. 氨基糖苷类抗生素
41. 患者, 男性。全身水肿, 少尿 10 天, BP 180/105 mmHg, Hb 110 g/L, 尿蛋白(++), RBC(++)/HP, 近三天尿量<200 mL/d, 水肿显著加重, 心悸、气促不能平卧, 针对该病人, 现在最有效的治疗措施为
- A. 多巴酚丁胺+速尿  
B. 洋地黄+速尿  
C. 透析治疗  
D. 地塞米松静注  
E. 速尿+硝普钠+洋地黄
42. 关于急性肾衰竭病人多尿期的治疗原则, 说法不正确的是
- A. 重点为维持水、电解质和酸碱平衡  
B. 仍需继续注意控制氮质血症  
C. 尿量一旦超过 2 500 mL, 即可停止透析治疗  
D. 积极治疗原发症与并发症  
E. 需持续监测血清电解质水平
43. 病人出现全身针尖样出血点可能提示的疾病是
- A. 遗传性出血性毛细血管扩张症  
B. 血友病  
C. 过敏性紫癜  
D. 血小板减少性紫癜  
E. 坏血病
44. 患者, 男性, 28 岁。诊断为再生障碍性贫血, 该病人最有可能发生感染的部位是
- A. 消化道  
B. 泌尿系统  
C. 呼吸系统  
D. 皮肤  
E. 颅内
45. 病人实验室检查结果显示: 血小板计数正常, 出血时间延长, 凝血时间正常, 毛细血管脆性试验(+), 血块收缩正常。考虑该病人可能有
- A. 血管壁功能异常  
B. 血小板功能异常  
C. 血液凝血功能障碍  
D. 血中有抗凝物质  
E. 抗凝物增多
46. 患者, 女性, 31 岁。慢性粒细胞白血病史 1 年, 近 1 周出现高热, 脾大平脐, 血红蛋白 51 g/L, 白细胞  $33 \times 10^9/L$ , 分类原粒占 40%, 中晚幼粒占 40%, 血小板  $45 \times 10^9/L$ , 目前病人可诊断为
- A. 慢性粒细胞白血病急性变  
B. 慢性粒细胞白血病加速期  
C. 慢性粒细胞白血病合并感染  
D. 慢性粒细胞白血病合并类白血病反应  
E. 慢性粒细胞白血病慢性期
47. 对于甲亢危象的治疗错误的是
- A. 口服复方碘或静滴碘化钠, 停用抗甲状腺药  
B. 利血平或心得安  
C. 纠正水电解质失衡, 物理降温  
D. 地塞米松静点  
E. 防治感染
48. 甲状腺功能亢进症的确诊依据是
- A. 睡眠时心率仍快  
B. 善饥多食  
C.  $FT_4$ 、 $FT_3$  增高  
D. 突眼  
E. 多汗
49. 关于风湿性疾病常见症状, 叙述错误的是
- A. 痛风的关节痛固定于少数关节, 剧烈难忍  
B. 风湿热的关节痛多呈游走性  
C. 晨僵活动后减轻  
D. 类风湿关节炎可致关节畸形  
E. 狼疮的损害主要表现在皮肤
50. 有机磷中毒毒蕈碱样症状是
- A. 流涎  
B. 心率加快  
C. 瞳孔扩大

- D.肌肉抽搐  
E.尿潴留
- 51.近年来发现对痢疾杆菌较敏感的抗菌药物为
- A.卡那霉素  
B.庆大霉素  
C.SMZ  
D.氟喹诺酮类  
E.氨苄青霉素
- 52.急性甲型肝炎病人的主要治疗措施是
- A.保肝治疗  
B.卧床休息  
C.调节免疫功能治疗  
D.抗病毒治疗  
E.支持治疗
- 53.慢性乙型肝炎干扰素治疗的适应证不包括
- A.血清ALT升高  
B.HBeAg阳性  
C.HBV-DNA阳性  
D.有自身免疫性疾病  
E.血清胆红素正常
- 54.带病毒的家畜中属于狂犬病主要传染源的是
- A.猫  
B.猪  
C.牛  
D.马  
E.狂犬
- 55.某地区近年来每逢夏季就有一种传染病流行,且多发生于儿童,主要表现为发热头痛,呕吐,第3~4天出现意识障碍,严重者伴抽搐及呼吸异常,经治疗后多数人于病程2周后痊愈,5%~20%重症病人留有神经系统后遗症,病死率约为3%~10%,为预防该病再度流行,在其综合性预防措施中,最主要的是
- A.控制和管理好病人  
B.控制和管理好病猪  
C.防蚊  
D.注射丙种球蛋白  
E.防蚊灭蚊
- 56.病人的肢体能床上移动而不能抬起,其肌力为
- A.0级  
B.1级  
C.2级  
D.3级  
E.4级
- 57.患者,男性,65岁。有心房颤动病史。清晨起床自行上厕所时摔倒,家人发现其口角歪斜自述左侧上下肢麻木。送医院检查,神志清楚,左侧偏瘫,CT见低密度影。最可能的诊断是
- A.脑出血  
B.脑梗死  
C.脑震荡  
D.蛛网膜下腔出血  
E.脑挫伤
- 58.患者,女性,52岁。因吉兰-巴雷综合征收治入院。治疗期间突发呼吸困难、胸闷,此时应立即采取的抢救措施是
- A.静脉用氨茶碱  
B.气管切开,人工辅助呼吸  
C.静脉滴注肾上腺皮质激素  
D.半坐卧位,高流量吸氧  
E.气管扩张剂雾化吸入
- 59.重症肌无力病人的首发症状是
- A.饮水呛咳  
B.言语不清  
C.四肢乏力  
D.眼睑下垂  
E.吞咽困难
- 60.杀菌作用最强的紫外线波段是
- A.200~220 nm  
B.220~240 nm  
C.240~260 nm



D.250~270 nm

E.270~290 nm

61.急性糜烂出血性胃炎的主要临床表现是

- A.腹泻
- B.呕血、黑便
- C.上腹痛
- D.恶心、呕吐
- E.发热

(62~64题共用题干)

患者,男性,66岁。慢性阻塞性肺疾病病18年,近5日因感冒后出现呼吸困难加剧,伴咳嗽、咳痰。病人因病情加重伴呼吸困难、发绀收入院。

62.入院查体:神志恍惚,球结膜水肿,双肺可闻及湿性啰音,心率120次/分。在未吸氧时做动脉血气分析,下面结果与其病情相符的是

- A.PaO<sub>2</sub>正常,PaCO<sub>2</sub>降低
- B.PaO<sub>2</sub>正常,PaCO<sub>2</sub>升高
- C.PaO<sub>2</sub>升高,PaCO<sub>2</sub>正常
- D.PaO<sub>2</sub>升高,PaCO<sub>2</sub>降低
- E.PaO<sub>2</sub>降低,PaCO<sub>2</sub>升高

63.患者今日晨起一阵剧烈咳嗽后觉得喘憋加剧,无法平卧,胸痛剧烈,不敢呼吸。见其口唇发绀明显,表情痛苦,胸部叩诊呈鼓音,考虑并发了

- A.急性肺感染
- B.支气管扩张
- C.肺心病
- D.自发性气胸
- E.急性左心衰

64.患者近5天来发热、咳嗽、咳黄痰、憋气加重,伴尿少、双下肢水肿,治疗措施最重要的是

- A.应用有效抗生素控制肺部感染
- B.祛痰、止咳、平喘
- C.应用利尿剂消除下肢水肿
- D.静点酚妥拉明以减轻心脏负荷

E.应用呼吸兴奋剂改善呼吸功能  
(65~67题共用题干)

患者,女性,28岁。午后低热3周(38℃左右),咳少量痰液,乏力和纳差,血沉加快,白细胞 $7.0 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞60%,胸片示右上肺第2肋间有斑片阴影。

65.该病人最可能的诊断是

- A.肺炎球菌肺炎
- B.肺炎杆菌肺炎
- C.病毒性肺炎
- D.继发性肺结核
- E.过敏性肺炎

66.该病人突然咯血约300 mL,治疗的首选药物是

- A.止咳剂
- B.镇静剂
- C.凝血剂
- D.垂体后叶素
- E.呼吸兴奋剂

67.咯血致死的主要原因是

- A.严重贫血
- B.休克
- C.窒息
- D.继发感染
- E.肺不张

(68~70题共用题干)

患者,女性,51岁。既往冠心病史4年,因心前区疼痛症状加重来医院就诊,在诊室门口突然倒地,意识丧失。

68.为判断其是否心脏骤停,迅速可靠的依据是

- A.意识丧失和大动脉搏动消失
- B.呼吸停止
- C.血压降低
- D.心音消失
- E.瞳孔对光反射消失

69.此时护士应立即进行的抢救措施是

- A.心内或气管内药物注射
- B.心肺复苏

- C. 低温疗法
- D. 维持水电解质平衡
- E. 非同步直流电除颤

70. 护士进行心外按压时错误的是

- A. 平卧, 背部垫硬板
- B. 胸外心脏按压正确的部位是胸骨中

下 1/3 交界处

- C. 按压次数每分钟 50~60 次
- D. 按压时双肘伸直
- E. 按压时使胸骨下陷 5~6 cm

(71~73 题共用题干)

患者, 男性, 55 岁。肝硬化病史 5 年, 1 年前胃镜检查显示食管胃底静脉曲张, 未行规律治疗。6 小时前进食后出现呕血, 伴大汗、心慌, 急诊入院。查体: BP 80/40 mmHg, P 124 次/分, 面色苍白, 四肢冰冷, 口唇发绀。

71. 若该病人出现恶心、欲吐时, 应告知其头偏向一侧, 意义在于

- A. 减少出血
- B. 利于止血
- C. 防止窒息
- D. 便于测血压
- E. 减轻病人的心理压力

72. 该病人目前首要的治疗措施是

- A. 胃镜下止血
- B. 开放静脉通路, 补充血容量
- C. 手术治疗
- D. 立即应用止血药物
- E. 三腔两囊管压迫止血

73. 为预防该病人并发肝性脑病, 正确的处理措施是

- A. 给予缓泻药
- B. 用弱酸性溶液灌肠
- C. 用开塞露通便
- D. 行全消化道灌洗
- E. 用肥皂水灌肠

(74~75 题共用题干)

患者, 女性, 32 岁。因双侧腰背酸痛, 尿

频、尿急、尿痛 7 天就诊, T 39.5 °C, 双肾压痛、叩击痛(+); 尿检: 蛋白(+), WBC 10/HP, 血 WBC  $13 \times 10^9/L$ 。

74. 根据病情, 该病人最可能的临床诊断为

- A. 急性肾炎
- B. 急性膀胱炎
- C. 肾结核
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

75. 目前针对该病人最重要的治疗措施是

- A. 积极对症处理
- B. 口服碱性药物, 减轻尿路刺激征
- C. 大量饮水, 每日饮水量 > 2 500 mL
- D. 口服抗生素治疗
- E. 静脉联合应用抗生素, 必要时局部处理

(76~78 题共用题干)

患者, 女性, 18 岁。主诉近 8 个月来出现脾气急躁, 并有多食消瘦、易出汗、手颤的症状, 检查发现甲状腺轻度肿大, 质软, 有轻度突眼, 颈部闻及血管杂音。

76. 初步诊断为

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 淡漠型甲亢
- C. 甲状腺功能亢进性心脏病
- D. 生理性甲状腺肿
- E. 甲状腺危象

77. 最佳治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 放射性碘 131 治疗
- C. 普萘洛尔治疗
- D. 地西泮治疗
- E. 甲巯咪唑治疗

78. 若对于该病人采用药物治疗, 指导不正确的是

- A. 用药期间不能随意中断用药
- B. 轻度药疹可用抗过敏药物缓解

C.开始服用时需每周检查血白细胞计数1次

D.如发现白细胞计数低于 $4.5 \times 10^9/L$ 要停药

E.应定期随访疗效

(79~81题共用题干)

患者,女性,36岁。近1年来双手小关节反复肿胀疼痛,晨起关节僵硬不适,约1小时能缓解。查体:双手近端指间关节肿胀、压痛,双手X线示关节端骨质疏松。化验检查示RF(+),血沉加快,C反应蛋白增高。

79.最可能的诊断是

A.类风湿关节炎

B.系统性红斑狼疮

C.骨关节炎

D.反应性关节炎

E.强直性脊柱炎

80.病人关节疼痛,首先应选择的药物是

A.布洛芬

B.甲氨蝶呤

C.泼尼松

D.青霉素

E.胸腺肽

81.要控制病情发展,应联合应用

A.布洛芬

B.甲氨蝶呤

C.泼尼松

D.青霉素

E.胸腺肽

(82~83题共用题干)

患者,女性。炎热夏季食用冷饮后,突起高热伴畏寒、寒战,出现恶心、呕吐、食欲缺乏,阵发性腹痛、腹泻,每天10余次,有里急后重。粪便初为稀便,后出现黏液脓血便。粪便镜检可见大量脓细胞、白细胞和红细胞。

82.临床初步判断为

A.细菌性食物中毒

B.急性菌痢普通型

C.非典型急性菌痢

D.休克型菌痢

E.脑型菌痢

83.治疗首选药物为

A.环丙沙星

B.头孢噻肟

C.红霉素

D.庆大霉素

E.复方磺胺甲噁唑

(84~85题共用题干)

患者,女性,39岁。因肾衰竭行血液透析治疗,10天后突然畏寒、高热,血压70/40 mmHg,全身有散在出血点,血常规检查白细胞总数 $12 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞占90%。

84.该病人目前最可能的诊断是

A.输液反应

B.透析中发生菌血症

C.感染性休克

D.流行性脑脊髓膜炎

E.肾综合征出血热

85.目前该病人治疗的根本措施是

A.补充血容量

B.纠正酸中毒

C.积极处理原发病

D.抗凝治疗解除微细血栓

E.应用血管扩张剂,改善微循环

(86~88题共用题干)

患者,男性,26岁。出现高热1周,应用抗生素治疗无效。查体胸骨压痛明显,肝脾肋下未触及。入院后皮肤多处片状瘀斑、血尿,肌内注射后局部渗血不止,血压120/80 mmHg。白细胞 $3.0 \times 10^9/L$ ,血红蛋白58 g/L,血小板 $25 \times 10^9/L$ 。骨髓检查:有核细胞增生极度活跃,胞质颗粒粗大的早幼粒细胞占80%。

86.本病例的诊断是

A.急性早幼粒细胞白血病

B.急性单核细胞白血病

C.急性粒细胞白血病

D.急性红白血病

E.急性淋巴细胞白血病  
 87.病人出血的首要原因是

- A.血小板减少
- B.异常早幼粒细胞浸润血管壁
- C.血小板减少伴功能异常
- D.DIC
- E.凝血因子缺乏

88.病人急性期治疗后获得完全缓解后,应采取的治疗方案是

- A.大剂量阿糖胞苷强化治疗
- B.单用全反式维 A 酸化疗
- C.DA 方案
- D.化疗+放疗
- E.化疗与全反式维 A 酸交替治疗

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(89~90 题共用备选答案)

- A.急性上呼吸道感染
- B.急性肺脓肿
- C.急性气管-支气管炎
- D.急性胸膜炎
- E.支气管扩张

89.患者,女性,24 岁。主诉有鼻塞、咽痛、声音嘶哑、流眼泪、呼吸道不畅等急性上呼吸道感染症状。血象检查:血白细胞计数偏低。该病人最可能的诊断是

90.患者,男性,23 岁。4 天前出现频繁干咳,伴有胸骨后不适,乏力,未予重视。昨日出现咳嗽、咳吐黏液脓痰,痰中偶有血丝,体检:肺部散在干、湿啰音,X 线示肺纹理增粗。该病人最可能的诊断是

(91~92 题共用备选答案)

- A.反酸、嗝气
- B.频繁呕吐
- C.常因胃底静脉曲张合并上消化道出血
- D.节律性上腹痛
- E.多发生于春秋和秋夏之交

91.消化性溃疡最具特征性的表现是

92.不属于消化性溃疡临床特点的是

(93~95 题共用备选答案)

- A.烂苹果味

- B.大蒜气味
- C.唇樱桃红色
- D.瞳孔扩大
- E.尿液橘黄色

93.CO 中毒的典型表现是

94.有机磷中毒的典型表现是

95.阿托品中毒的表现是

(96~97 题共用备选答案)

- A.弛张热
- B.稽留热
- C.波状热
- D.阶梯形上升
- E.骤升骤降

96.伤寒初期的体温特点是

97.伤寒极期的体温特点是

(98~100 题共用备选答案)

- A.全血细胞减少
  - B.红细胞与血红蛋白减少
  - C.血小板减少
  - D.白细胞减少
  - E.幼稚白细胞增多
- 98.急性白血病骨髓象显示
- 99.再生障碍性贫血血液检查显示
- 100.特发性血小板减少性紫癜血液检查显示

## 专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1.急性气管-支气管炎病人出现脓痰不易排出时,关于排痰的措施,不正确的是

- A.给予盐酸氨溴索祛痰
- B.鼓励病人多饮水稀释痰液
- C.指导病人有效咳嗽促进排痰
- D.可给予雾化吸入
- E.勤给病人吸痰

2.处理支气管扩张大咯血的重要措施是

- A.保持呼吸道通畅
- B.输血
- C.抗生素
- D.镇静剂
- E.止咳药

3.肺炎病人的治疗关键是

- A.多饮水或输液
- B.祛痰、止咳
- C.吸氧
- D.选用对致病菌敏感的抗生素
- E.高热者用物理降温或给予小量退热剂

4.关于肺脓肿的护理措施,不正确的是

- A.指导病人有效咳嗽
- B.抬高床头进行体位引流
- C.遵医嘱给予青霉素静滴
- D.胸痛明显时病人宜采取患侧卧位
- E.提供高热量饮食

5.某支气管扩张病人,胸片提示病变位于左肺下叶外底段,体位引流的合适体位是

- A.取坐位或健侧卧位
- B.左侧卧位
- C.右侧卧位
- D.左侧卧位,床脚抬高 30~50 cm
- E.右侧卧位,床脚抬高 30~50 cm

6.患者,男性,25岁。因突然畏寒、高热

伴右胸痛 1 天入院。胸部透视,见右中肺有大片浅淡阴影,最可能诊断为肺炎球菌肺炎,住院后经青霉素肌注,3 天后体温接近正常,病人尚有轻度咳嗽,咳痰,稍感憋气。目前对该病人的主要护理措施不妥的是

- A.卧床休息为主,适当下床活动
- B.必要时给予氧气吸入
- C.应用解热镇痛药
- D.应用祛痰止咳药
- E.遵医嘱继续使用抗生素

7.患者,男性,67岁。有 25 年吸烟史,咳嗽 12 年,近两个月左胸痛,反复痰中带血,后确诊为小细胞癌,进行化疗与放疗联合治疗,说法正确的是

- A.放疗结束后可以将皮肤上的标志擦去
- B.皮肤照射部位贴上胶布予以保护
- C.照射部位避免阳光照射或冷热刺激
- D.洗澡时可以用碱性肥皂
- E.照射部位可以用碘酊、红汞涂擦消毒

8.关于气胸的护理说法正确的是

- A.进行深呼吸锻炼,避免咳嗽
- B.为消除病人紧张,静脉注射镇静剂
- C.为使肺泡复张,每日进行屏气练习
- D.保持大便通畅,防止排便用力
- E.绝对卧床 1 周

9.胸腔闭式引流的护理措施中,说法错误的是

- A.置管前向病人简要说明手术意义及过程
- B.在插管、引流排气和处理伤口时要注意无菌操作
- C.引流术后连续观察排气情况
- D.置管侧肢体要制动,以防引流管脱出

E.病人床旁应备一止血钳,以防应急情况

10.患者,女性,65岁。以呼吸衰竭入院,入院后急查动脉血气分析:PaO<sub>2</sub> 40 mmHg, PaCO<sub>2</sub> 65 mmHg, 血钾 3.1 mmol/L, 血钠 130 mmol/L 双下肢水肿。不正确的处理措施是

- A.保持呼吸道通畅
- B.低浓度吸氧
- C.纠正电解质平衡
- D.抗感染治疗
- E.尽早重度脱水,预防脑疝发生

11.不属于胸腔穿刺的适应证的是

- A.胸腔积液性质不明者
- B.胸腔大量积液或气胸者
- C.脓胸病人进行抽脓灌洗治疗
- D.胸部肿块进行诊断性穿刺
- E.恶性胸腔积液需胸腔内注入药物者

12.患者,男性,16岁。自诉半月前吃花生时发生呛咳,此后间断咳嗽,近期加重,偶有痰液咳出,X线检查无异常,为进一步明确诊断,首先需要做哪些检查

- A.胸部 B 超
- B.肺功能
- C.肺 CT
- D.气管镜
- E.血气分析

13.病人行纤维支气管镜检查后,护士需要观察的内容不包括

- A.有无声音嘶哑或咽痛
- B.有无发热、胸痛
- C.有无痰中带血或血痰
- D.有无球结膜水肿
- E.有无胸闷或呼吸困难

14.患者,女性,35岁。无明显诱因出现发热,体温最高 39℃,并出现憋气,进行性呼吸困难,监护显示:P 125次/分,SPO<sub>2</sub> 90%,吸氧 4 L/min。既往体健。病人首先需要进行的检查是

- A.肺功能
- B.胸部 CT
- C.超声心动
- D.血气分析
- E.气管镜

15.洋地黄用药护理中不正确的是

- A.不与维拉帕米、钙剂等合用
- B.当脉搏少于 50 次/分时应暂停服药
- C.用毛花苷 C 时可静脉小壶缓慢滴注
- D.静注药物同时需要监测心率变化
- E.一旦出现中毒症状应立即停药

16.患者,女性。住院期间活动后反复发生心绞痛,遵医嘱给予硝酸甘油静脉泵入,用药后出现面部潮红、头胀痛、头昏、心动过速,正确的处理方法是

- A.立即停止用药
- B.嘱病人平卧一段时间
- C.给予抗过敏治疗
- D.适当限制活动
- E.舌下含服硝酸甘油

17.急性心肌炎病人,反复出现阿-斯综合征,心电图示三度房室传导阻滞,最恰当的处理是

- A.静滴异丙肾上腺素
- B.静滴阿托品
- C.静滴硝酸甘油
- D.安置人工心脏起搏器
- E.静滴肾上腺素

18.病人进行人工心脏起搏器术后即将出院,对其指导不正确的是

- A.教会病人自数脉搏
- B.避免手术部位进行电复律
- C.术侧上肢可提重物
- D.脉搏比设定频率降低 10%应及时更换电池
- E.避免做 MR 检查

19.患者,男性,50岁。高血压病 5 年,近半个月来间断胸骨后或心前区疼痛,持续 3~5 分钟,休息后可缓解。入院检查确诊为

心绞痛,诊断此病最为可靠的方法是

- A.心电图
- B.选择性冠状动脉造影术
- C.查血肌钙蛋白
- D.查血心肌酶
- E.运动试验

20.冠状动脉造影术后护理措施不正确的最

- A.心理护理
- B.术后严密监测心率、血压变化
- C.术后观察足背动脉搏动情况
- D.术后动脉穿刺处沙袋压迫6小时
- E.术侧肢体制动24小时

21.不适宜行经皮穿刺腔内冠状动脉成形术的病人是

- A.稳定型心绞痛疗效欠佳
- B.不稳定型心绞痛病人造影示单支病变
- C.冠脉旁路移植术后移植血管狭窄
- D.冠脉成形术后再狭窄
- E.冠状动脉发生痉挛者

22.经皮穿刺腔内冠状动脉成形术术前禁食时间为

- A.2小时
- B.4小时
- C.6小时
- D.8小时
- E.12小时

23.不属于经皮穿刺腔内冠状动脉成形术并发症的是

- A.冠状动脉闭塞
- B.严重室性心律失常
- C.冠状动脉夹层
- D.冠状动脉破裂
- E.支架脱落

24.经皮穿刺冠状动脉内支架安置术的适应证中,正确的是

- A.冠状动脉成形术治疗引起的冠脉急性闭塞

B.冠状动脉成形术治疗引起的成形处有血栓

C.左主干病变无保护措施暂不宜行冠状动脉成形术者

- D.病变血管直径 $>1.5\text{ mm}$
- E.冠脉多支病变

25.经皮穿刺冠状动脉内支架安置术,正确的护理措施是

- A.术前12小时禁食水
- B.术前6小时禁食口服药
- C.术后术侧肢体制动24小时
- D.伤口沙袋压迫12小时
- E.动脉穿刺部位按压15~20分钟

26.患者,女性,46岁。因持续腹痛、腹泻1天入院,伴呕吐,有食用街边快餐及饮用冷冻水等不洁饮食史,目前病人最主要的护理问题是

- A.疼痛:与胃的急性炎症有关
- B.营养失调:低于机体需要量
- C.恐惧:害怕出血危及生命
- D.体液不足:与持续腹泻、呕吐有关
- E.活动无耐力:与体液丢失过多有关

27.患者,女性,45岁。诊断原发性肝癌5个月余,肝区胀痛难忍,用什么方法减轻病人的疼痛效果较好

- A.舒适的环境和体位
- B.保持良好的心理状态
- C.教会病人放松的技巧,鼓励参与可转移注意力的活动
- D.在疼痛发生前给予镇痛药物
- E.采取化疗放疗等综合措施

28.急性胰腺炎病人,为减轻疼痛,护士可协助其采取的卧位是

- A.俯卧
- B.去枕平卧
- C.头低脚高
- D.屈膝侧卧
- E.半坐卧位

29.肝穿刺活体组织检查术适用于

- A.原因不明的黄疸  
 B.全身情况衰竭者  
 C.肝外阻塞性黄疸  
 D.肝功能严重障碍者  
 E.肝包虫病
- 30.早期诊断胃癌最有效的检查方法是  
 A.胃液分析  
 B.大便潜血试验  
 C.X线钡餐检查  
 D.纤维胃镜检查  
 E.B超检查
- 31.行上消化道内镜检查术时病人采取的体位是  
 A.仰卧位  
 B.左侧卧位,双腿伸直  
 C.右侧卧位,双腿伸直  
 D.左侧卧位,双腿屈曲  
 E.右侧卧位,双腿屈曲
- 32.可以做胃镜检查是  
 A.腐蚀性食管炎的病人  
 B.严重凝血功能障碍者  
 C.神志不清者  
 D.严重心肺、肝肺功能不全者  
 E.上消化道出血
- 33.急性肾小球肾炎的饮食护理原则不正确的为  
 A.控制水、盐摄入量:水肿及高血压者低盐饮食  
 B.每日水总摄入量=前一日尿量+不显性失水量  
 C.指导病人低蛋白饮食  
 D.鼓励食用富含钾食品  
 E.饮食清淡,不食刺激性食物
- 34.肾病综合征最常见的并发症是  
 A.感染  
 B.血栓形成  
 C.急性肾衰竭  
 D.动脉硬化  
 E.心力衰竭
- 35.急性肾衰竭病人的护理措施不正确的是  
 A.给予高生物效价的优质蛋白,摄入量限制为 $0.8\text{ g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$   
 B.增加含钾高的食物摄入  
 C.尽可能减少钠、氯的摄入量  
 D.恢复期应增强体质,适当锻炼  
 E.注意个人卫生,避免手术、外伤等
- 36.腹膜透析的禁忌证不包括  
 A.腹部手术后  
 B.严重肺功能不全  
 C.长期蛋白质摄入不足  
 D.高分解代谢  
 E.高钾血症
- 37.不属于腹膜透析适应证的是  
 A.肾盂肾炎  
 B.急性肾衰竭  
 C.急性药物中毒  
 D.严重水、电解质失衡  
 E.肾移植术前准备
- 38.经皮穿刺肾活组织检查术的适应证不包括  
 A.急性肾小球肾炎病理分型  
 B.无症状性血尿  
 C.无症状性蛋白尿  
 D.慢性肾盂肾炎指导治疗  
 E.移植术后确定排斥或炎症复发
- 39.不属于经皮穿刺肾活组织检查术的绝对禁忌证的是  
 A.明显出血倾向  
 B.孤立肾  
 C.尿路梗阻  
 D.小肾或固缩肾  
 E.重度高血压
- 40.患者,女性,25岁。因缺铁性贫血住院治疗,饮食指导病人进食含铁丰富的食物。则下列食物中应少选择的是  
 A.鸡肉  
 B.海带



- C.木耳
- D.猪肝
- E.牛奶

41.患者,女性,37岁。实验室检查显示:红细胞 $3.9 \times 10^{12}/L$ ,血红蛋白 $107 g/L$ ,白细胞 $6.1 \times 10^9/L$ ,血小板 $47 \times 10^9/L$ 。入院后护士在进行临床观察室,应该特别警惕的是病人出现

- A.贫血
- B.感染
- C.晕厥
- D.出血
- E.低血压

42.患者,男性,32岁。临床诊断为急性淋巴细胞白血病,化疗达到完全缓解后进行了异基因骨髓移植,移植术后护理措施最重要的是

- A.防止出血
- B.心理护理
- C.预防贫血
- D.用药的护理
- E.预防和控制感染

43.患者,男性。诊断为白血病。目前出现高热 $39.6^{\circ}C$ ,有咳嗽、咳痰,病人最适合的降温措施是

- A.遵医嘱给抗生素
- B.遵医嘱给退热药
- C.乙醇擦浴
- D.大血管处放冰袋
- E.冰水灌肠

44.病人诊断为白血病,使用柔红霉素进行化疗,护理人员应观察的药物不良反应主要是

- A.出血性膀胱炎
- B.末梢神经炎
- C.心肌损害
- D.高尿酸血症
- E.口腔溃疡

45.甲状腺功能亢进病人避免吃海带等

海产品的理由是

- A.减少纤维素摄入
- B.避免对胃刺激
- C.避免过敏
- D.避免甲状腺素合成过多
- E.避免消化不良

46.系统性红斑狼疮病人应避免的食物是

- A.青菜
- B.蘑菇
- C.绿豆
- D.胡萝卜
- E.花生

47.类风湿关节炎缓解期最主要的护理措施是

- A.病情观察
- B.饮食指导
- C.观察药物的作用和副作用
- D.指导关节功能锻炼
- E.控制感染

48.患者,男性,50岁。穿短袖短裤于田间喷洒农药,未戴口罩。出现胸闷、咳嗽、呼吸困难、发绀,呼气有大蒜味,紧急送往医院,诊断有机磷农药中毒。处置不正确的是

- A.洗胃
- B.脱去衣,肥皂水冲洗皮肤
- C.吸氧
- D.阿托品
- E.解磷定

49.中暑使用氯丙嗪降温时,应注意观察

- A.瞳孔
- B.血氧
- C.血压
- D.过敏
- E.出血

50.有关狂犬病病人的护理错误的是

- A.须防病人在痉挛发作中抓伤咬伤,因此应当常规固定病人四肢,限制活动
- B.单间接触隔离。被病人唾液污染的

用品均应消毒

C.病室内保持绝对安静,防止音、光、水、风等刺激

D.若可能给予流食或半流食,必要时咽部用 0.5%~1%丁卡因喷雾后鼻饲

E.密切观察生命体征;留意呼吸频率;节律的改变,血氧饱和度的变化

51.患者,男性,35岁。轻度乏力,腹胀,ALT 350 U/L,抗 HAVIgM(+),抗 HBs(+),胆红素定量正常,该病人的护理措施最重要的是

A.遵医嘱给药

B.卧床休息

C.避免过度劳累

D.注意消毒隔离

E.心理护理

52.预防艾滋病的措施不包括

A.开展广泛宣传教育杜绝吸毒和性滥交

B.建立 HIV 感染的检测系统,掌握流行动态

C.放宽国境检疫,增强国际间交流

D.对供血者进行严格的 HIV 检测,确保血制品的安全性

E.提倡安全性生活

53.患者,男性,16岁。近一周来体温逐渐升高,持续发热,高达 39.0℃。早期有腹泻,无里急后重。近日出现腹胀、便秘、头晕、失眠,胃纳减退。查体:T 39.0℃,P 88次/分,R 24次/分,BP 136/72 mmHg,表情淡漠,面色灰暗,口唇轻度青紫。肝肋下 1 cm,剑突下 2 cm,脾于侧卧位可触及,约肋下 0.5 cm,右下腹压痛。查血常规,白细胞  $5.8 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞 57%,淋巴细胞 38%,单核细胞 5%。临床诊断考虑为伤寒。护士为该病人提供的护理指导中错误的是

A.做消化道隔离

B.体温正常后 1 周逐渐增加活动量

C.用物理降温的方法降温

D.可以食用牛奶、芹菜等食物

E.给予开塞露治疗便秘

54.患儿,3岁。高热 2 天,昏迷抽搐 1 天,体查:体温 40.2℃,深度昏迷,呼吸节律不规则,瞳孔缩小,脑膜刺激征阳性,血象:WBC  $22.0 \times 10^9/L$ ,N 90%,L 10%,血小板  $80 \times 10^9/L$ 。该患儿的治疗措施错误的是

A.快速静脉推注甘露醇

B.吸氧,保持气道通畅

C.立即腰椎穿刺送脑脊液检查

D.物理降温

E.应用镇静剂

55.患者,女性,60岁。因急性脑出血入院,该患者能予鼻饲进食的时间是

A.72 小时后

B.48 小时后

C.36 小时后

D.12 小时后

E.即刻

56.脑梗死病人应用扩血管药物时,滴速应控制在

A.每分钟 10 滴左右

B.每分钟 20 滴左右

C.每分钟 30 滴左右

D.每分钟 40 滴左右

E.每分钟 50 滴左右

57.吉兰-巴雷综合征的病人,出现呼吸肌重度麻痹时应首先采取的措施是

A.给予阿托品治疗

B.去枕平卧位

C.高流量吸氧

D.立即人工呼吸机械呼吸

E.迅速准备气管插管或切开

58.患者,女性,22岁。原有癫痫病史,近期自行停药。今日晨起后多次突发抽搐,间歇意识不清、二便失禁,下午急诊入院。其首选药物治疗是

A.苯妥英钠稀释于生理盐水作静脉注射

- B.20%甘露醇静脉滴注  
C.异戊巴比妥钠溶解于注射用水作静脉注射  
D.10%水合氯醛 20~30 mL 保留灌肠  
E.地西洋静脉注射
- 59.帕金森病病人的安全护理不正确的是
- A.除去所有的门槛及有尖角的家具  
B.楼梯两旁应加设栏杆  
C.垫高座椅的后脚,使病人较容易坐下或站起  
D.食物不应切成小块或磨碎,避免进食时呛咳  
E.厕所、浴室内增设扶手
- 60.患者,女性,61岁。因重症肌无力收治入院。目前表现为吞咽困难、进食时间延长、饮水呛咳等咀嚼肌和咽喉肌受累症状。对于其饮食指导不正确的是
- A.避免进食干硬或粗糖的食物  
B.服药后即可进餐  
C.进食时宜要少量慢咽  
D.有呛咳、吞咽困难时,应改用鼻饲  
E.进食前需要充分休息
- 61.脑脊液中有血液存在并存时间较长,首先考虑的是
- A.蛛网膜下腔出血  
B.白血病  
C.脑血管畸形  
D.颈椎占位  
E.脑疝
- 62.腰椎穿刺术后的病人,必须去枕平卧4~6小时,目的是为了防止
- A.穿刺部位感染  
B.低颅压性头痛  
C.穿刺部位出血  
D.脑脊液外漏  
E.颅内感染
- 63.确诊脑血管畸形的情况及程度,最明确的检查是

- A.脑 X 线检查  
B.头颅 CT 或 MRI  
C.脑 B 超  
D.脑血管造影  
E.开颅检查

64.患者,女性,31岁。以搏动性头痛就诊,初步诊断为脑血管畸形。为确诊行脑血管造影术。术后出现胸闷、气短、剧烈呕吐、大片皮疹等症状,最可能的是

- A.脑脊液外漏  
B.病情加重  
C.并发颅内感染  
D.脑疝  
E.造影剂过敏

65.患者,女性,35岁。因鼻塞、流清涕、咽痛并伴四肢对称性无力收治入院,确诊为吉兰-巴雷综合征,经治疗恢复。出院时,护士对其的健康指导不正确的是

- A.帮助病人及家属掌握本病的自我护理方法以及有关的知识  
B.肢体不能完全恢复病前的功能  
C.增强体质,避免感冒、疲劳等诱发因素  
D.坚持肢体的被动和主动运动  
E.加强康复锻炼和日常生活自理能力的训练

(66~68题共用题干)

患者,男性,80岁。有慢性支气管炎病史20年。一周前受凉后再次出现咳嗽、咳痰,痰白质黏,伴有呼吸困难、胸闷、乏力。以“慢性阻塞性肺疾病”入院治疗。

66.入院后,病人出现口唇发绀,呈端坐呼吸,护理人员应重点监测

- A.24小时尿量  
B.意识状态  
C.血电解质  
D.呼吸的频率、节律及深度  
E.血压、脉搏

67.如果病人病情进一步发展,呼吸困难

加重,脓痰不易咳出。对病人保持呼吸道通畅的有效措施不正确的是

- A.胸部叩击时,嘱病人侧卧位,在餐后 2 小时至餐前 30 分钟完成
- B.雾化吸入一般 10~20 分钟,激素类药物吸入后指导病人漱口
- C.吸痰前给予病人高浓度氧气,吸痰后不给氧,每次吸引时间不超过 15 秒
- D.遵医嘱应用支气管舒张剂
- E.鼓励病人多饮水

68.当病人经治疗后病情明显缓解,指导病人进行呼吸功能锻炼的方法是

- A.加强胸式呼吸,用鼻吸气,经口用力快速呼气
- B.加强腹式呼吸,用鼻深吸,经口缓呼,呼气时口唇收拢
- C.加强腹式呼吸,用鼻吸气,经口用力快速呼气
- D.加强胸式呼吸,经鼻用力呼气
- E.同时加强胸式和腹式呼吸

(69~71 题共用题干)

患者,男性,65 岁。三日内活动中突发晕厥伴意识丧失两次,急诊以“晕厥原因待查”收住入院。

69.护士对该病人病情观察不包含

- A.意识状态
- B.心律的变化
- C.生命体征
- D.心率的变化
- E.血糖的变化

70.入院心电图示第三度房室传导阻滞,给予的常规护理,不妥的是

- A.绝对卧床休息
- B.心电监护
- C.少食多餐,不宜过饱
- D.正常活动,诱发晕厥辅助诊断
- E.避免不良刺激

71.该病人 2 日未排便,不恰当的护理措施是

A.心理疏导:向病人解释床上排便对控制病情的重要意义

B.指导进食清淡易消化含纤维素丰富的食物

C.适当腹部按摩(按顺时针方向)以促进肠蠕动

D.遵医嘱给予通便药物或灌肠

E.指导病人增加活动量,用力排便

(72~74 题共用题干)

患者,男性,60 岁。主因“血压升高 3 年,加重 1 天”入院。病人 3 年前诊断为原发性高血压,间断服降压药,血压在 160/110~140/90 mmHg 之间。1 天前因和家人吵架后突发剧烈头痛,急诊入院。入院后量血压 190/140 mmHg。入院诊断为:3 级高血压,高血压急症。

72.病人入院后给予的护理措施中不正确的是

- A.卧床休息,降低床头
- B.吸氧
- C.安定情绪
- D.保持病室安静
- E.尽早应用降压药物

73.饮食护理中建议每天的钠盐摄入量应低于

- A.3 g
- B.4 g
- C.5 g
- D.6 g
- E.7 g

74.选用硝普钠降压时,开始剂量为

- A.1~10  $\mu\text{g}/\text{min}$
- B.10~25  $\mu\text{g}/\text{min}$
- C.25~30  $\mu\text{g}/\text{min}$
- D.30~40  $\mu\text{g}/\text{min}$
- E.40~50  $\mu\text{g}/\text{min}$

(75~78 题共用题干)

患者,女性,41 岁。腹泻 1 个月,伴有腹痛、腹胀,诊断:溃疡性结肠。

75. 护士应注意观察病变活动期间病人腹泻的情况,可能出现

- A. 便条变细
- B. 柏油样便
- C. 成形便
- D. 黏液脓血便
- E. 米泔水样便

76. 病人使用柳氮磺吡啶治疗应注意出现的不良反应是

- A. 皮疹
- B. 嗜睡
- C. 腹泻
- D. 头晕
- E. 头痛

77. 病人目前腹泻严重,不恰当的处理措施是

- A. 稳定病人的情绪
- B. 禁食
- C. 及时补充水、电解质
- D. 大量使用止泻药物控制症状
- E. 观察有无脱水表现

78. 诊断溃疡性结肠炎最重要手段是

- A. CT 检查
- B. B 超检查
- C. 腹部 X-ray 检查
- D. 腹部平片
- E. 结肠镜检查

(79~81 题共用题干)

患者,男性,40 岁。既往肝硬化食管静脉曲张破裂出血病史。今晨起床呕血 4 次,量约为 1 200 mL,黑便 2 次,伴头昏、心悸。入院检查:血压 60/45 mmHg。心率 180 次/分,巩膜黄染,腹部膨隆,移动性浊音阳性。

79. 该病人目前最主要的护理诊断是

- A. 皮肤完整性受损
- B. 有感染的危险
- C. 知识缺乏
- D. 组织灌注量改变
- E. 焦虑

80. 此时首先应采取的护理措施是

- A. 准备肌注止血药物
- B. 静脉补充血容量
- C. 准备抗酸药物
- D. 准备急查 B 超
- E. 嘱病人严格卧床休息

81. 对病人应采取的护理措施中不包括

- A. 立即补液
- B. 下胃管
- C. 给予止血药
- D. 准备输库存血
- E. 内窥镜下止血治疗

(82~84 题共用题干)

患者,男性,42 岁。消化性溃疡病史 10 余年,期间发生溃疡出血多次,入院后经检查血红蛋白 80 g/L,红细胞  $3.2 \times 10^9/L$ ,诊断为缺铁性贫血。

82. 该病人贫血的主要原因是

- A. 铁的摄入量太少
- B. 缺乏叶酸
- C. 慢性失血
- D. 骨髓造血功能障碍
- E. 胃酸不足,影响铁的吸收

83. 病人治疗时最重要的治疗原则是

- A. 输血
- B. 铁剂治疗
- C. 病因治疗
- D. 中医治疗
- E. 补充营养

84. 病人遵医嘱服用铁剂治疗,但服用铁剂后出现黑便,可能的原因是

- A. 引起上消化道出血
- B. 肠黏膜破溃出血
- C. 应激性溃疡
- D. 胃肠道小血管破裂出血
- E. 与肠道内硫化氢生成黑色硫化铁

(85~87 题共用题干)

王女士,38 岁。近期由于体检查出血糖高于正常而来医院就诊。

85.经检查王女士确诊糖尿病。医生建议王女士控制饮食,增加运动,同时加用降糖药物。王女士饮食原则不正确的是

- A.限制每日摄入的总热量
- B.合理的饮食结构,按比例安排三大营养的热量
- C.饿了就吃,少食多餐
- D.与运动、药物密切配合
- E.形成规律,长期坚持

86.王女士在今后的生活中的做法正确的是

- A.糖化血红蛋白是检验血糖控制的金标准,应2~3个月检查一次
- B.打完胰岛素后还可以测空腹血糖,因为还没有吃早饭
- C.可以像正常人一样饮酒
- D.监测空腹血糖时,禁食4小时以上
- E.监测餐后两小时血糖时,从吃完饭开始计时

87.经过一段时间治疗,王女士血糖控制良好,复查时医生对其胰岛素剂量进行了调整,但王女士担心血糖升高,仍按以前剂量注射,一天上午她正在上班,忽然出现心慌、大汗症状,这是因为发生了

- A.低血糖
- B.高血糖
- C.酮症酸中毒

D.慢性并发症

E.感染

(88~89题共用题干)

患者,女性,20岁。因“突起高热3天”从发热门诊收入院。查体:体温39.7℃,脉搏120次/分,律不齐,对光反应迟钝,肺部可闻及干、湿啰音,颈强直(+)。初步诊断为“流行性乙型脑炎”。

88.高热引起惊厥、抽搐时的处理为

- A.降温,以物理降温为主,药物降温为辅,同时可减低室温
- B.以脱水为主,必要时可合并使用肾上腺皮质激素、速尿等
- C.使用镇静剂,首选地西泮
- D.以吸痰、给氧为主,保持气道通畅,必要时气管切开插管
- E.及时处理高热、抽搐、呼吸衰竭

89.护士在巡视病人的过程中,发现病人出现肢体发紧,双目凝视,考虑为惊厥。处理措施中错误的是

- A.将病人放置仰卧位,头偏向一侧
- B.松解衣服和领口
- C.将纱布包好的压舌板置于上下磨牙之间
- D.按住病人的上下肢,以免发生坠床和意外伤害
- E.保持病室安静

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(90~92题共用备选答案)

- A.遵医嘱立即退热降温
- B.绝对卧床休息
- C.遵医嘱给予抗生素控制感染
- D.超声雾化吸入
- E.饮水在1500mL以上

90.患者,女性,20岁。感冒后出现咳嗽、胸痛,近1天来出现持续高热,体温39℃。体

检:右中肺叩诊浊音,闻及湿啰音。胸片显示肺纹理增多。目前首要的护理措施是

91.患者,女性,25岁。淋雨后打喷嚏、咳嗽、鼻塞、流涕,开始为清水样,3天后变稠。伴有咽痛,轻度畏寒、头痛。近2天又出现了耳痛、耳鸣、听力减退、外耳道流脓。对此病人行之有效的护理措施是

92.患者,男性,23岁。4天前出现频繁

干咳,伴有胸骨后不适,乏力,未予重视。昨日出现咳嗽、咳吐黏液脓痰,痰中偶有血丝。体检:肺部散在干、湿啰音,X线示肺纹理增粗。此病人有效的排痰措施是

(93~94题共用备选答案)

- A.直立性低血压
- B.低钾血症
- C.胃肠道反应
- D.高钾血症
- E.嗜睡

93.噻嗪类利尿剂的主要不良反应是

94.ACE抑制剂的不良反应是

(95~96题共用备选答案)

- A.低脂、低纤维饮食
- B.静脉内高营养治疗
- C.禁食
- D.高脂、高纤维饮食

E.易发酵的食物

95.肠结核腹泻严重者应予

96.肠结核腹胀者应少食

(97~100题共用备选答案)

A.蛋白摄入 $0.6\sim 0.8\text{ g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ,减少植物蛋白质摄入

B.正常量优质蛋白

C.蛋白摄入 $1.2\sim 1.4\text{ g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ,优质蛋白为主

D.蛋白摄入 $0.8\text{ g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ,适量补充必需氨基酸

E.蛋白摄入 $0.6\sim 0.7\text{ g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ,优质蛋白为主

97.慢性肾衰行血液透析病人

98.慢性肾衰病人 $\text{GFR}<50\text{ mL}/\text{min}$

99.急性肾衰竭病人

100.肾病综合征尚无肾功能不全者



考前点睛班