

# 国家执业药师资格考试经典 500 考题

## 药学专业知识 (二)

金英杰国家医学考试研究中心 编

编委会成员 赵鸿峰 刘 洋 王冬竹  
冯冰凌 李 娜 查文琴  
王 洁 杨 玥 李月莲  
杨 雪

# 亲爱的考生您好：

请添加微信号，并**回复“考试”，进入“2019执业药师备考交流群”**，金英杰专业指导员  
每日定期发送纯干货备考资料，以及报名指导流程图解，药师报考咨询第一时间掌握。  
本书内存过大，后续内容请在群内领取。

祝您考试顺利！



模拟试卷（一）

规定时间：120 分钟 自测时间\_\_\_\_\_ 试题预计完成时间\_\_\_\_\_

一、最佳选择题

1. 可以降低尿酸水平 但 升高尿酸水平 而易导致肾结石的抗痛风药是



- A. 秋水仙碱

C. 丙磺舒

E. 布洛芬
- B. 别嘌醇

D. 吠塞米

2. 治疗男性阴茎勃起障碍宜选用的药物是

- A. 氯米芬

C. 他莫昔芬

E. 西地那非
- B. 苯丙酸诺龙

D. 乙酚

3. 宜选用利多卡因治疗的疾病是

- A. 心房扑动

C. 心房颤动

E. 阵发性室上性心动过速
- B. 房室早搏

D. 急性心肌梗死引起的室性心律失常

(2017 年真题) 4. 调整患者的抗抑郁药需要谨慎 以单胺氧化酶抑制剂替换选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂时 应该间隔一段时间 至少应间隔

- A. 1 天

C. 7 天

E. 14 天
- B. 5 天

D. 10 天

5. 地塞米松的禁忌证是

- A. 抑郁症

C. 荨麻疹

E. 活动性消化性溃疡
- B. 支气管哮喘

D. 心绞痛

6. 苯巴比妥显效慢的主要原因是

- A. 吸收不良

C. 肾排泄慢

E. 血浆蛋白结合率低
- B. 体内再分布

D. 脂溶性低

7. 与肝素相比 华法林的作用特点不包括

- A. 口服有效 应用方便

C. 起效快

E. 在体外无抗凝血作用
- B. 价格便宜

D. 作用持久

(2017 年真题) 8. 西酞普兰抗抑郁的药理作用机制是



- A. 抑制 5-羟色胺再摄取

C. 抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取

E. 阻断 5-羟色胺受体及抑制 5-羟色胺再摄取
- B. 抑制神经末梢突触  $\alpha_1$  受体

D. 抑制单胺氧化酶

9. 毛果芸香碱可作用于

- A.  $\alpha_1$  受体

C.  $\beta_1$  受体

E. M 受体
- B.  $\alpha_2$  受体

D.  $\beta_2$  受体

10. 长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

- A. 动脉粥样硬化

C. 血小板减少症

E. 胃食管反流病
- B. 应激性大出血

D. 骨质疏松性骨折

11. 泼尼松可治疗的疾病是

- A. 高血压

C. 风湿及类风湿关节炎

E. 粒细胞增多症
- B. 心律失常

D. 骨质疏松

(2017 年真题) 12. 为避免引起大面积中毒表皮坏死松解症 服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因 (HLA-B \*57:02) 检测的抗癫痫药是

- A. 卡马西平

C. 氯硝西泮

E. 加巴喷丁
- B. 丙戊酸钠

D. 托吡酯

13. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

- A. 沙美特罗

C. 多索茶碱

E. 噻托溴铵
- B. 孟鲁司特

D. 布地奈德

14. 静脉注射地西泮速度过快时引起的不良反应是

- A. 惊厥

C. 血钙下降
- B. 心跳加快

D. 血糖升高

E.呼吸暂停

15.对耐青霉素和头孢菌素类革兰阳性菌严重感染有效的抗菌药为

4. 哌拉西林

8. 氨曲南

C. 阿莫西林

D. 万古霉素

E. 庆大霉素

16. 痛风急性期禁用的药物是

4. 秋水仙碱

8. 别嘌醇

C. 布洛芬

D. 舒林酸

E. 泼尼松

17. 妊娠期高血压妇女宜选用的药物是

4. 福辛普利

8. 利血平

C. 厄贝沙坦

D. 阿利克伦

E. 甲基多巴

18. 老年人对苯二氮类药物较为敏感 用药后可致平衡功能失调 觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状 在临床上被称为

4. 震颤麻痹综合征

8. 老年期痴呆

C. “宿醉”现象

D. 戒断综合征

E. 锥体外系反应

19. 丙米嗪的药理作用是

4. 抗精神病药

8. 抗抑郁作用

C. 镇吐作用

D. 收缩外周血管作用

E. 抗癫痫作用

20. 具有类似磺胺结构 对磺胺类有过敏史的患者须慎用的非甾体药物是

4. 阿司匹林

8. 吲哚美辛

C. 双氯芬酸钠

D. 美托洛尔

E. 塞来昔布

21. 伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者 在服用镇咳药的同时 应及时联合应用的药物是

4. 左氧氟沙星

8. 羧甲司坦

C. 泼尼松龙

D. 多索茶碱

E. 右美沙芬

22. 李女士来到药房咨询 主诉最近服用下列药物后体重有所增加 请药师确认可能增加体重的药物是

4. 二甲双胍

8. 辛伐他汀

C. 米氮平

D. 阿司匹林

E. 硝酸甘油

23. 良性前列腺增生药物治疗的短期目标是

4. 延缓临床进展 预防并发症

8. 缓解患者的下尿路症状

C. 缓解患者的上尿路症状

D. 预防急性尿潴留

E. 彻底治愈

24. 抑制尿酸生成的药物是

4. 秋水仙碱

8. 萘普生

C. 苯溴马隆

D. 氢氯噻嗪

E. 别嘌醇

25. 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药物是

4. 夫西地酸

8. 磷霉素

C. 万古霉素

D. 莫西沙星

E. 氯霉素

26. 下列药物中 属于酰胺类脑功能改善及抗记忆障碍药的是

4. 吡拉西坦

8. 胞磷胆碱

C. 利斯的明

D. 多奈哌齐

E. 石杉碱甲

27. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放 从而降低眼内压

4. 噻吗洛尔

8. 毛果芸香碱

C. 拉坦前列素

D. 地匹福林

E. 阿托品

28. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

4. 吸入性糖皮质激素+长效β<sub>2</sub>受体激动剂

8. 吸入性糖皮质激素+短效β<sub>2</sub>受体激动剂

C. 长效β<sub>2</sub>受体激动剂+长效M胆碱受体阻断剂

D. 长效M胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂



E. 长效β<sub>2</sub>受体激动剂+白三烯受体阻断剂

29. 通过阻断延脑催吐化学感受区D<sub>2</sub>受体而止吐的药物是

- A. 多潘立酮  
C. 甲氧氯普胺  
E. 奥美拉唑

- B. 昂丹司琼  
D. 西沙必利

30. 我国将**吗啡**列为严格管制药物 原因是其长期使用可能产生 A.  
免疫抑制  
B. 嗜睡  
C. 呼吸抑制  
D. 中枢抑制  
E. 药物依赖性

31. 治疗强心苷中毒引起的**室性心律失常**宜选用的药物是 A.   维拉帕米  
B. 普罗帕酮  
C. 胺碘酮  
D. 普萘洛尔  
E. 苯妥英钠

(2017 年真题) 32. 关于**镇咳药**作用强度的比较 正确的是  
A. 喷托维林> 苯丙哌林> 可待因  
B. 可待因> 苯丙哌林> 喷托维林  
C. 苯丙哌林> 喷托维林> 可待因  
D. 苯丙哌林> 可待因> 喷托维林  
E. 喷托维林> 可待因> 苯丙哌林

33. **毛果芸香碱**属于  
A. M、N 胆碱受体激动剂  
B. M 胆碱受体激动剂  
C. N 胆碱受体激动剂  
D. M 胆碱受体拮抗剂  
E. N 胆碱受体拮抗剂

34. **强心苷**的作用机制不包括  
A. 抑制  $Na^+ - K^+ - ATP$  酶  
B. 使细胞内  $Na^+$  减少  $K^+$  增多  
C. 使细胞内  $Na^+$  增多  $K^+$  减少  
D. 使细胞内  $Ca^{2+}$  增多  
E. 促使肌浆网  $Ca^{2+}$  释放

35. 阻止肝脏氢醌型**维生素 K** 生成的抗凝药是  
A. 肝素  
B. 链激酶  
C. 双嘧达莫  
D. 华法林  
E. 噻氯匹啶

(2017 年真题) 36. 服用后可能导致口中有**氨味** **舌苔**、**大便呈灰黑色** 的药物是



- A. 奥美拉唑  
B. 硫糖铝  
C. 枸橼酸铋钾  
D. 西咪替丁  
E. 泮托拉唑

37. **青霉素**的抗菌谱不包括

- A. 梅毒  
B. 肺炎球菌  
C. 破伤风杆菌  
D. 伤寒杆菌  
E. 钩端螺旋体

38. 关于**强心苷正性肌力作用**特点的叙述 错误的是 A.  
对正常人和心衰患者都有正性肌力作用

- B. 使心肌收缩增强而敏捷  
C. 提高心脏做功效率 心输出量增加  
D. 使衰竭心脏耗氧量减少  
E. 使正常心脏耗氧量减少

39. **地高辛**的不良反应是  
A. 高尿酸血症  
B. 窦性心动过速  
C. 房室传导阻滞  
D. 停药反跳  
E. 血管神经水肿


(2017 年真题) 40. **西咪替丁**的禁忌证是  
A. 急性胰腺炎  
B. 胃食管反流病  
C. 卓-艾综合征  
D. 应激性溃疡  
E. 上消化道出血

## 二、配伍选择题

【41~43】

- A. 两性霉素 B  
B. 卡泊芬净  
C. 氟胞嘧啶  
D. 阿糖胞苷  
E. 酮康唑

举一反三

41. **肝毒性大** **对肝药酶影响大** 药物相互作用多的抗真菌药物是 

42. 制成**脂质体**以降低药物**肾毒性**的抗真菌药物是  

43. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的**棘白霉素类**抗真菌药物是  

【44~45】

- A. 硝酸甘油  
B. 双嘧达莫  
C. 曲美他嗪  
D. 普萘洛尔  
E. 硝苯地平

44. 扩张冠状血管作用强 可解除冠状痉挛 对**变异型心绞痛**效果好的药物是

45. 通过**阻断 β 受体 降低心肌耗氧量 改善心肌供血**的抗心绞痛药物是  
【46~47】

- A. 巴比妥

B. 硫喷妥
- C. 苯巴比妥

D. 异戊巴比妥
- E. 司可巴比妥



46. 脂溶性**低** 作用慢而长的药物是

47. 脂溶性**高** 作用持续 3~6 h 的药物是  
(2017 年真题) 【48~50】

- A. 卡马西平

B. 苯妥英钠
- C. 加巴喷丁

D. 苯巴比妥
- E. 氯硝西洋

48. 主要阻滞电压依赖性的钠通道 属于**二苯并氮杂䓬类**抗癫痫药的是  

49. 减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定 属于**乙内酰脲类**抗癫痫药的是



举一反三

50. 可激动 γ-氨基丁酸 (GABA) 受体和阻滞钠通道 属于**苯二氮杂䓬类**抗癫痫药的是



举一反三

【51~52】

- A. 氢氯噻嗪

B. 呋塞米
- C. 螺内酯

D. 乙酰唑胺
- E. 甘露醇

51. **抑制髓袂升支粗段**的  $Na^+-K^+-2Cl^-$  同向转运系统的药物是

52. 可用于治疗**尿崩症**的药物是

【53~55】

- A. 氯喹

B. 乙胺嘧啶
- C. 伯氨喹

D. 甲硝唑
- E. 吡喹酮

53. 主要用于**控制疟疾复发和传播**的药物是  

54. 主要用于**控制疟疾症状**的药物是  

55. 主要用于**疟疾预防**的药物是  

【56~57】

- A. 心脏毒性 (折返心律和传导阻滞)

B. 肺毒性 (间质性肺炎)

C. 血液毒性 (骨髓造血功能障碍)

D. 耳毒性 (耳聋)

E. 肾毒性 (血肌酐升高)

56. 抗心律失常药**胺碘酮**可致的主要用药风险是

57. 抗心力衰竭药**地高辛**可致的主要用药风险是

【58~59】

- A. 卡比多巴

B. 多奈哌齐
- C. 佐匹克隆

D. 溴隐亭
- E. 苯海索

58. 治疗**失眠症**可选用

59. 治疗**阿尔茨海默病**可选用

(2017 年真题) 【60~61】

- A. 苯甲酸钠咖啡因

B. 纳洛酮
- C. 阿托品

D. 氟马西尼
- E. 溴吡斯的明

60. 可**增强咖啡对平滑肌的松弛**作用的药物是

61. 可用于**吗啡中毒解救**的药物是

【62~64】

- A. 左氧氟沙星滴眼液

B. 复方托吡卡胺滴眼液
- C. 毛果芸香碱滴眼液

D. 碘苷滴眼液
- E. 阿昔洛韦滴眼液

62. **散瞳**和**调节睫状肌麻痹**宜选用

63. 治疗**青光眼**宜选用

64. 治疗**细菌性结膜炎**宜选用

【65~68】

- A. 普萘洛尔

B. 尼莫地平
- C. 利血平

D. 硝苯地平
- E. 氢氯噻嗪

65. 高血压伴**甲状腺功能亢进者**宜选用

66. 高血压伴**变异型心绞痛者**宜选用

67. 高血压伴**精神抑郁者**不宜选用

68. 高血压伴**糖尿病者**不宜选用

【69~70】

- A. 卡马西平


B. 苯妥英钠



C. 乙琥胺 D. 硫酸镁

E. 加巴喷丁

69. 长期用药可引起**牙龈增生**的药物是  

70. 治疗**伴有精神症状**的癫痫的药物是  

(2017 年真题)【71~72】

A. 喷托维林 B. 苯丙哌林

C. 可待因 D. 右美沙芬

E. 羧甲司坦

71. 选择性抑制延髓咳嗽中枢 并具有微弱的**阿托品样作用** 适用于各种原因引起**无痰干咳**的药物是

72. 可阻断肺胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射 适用于各种原因引起的**刺激性干咳**的药物是

【73~75】

A. 阿卡波糖 B. 二甲双胍

C. 罗格列酮 D. 西格列汀

E. 格列吡嗪

73. 属于**二肽基肽酶-4 抑制剂**的药物是

74. 属于 **$\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂**的药物是

75. 属于**胰岛素增敏剂**的药物是

【76~78】

A. 氯喹 B. 青蒿素

C. 乙胺嘧啶 D. 伯氨喹

E. 奎宁

76. 近期**复发率高**

77. **病因性预防**

78. **防止复发和传播**

【79~80】

A. 青霉素 B. 四环素

C. 庆大霉素 D. 氯霉素

E. 头孢唑林

79. 治疗**钩端螺旋体病、梅毒、回归热**宜选用的药物是  

全国免费咨询热线: 400-900-9392

80. 常发生**耳毒性**和**肾毒性**的药物是  

(2017 年真题)【81~82】

A.  $1\sim5\mu\text{g/mL}$  B.  $5\sim10\mu\text{g/mL}$

C.  $5\sim20\mu\text{g/mL}$  D.  $0.5\sim1\text{ng/mL}$

E.  $20\sim40\mu\text{g/mL}$

81. 平喘药**茶碱**安全、有效的血药浓度的是

82. 强心苷类药物**地高辛**安全、有效的血药浓度是

【83~85】

A. 剧烈疼痛 B. 失眠

C. 癫痫 D. 精神分裂症

E. 风湿性关节炎

83. **丙戊酸钠**的适应证是

84. **芬太尼**的适应证是

85. **哌罗美辛**的适应证是

【86~87】

A. 甘露醇 B. 氢氯噻嗪

C. 呋塞米 D. 阿米洛利

E. 螺内酯

86. 可单独用于**轻度、早期高血压**的药物是  

87. **竞争性结合醛固酮受体**的药物是  

【88~89】

A. 丙米嗪 B. 氟西汀

C. 马普替林 D. 吗氯贝胺

E. 苯乙肼

88. 属于**选择性 5-HT 再摄取抑制剂**的药物是

89. 属于**抑制去甲肾上腺素及 5-HT 再摄取**的药物是

(2017 年真题)【90~92】

A. 血糖升高 B. 尿酸升高

C. 低镁血症 D. 定向力障碍

E. 胀气

90. 抗酸剂**碳酸氢钠**引起的典型不良反应是

91. 抗酸剂**西咪替丁**可引起的典型不良反应是

92. 抑酸剂**泮托拉唑**长期应用可引起的典型不良反应是

【93~97】

- A. 阿法骨化醇

B. 依降钙素
- C. 葡萄糖酸钙

D. 阿仑膦酸钠
- E. 帕米膦酸二钠

93. 治疗**钙缺乏症**可选用

94. 促进**钙剂吸收**可选用

95. 治疗绝经后妇女的**骨质疏松**可选用

96. 治疗**恶性肿瘤患者骨转移疼痛**可选用

97. 治疗**维生素 D 中毒**导致的变应性骨炎可选用

(2017 年真题)【98~100】

- A. 甲氧氯普胺

B. 多潘立酮
- C. 莫沙必利

D. 昂丹司琼
- E. 阿瑞吡坦

98. 属于**中枢和外周多巴胺 D<sub>2</sub> 受体阻断剂** 具有**镇吐、刺激泌乳素释放**的促胃动力药是

99. 属于**外周多巴胺受体阻断剂** 直接**阻断胃肠道多巴胺 D<sub>2</sub> 受体**的促胃动力药是

100. 属于**选择性 5-HT<sub>4</sub> 受体激动剂** **促进乙酰胆碱释放**的促胃动力药是

三、综合分析选择题

(一)

【101~103】

患者 男 56 岁 有高血压病史 4 年 体检: 血压 156/96 mmHg **无主动脉狭窄** 医师处方**依那普利片**控制血压

101. 该患者若长期服用**依那普利片** 除应监测血压、心、肾功能外 还应监测的指标是

- A. 血钾

B. 血钠
- C. 血钙

D. 血氯
- E. 血镁

102. 该患者用药过程中可能发生的**典型不良反应**是 A.

- 低血糖

B. 光过敏
- C. 干咳

D. 水肿
- E. 口干

103. 服药 2 个月后 血压控制未达标 经进一步检查 该患者**伴同型半胱氨酸水平升**

高 宜联合应用的药物是

- A. 维生素 A

B. 维生素 B<sub>6</sub>
- C. 维生素 C

D. 烟酸
- E. 叶酸

(二)

【104~106】

患者 女 48 岁 5 年前患右上肺结核 痰菌阳性 经异烟肼、链霉素和乙胺丁醇治疗 6 个月 痰菌转阴 病灶明显吸收 自行停药 未再随访 近 1 个月来感乏力 2 天前起咳嗽、痰中带血就诊 X 线胸片示右上肺大片致密影 边缘不清 密度不均 高密度病灶部分隐约见有钙化 侧位病变位于肺上叶尖后段 呈团块状 约 4 cm × 4.5 cm 大小 边界毛糙 家庭中近期有人患肺结核 考虑为肺结核复发 给予抗结核药物治疗

104. 该患者系**慢乙酰化者** 需要减量的抗结核药是

- A. 异烟肼

B. 利福平
- C. 吡嗪酰胺

D. 乙胺丁醇
- E. 链霉素

105. 患者服药后便尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物呈**橘红色** 这是因为服用哪种抗结核药导致的

- A. 异烟肼

B. 利福平
- C. 吡嗪酰胺

D. 乙胺丁醇
- E. 对氨基水杨酸钠

106. 患者入院后诊断为**结核性脑膜炎** 治疗结核性脑膜炎不宜选用的抗结核药是

- A. 异烟肼



B. 链霉素
- C. 吡嗪酰胺

D. 丙硫异烟胺
- E. 环丝氨酸

(三)

【107~110】

患者 女 70 岁 拟行膝关节置换术 无磺胺类药过敏史 皮试结果呈阴性 体征和实验室检查: 低热 无感染 **空腹血糖** 4.6 mmol/L **血常规白细胞计数** 6.0 × 10<sup>9</sup>/L 手术医师处方抗菌药物预防感染

107. **首选**的抗菌药物是  



- A. 阿奇霉素

B. 头孢唑林
- C. 万古霉素

D. 克林霉素



E. 碘胺嘧啶

108. 围术期预防性用药宜采用的给药途径是  

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 口服   | B. 肌肉注射 |
| C. 静脉滴注 | D. 皮下注射 |
| E. 动脉注射 |         |

109. 围术期预防性用药的起始给药时机是  

- |            |               |
|------------|---------------|
| A. 术前 24 h | B. 术前 0.5~2 h |
| C. 术中      | D. 术后 0.5~2 h |
| E. 术后 24 h |               |

110. I 类清洁手术切口预防性应用抗菌药物的比例不得超出手术病例总数的



- |        |        |
|--------|--------|
| A. 70% | B. 60% |
| C. 50% | D. 40% |
| E. 30% |        |

#### 四、多项选择题

111. 吗啡适用于

- |             |          |
|-------------|----------|
| A. 风湿热      | B. 癌性剧痛  |
| C. 骨关节炎     | D. 心源性哮喘 |
| E. 急性心肌梗死剧痛 |          |

112. 促胃肠动力药在应用中可致的典型不良反应有

- |           |             |
|-----------|-------------|
| A. 高泌乳素血症 | B. 类磺胺药过敏反应 |
| C. 锥体外系反应 | D. 5-羟色胺综合征 |
| E. 低血压    |             |

113. 利福平的抗菌作用特点有

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| A. 对结核杆菌、麻风杆菌有杀菌作用 | B. 抗结核作用大于异烟肼  |
| C. 对沙眼衣原体有抑制作用     | D. 结核杆菌不易产生耐药性 |
| E. 对耐药金黄色葡萄球菌有抗菌作用 |                |

(2017 年真题) 114. 关于抗痛风药秋水仙碱的说法 正确的是

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| A. 初始剂量 1 mg 维持剂量 0.5 mg tid | B. 可用于痛风的长期预防     |
| C. 可用于痛风缓解期                  | D. 老年人、肝肾功能不全者应减量 |

E. 长期服用可导致可逆性维生素 B12 吸收不良

115. 甲状腺片的应用

- |            |            |
|------------|------------|
| A. 单纯性甲状腺肿 | B. 甲状腺术前准备 |
| C. 黏液性水肿   | D. 呆小症     |
| E. 甲状腺危象   |            |

116. 甲氨苄啶和磺胺甲恶唑联合应用的目的是

- |             |              |
|-------------|--------------|
| A. 减少代谢     | B. 减少排泄      |
| C. 协同抗菌     | D. 防止发生叶酸缺乏症 |
| E. 防止产生耐药菌株 |              |

117. 地西泮的药理作用有

- |        |        |
|--------|--------|
| A. 抗焦虑 | B. 镇静  |
| C. 催眠  | D. 抗抑郁 |
| E. 抗癫痫 |        |

(2017 年真题) 118. 患者来药店购买双歧杆菌三联活菌制剂 药师应该交待的使用注意

事项包括

- |              |                |
|--------------|----------------|
| A. 置于冰箱中冷藏保存 | B. 与抗酸剂分开服用    |
| C. 宜用温水送服    | D. 不宜与抗菌药物同时服用 |
| E. 可混于温牛奶中服用 |                |

119. 氢氯噻嗪对尿中离子的影响是

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| A. 排 K <sup>+</sup> 增加   | B. 排 Na <sup>+</sup> 增多               |
| C. 排 Cl <sup>-</sup> 增加  | D. 排 HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 增多 |
| E. 排 Ca <sup>2+</sup> 增加 |                                       |

120. 青霉素的抗菌谱为  

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| A. 敏感的革兰阳性和阴性球菌 | B. 革兰阳性杆菌   |
| C. 螺旋体          | D. 支原体、立克次体 |
| E. 革兰阴性杆菌       |             |

模拟试卷(二)

规定时间:120 分钟 自测时间\_\_\_\_\_ 试题预计完成时间\_\_\_\_\_

一、最佳选择题

- 1.服用**华法林**初期 应当每日监测凝血指标 将国际标准化比值(INR)目标值控制在
- A. 2~3 B. 3~4  
C. 4~5 D. 5~6  
E. 7~8
- 2.**哮喘急性发作**应用平喘药 最适宜的给药途径是
- A. 吸入给药 B. 口服给药  
C. 静脉滴注 D. 肌肉注射  
E. 透皮给药
- 3.**阿卡波糖**的降糖作用机制是
- A. 与胰岛β细胞受体结合 促进胰岛素释放  
B. 提高靶细胞膜上胰岛素受体数目和亲和力  
C. 抑制胰高血糖素分泌  
D. 在小肠上皮处竞争抑制碳水化合物水解酶使葡萄糖生成速度减慢 血糖峰值降低  
E. 促进组织摄取葡萄糖 使血糖水平下降
- (2017 年真题)4.具有**阿片样作用** 长期大剂量服用**产生欣快感**的止泻药是
- A. 双八面体蒙脱石 B. 洛哌丁胺  
C. 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 D. 阿托品  
E. 地芬诺酯
- 5.**清洁手术**(Ⅰ类切口)**预防性**应用抗菌药物 可以选用
- A. 头孢唑林注射液 B. 甲硝唑注射液  
C. 头孢噻肟注射液 D. 阿奇霉素注射液  
E. 头孢拉定片剂
- 6.治疗**单纯疱疹性角膜炎**不宜选用的药物是
- A. 利巴韦林滴眼液 B. 更昔洛韦滴眼液  
C. 碘苷滴眼液 D. 四环素可的松眼膏

- E. 阿昔洛韦滴眼液
- 7.**阿托品**禁用于
- A. 虹膜睫状体炎 B. 有机磷中毒  
C. 酸中毒 D. 青光眼  
E. 休克
- (2017 年真题)8.患者 男 57 岁 肾功能正常 既往**有动脉粥样硬化 高血压合并 2 型糖尿病** 服用下列药物后出现**踝关节肿胀** 到药房咨询 药师提示有可能引起不良反应的药物是
- A. 赖诺普利片 B. 格列吡嗪肠溶片  
C. 阿司匹林肠溶片 D. 硝苯地平缓释片  
E. 阿托伐他汀钙片
- 9.**肝素**体内抗凝最常用的给药途径是
- A. 口服 B. 皮内注射  
C. 皮下注射 D. 静脉注射  
E. 肌肉注射
- 10.应用**曲妥珠单抗**治疗乳腺癌前对患者须进行**基因筛查** 筛查的项目是
- A. 表皮生长因子受体 B. 血管内皮生长因子  
C. B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原 D. 人表皮生长因子受体-2  
E. 雌激素受体
- 11.应用**华法林**时 为掌握好剂量 应测定
- A. 国际标准比值 B. 部分凝血活酶时间  
C. 出血时间 D. 凝血时间  
E. 止血时间
- (2017 年真题)12.长期应用**β受体阻断剂** 如需停药 应逐步停药 整个过程至少需要
- A. 1 天 B. 3 天  
C. 5 天 D. 7 天  
E. 14 天
- 13.**阿托品**对**眼**的作用是
- A. 散瞳 升高眼内压 调节麻痹 B. 缩瞳 升高眼内压 调节麻痹  
C. 缩瞳 降低眼内压 调节麻痹 D. 散瞳 降低眼内压 调节麻痹  
E. 散瞳 降低眼内压 调节痉挛
- 14.属于**长效糖皮质激素类**的药物是

A. 氢化可的松

B. 醋酸可的松

C. 曲安西龙

D. 地塞米松

E. 泼尼松龙

15. 体内、外均有**抗凝血作用**的药物是

举一反三

A. 双香豆素类

B. 肝素

C. 噻氯匹定

D. 华法林

E. 双嘧达莫

(2017 年真题) 16. 使用后**可产生抗体** 1 年内不宜再次使用的药物是

A. 尿激酶

B. 链激酶

C. 瑞替普酶

D. 阿替普酶

E. 血凝酶

17. 服用时必须保持坐位或立位 空腹 **服后 30 分钟内不宜进食和卧床**的药物是

举一反三

A. 依降钙素

B. 依普黄酮

C. 雷洛昔芬

D. 阿仑膦酸钠

E. 阿法骨化醇

18. 长期大量应用**头孢菌素类**抗菌药物的患者 须注意适当补充

举一反三

维生素 A 和维生素 D

B. 维生素 B 和维生素 K

C. 维生素 C 和烟酸

D. 维生素 E 和叶酸

E. 维生素 B<sub>12</sub> 和叶酸

19. 下述药物中 不能用于**促进铁剂吸收**的是

A. 维生素 C

B. 维生素 E

C. 食物中的果糖

D. 半胱氨酸

E. 葡萄糖

(2017 年真题) 20. **急性缺血性脑卒中发作** 应用溶栓药治疗**时间窗**是在发病后

A. 3 小时内

B. 8 小时内

C. 12 小时内

D. 24 小时内

E. 48 小时内

21. 用于**低分子肝素过量时解救**的药物是

A. 氨甲环酸

B. 酚磺乙胺

C. 维生素 K<sub>1</sub>

D. 鱼精蛋白

E. 血凝酶

22. 主要通过**增强心肌收缩力**而改善心功能的药物是

A. 卡维地洛

B. 硝酸甘油

C. 地高辛

D. 氢氯噻嗪

E. 依那普利

23. 具有**肺毒性**和**光敏反应**的抗心律失常药是

A. 普罗帕酮

B. 美西律

C. 地尔硫

D. 维拉帕米

E. 胺碘酮

(2017 年真题) 24. 属于**直接凝血酶抑制剂**的抗凝血药是

举一反三

A. 依诺肝素

B. 肝素

C. 华法林

D. 利伐沙班

E. 达比加群酯

25. **肝素**的抗凝作用特点是

A. 仅在体内有效

B. 仅在体外有效

C. 体内、外均有效

D. 必须有维生素 K 辅助

E. 口服有效

26. **胺碘酮**抗心律失常的**作用机制**是

A. 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性

B. 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度

C. 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期

D. 阻滞心肌细胞  $Na^+$ 、 $K^+$  和  $Ca^{2+}$  通道

E. 激动  $\alpha$  及  $\beta$  受体

27. **哌嗪类**驱虫药主要用于治疗

A. 疟疾

B. 绦虫病

C. 蛔虫病和蛲虫病

D. 蛲虫病

E. 姜片虫病

(2017 年真题) 28. 用**维生素 B<sub>12</sub>** 治疗**巨幼细胞性贫血** 48 小时内应该监测的电解质是

A. 钠

B. 钾

C. 锂

D. 钙

E. 锌

29. **普萘洛尔**的禁忌证

- A. 心律失常

B. 窦性心动过缓
- C. 房室传导阻滞

D. 低血压
- E. 支气管哮喘
30. 给药后易产生抗体 5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降 1 年内再次使用的溶栓药是
- A. 阿替普酶

B. 瑞替普酶
- C. 尿激酶

D. 链激酶
- E. 降纤酶
31. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是
- A. 奎宁

B. 青蒿素
- C. 氯喹

D. 伯氨喹
- E. 乙胺嘧啶
- (2017 年真题) 32. 在常规剂量下 5 $\alpha$  还原酶抑制剂可使血清(前列腺特异性抗原) PSA 水平下降幅度是
- A. 10%

B. 20%
- C. 30%

D. 40%
- E. 50%
33. 属于阿司匹林的不良反应的是
- A. 嗜睡

B. 心动过速
- C. 呼吸抑制

D. 凝血障碍
- E. 戒断症状
34. 普萘洛尔的禁忌证是
- A. 甲状腺功能亢进

B. 心绞痛
- C. 高血压

D. 心律失常
- E. 支气管哮喘
35. 易产生耐受性的药物是
- A. 普萘洛尔

B. 维拉帕米
- C. 地尔硫

D. 双嘧达莫
- E. 硝酸甘油
- (2017 年真题) 36. 属于抗孕激素药 用于终止早孕的是
- A. 米非司酮

B. 甲地孕酮
- C. 左炔孕酮

D. 黄体酮

- E. 地屈孕酮
37. 治疗巨幼细胞性贫血的药物是
- A. 硫酸亚铁

B. 重组人促红素
- C. 维生素 K

D. 叶酸
- E. 重组人粒细胞刺激因子
38. 治疗变异型心绞痛宜选用的药物是
- A. 硝苯地平

B. 卡维地洛
- C. 普萘洛尔

D. 双嘧达莫
- E. 曲美他嗪
39. 能防止和逆转心肌肥厚的药物是
- A. 地高辛

B. 依那普利
- C. 硝普钠

D. 氢氯噻嗪
- E. 米力农
- (2017 年真题) 40. 糖皮质激素的适应证 不包括
- A. 活动性肺结核

B. 系统性红斑狼疮
- C. 再障

D. 风湿
- E. 过敏性休克
- 二、配伍选择题
- [41~42]
- A. 氨苄西林

B. 头孢唑林
- C. 亚胺培南

D. 青霉素
- E. 氨基糖
41. 对大多数革兰阳性菌、革兰阴性菌和厌氧菌均有强大抗菌活性的药物是
42. 仅对革兰阴性菌有强效 对革兰阳性菌、厌氧菌稍差的药物是
- [43~44]
- A. 维生素 B<sub>1</sub>

B. 维生素 B<sub>2</sub>
- C. 维生素 E

D. 烟酸
- E. 维生素 A
43. 防止夜盲症的维生素是
44. 辅助治疗不孕症的维生素是
- [45~46]

