

护士执业资格考试考前必背 150 考题

1.急性心肌梗死患者早期死亡的主要原因

- A.心源性休克
- B.室性心律失常
- C.急性心力衰竭
- D.室间隔穿孔
- E.心脏破裂

【答案】B

2.三凹征是指

A.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

B.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷

C.胸骨上窝、剑突下和肋间隙在吸气时明显下陷

D.胸骨上窝、剑突下和肋间隙在呼气时明显下陷

E.胸骨上窝、腹部和肋间隙在呼气时明显下陷

【答案】A

3.消化道手术后,提示患者肠蠕动恢复的有效指征是

- A.听诊有肠鸣音
- B.肛门排气
- C.患者有饥饿感
- D.患者有便意
- E.胃管的引流量较前减少

【答案】B

4.原发性肝癌患者最常见和最主要的症状是

- A.肝区疼痛
- B.低热
- C.腹胀、乏力
- D.食欲不振
- E.消瘦

【答案】A

5.关于对头皮撕脱伤患者急救的叙述,不正确的是

- A.撕脱部位加压包扎止血
- B.将撕脱的头皮浸泡在 75% 乙醇中消毒
- C.保护创面,避免污染
- D.严密观察休克征象
- E.迅速送往医院进行救治

【答案】B

6.为缓解疼痛,急性胰腺炎患者可采取的体位是

- A.仰卧位
- B.俯卧位
- C.弯腰屈膝侧卧位
- D.半坐卧位
- E.仰卧屈膝位

【答案】C

7.膀胱癌最主要的症状是

- A.排尿困难
- B.膀胱刺激征
- C.无痛性肉眼血尿
- D.下腹部肿块
- E.尿潴留

【答案】C

8.患儿,女,3岁。不慎被蜡烛烧伤左手。烫伤部位局部红肿,有一个约 2cm×2cm 大水疱,其周边有 3~5 个小水疱。该患儿的烧伤程度为

- A.Ⅰ度烧伤
- B.Ⅱ度烧伤
- C.Ⅲ度烧伤
- D.重度烧伤
- E.特重度烧伤

【答案】B

9.以假小叶形成为主要病理改变的疾病是

- A.慢性肝淤血
- B.弥漫型肝癌
- C.急性重型肝炎
- D.肝硬化
- E.亚急性重型肝炎

【答案】D

10.女性,56岁。心脏病,长期服用洋地黄类药物,护士在每次发药时特别要注意的是

- A.核对病人的床号、姓名
- B.叮嘱病人在饭后服药
- C.服药前仔细测量病人的脉搏
- D.备足够量的温开水
- E.注意发药到口

【答案】C

11.患者,女,18岁。失足落入水中,15分钟后被救出,呼之不应,胸廓无起伏,抢救该患者首要的步骤是

- A.倒水处理
- B.通畅气道
- C.人工呼吸
- D.心脏按压
- E.紧急呼救

【答案】D

12.食管癌的早期表现是

- A.吞咽哽噎感
- B.吞咽困难
- C.声音嘶哑
- D.持续性胸背痛
- E.呕吐泡沫样黏液

【答案】A

13.结肠造口患者出院后可以进食的蔬菜是

- A.芹菜
- B.韭菜
- C.洋葱
- D.辣椒

E.菜花

【答案】E

14.患者,男,60岁。车祸致颅脑损伤,下肢粉碎性骨折,深昏迷,营养状况差,轻度水肿。晨起查房评估见骶尾部皮肤紫红色,有皮下硬结,并有小水疱。患者目前皮肤状况处于

- A.正常
- B.压疮淤血红润期
- C.压疮炎性浸润期
- D.压疮浅度溃疡期
- E.压疮坏死溃疡期

【答案】C

15.使用冰槽时,为防止冻伤需保护的部位是

- A.前额
- B.颞部
- C.头顶
- D.耳部
- E.面颊

【答案】D

16.患者,男,70岁。冠心病史15年。活动后出现心前区压榨样疼痛2小时。首选的治疗措施是

- A.口服安体舒通
- B.嚼服达喜
- C.肌内注射杜冷丁
- D.舌下含服硝酸甘油
- E.口服扑尔敏

【答案】C

17.类风湿关节炎活动期最常见的临床表现是

- A.晨僵
- B.指关节畸形
- C.肘侧皮肤出现浅表结节
- D.下肢皮肤有大片出血点
- E.贫血

【答案】A

18.某胎龄38周的新生儿,因围生期室

息出现嗜睡、肌张力低下,拥抱、吸吮反射减弱,诊断为新生儿缺血缺氧性脑病,进行亚低温(头部降温)治疗。此时,护士应持续监测的是

- A. 头罩温度
- B. 暖箱温度
- C. 腋下温度
- D. 肛门温度
- E. 环境温度

【答案】D

19.患者,男,65岁。因慢性肺源性心脏病并发肺炎、右心衰竭住院治疗。护士核对医嘱时,应提出质疑的是

- A. 一级护理
- B. 持续吸氧 6L/min
- C. 头孢美唑钠 2.0g+5%葡萄糖 100mL, ivgtt, q12h
- D. 沐舒坦 30mg+0.9%氯化钠 100mL, ivgtt, tid

E. 氢氯噻嗪 25mg, po, bid

【答案】B

20.急性脱髓鞘性多发性神经炎对患儿生命威胁最大的症状是

- A. 运动障碍
- B. 感觉障碍
- C. 脑神经麻痹
- D. 呼吸肌麻痹
- E. 自主神经功能障碍

【答案】D

21.患者,男,26岁。于晚间饮用高度白酒约 500mL 后神志不清,呼吸困难、口唇发绀急诊入院。查体:T36.9℃, P141 次/分, R38 次/分, BP95/72mmHg;嗜睡,半卧位,呼吸急促;腹部轻压痛,无肌紧张。分诊护士判断该患者最可能是

- A. 急性胰腺炎
- B. 癔症
- C. 呼吸衰竭
- D. 脑疝

E. 酒精中毒

【答案】E

22.患儿,女,6岁,诊断“喉头异物”入院。查体:面色青紫,呼吸费力,伴明显的三凹征。其呼吸类型属于

- A. 深度呼吸
- B. 潮式呼吸
- C. 吸气性呼吸困难
- D. 呼气性呼吸困难
- E. 混合性呼吸困难

【答案】C

23.护士为使用呼吸机的患者吸痰,发现痰液黏稠不易吸出,错误的处理措施是

- A. 叩拍胸背部
- B. 增加负压吸引力
- C. 滴入化痰药物
- D. 滴入生理盐水
- E. 雾化吸入

【答案】B

24.患者,女,34岁。肱骨干骨折术后 3 天。护士指导患者进行功能锻炼,正确的方法是

- A. 患侧运用握力器进行前臂肌肉舒缩运动
- B. 患肢爬墙运动,以活动上臂肌肉
- C. 用手推墙动作,以活动胸大肌、三角肌
- D. 运篮球动作,以活动上肢各肌群
- E. 提重物练习,以促进骨痂愈合

【答案】A

25.右心衰竭患者的特征性体征是

- A. 水肿
- B. 肝大和压痛
- C. 肝颈静脉反流征阳性
- D. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- E. 双肺可闻及哮鸣音

【答案】C

26.患者,男,40岁。因工作压力过大出现失眠、焦虑来诊。患者的哪项陈述说明护

士需要进一步进行健康指导

A.“无论多忙,我都要争取在晚上 11 点前睡觉。”

B.“每天吃完晚饭出去走走,散散心。”

C.“在家尽可能不去想工作,放松心情。”

D.“睡觉前洗澡。”

E.“睡觉前喝一瓶啤酒有助睡眠。”

【答案】E

27.肥厚型心肌病患者猝死的先兆症状是

A.心悸

B.晕厥

C.心前区疼痛

D.全身乏力

E.呼吸困难

【答案】B

28.患者,男,37 岁。因感染性休克入院。护士在观察病情时,下列哪项症状提示其发生急性呼吸窘迫综合征的可能

A.呼吸音减弱

B.肺部湿啰音

C.躁动不安

D.动脉氧分压下降

E.呼吸困难迅速加重

【答案】E

29.急性阑尾炎患者最典型的症状是

A.转移性脐周疼痛

B.转移性右下腹痛

C.固定的脐周疼痛

D.固定的右下腹痛

E.腹痛位置无规律

【答案】B

30.患者,男,20 岁。30 分钟前被刀刺左前胸部,咯血痰,呼吸困难,查体:血压 101/71mmHg,脉搏 99 次/分,左前胸有轻度皮下气肿,左锁骨中线 4 肋间可见 5cm 长创口,随呼吸有气体进出伤口响声。该患者最可能的诊断是

A.张力性气胸

B.闭合性气胸

C.肋骨骨折

D.血胸

E.开放性气胸

【答案】E

31.急性再障临床表现特点是

A.出血+感染

B.消瘦

C.出血

D.贫血

E.感染

【答案】A

32.乳腺癌患者乳房皮肤出现局部凹陷,提示癌肿已经侵犯了

A.大乳管

B.皮下脂肪组织

C.Cooper 韧带

D.胸小肌

E.皮下淋巴管

【答案】C

33.患儿,女,2 个月。因肺炎、高烧急诊入院。护士在为其进行静脉输液时,2 次穿针失败。患儿父亲非常气愤,甚至谩骂护士。导致此事件发生的主要因素

A.角色责任模糊

B.角色期望冲突

C.角色心理差位

D.角色权利争议

E.经济压力过重

【答案】B

34.某患者因“腹痛 6 小时”被家属送来急诊。患者意识模糊、面色苍白、脉搏细弱,诊断为急性胰腺炎伴休克收入重症监护室。家属急切地向重症监护室护士询问“他怎么样了?”“他能活过来吗?”护士最恰当的回答是

A.“我们现在正在忙着抢救别的病人,完事以后医生会跟您交代情况。”

B.“您必须签知情同意书,办完入院手续我们才能开始治疗。”

C.“医生正在积极治疗您的家人,请配合我们,谢谢。”

D.“我们处理过很多这样的患者,病情不算重,放心。”

E.“你们家属送来这么晚,我们没法保证结果。”

【答案】C

35.患者,男,68岁。因高血压来诊,医嘱给予降压药口服治疗。护士应指导患者,为评估降压效果,患者应自行测量、记录血压。测量血压的最佳时段是

- A.服用降压药前
- B.服用降压药后
- C.两次服用降压药之间
- D.服用降压药半小时后
- E.服用降压药两小时后

【答案】E

36.肾上腺素用于治疗心脏骤停,其主要的药理作用是

- A.增加心肌收缩力
- B.扩张外周血管
- C.减慢心率
- D.抗心律失常
- E.纠正酸碱平衡

【答案】A

37.患者,男,60岁。行前列腺肥大摘除术。术后进行膀胱冲洗时,应选择的溶液是

- A.0.02%呋喃西林
- B.3%硼酸
- C.0.9%氯化钠溶液
- D.0.1%新霉素
- E.5%葡萄糖溶液

【答案】C

38.某肾病综合征患者入院治疗,查体:双下肢水肿。实验室检查:尿蛋白4.5g/d,血浆白蛋白20g/L。该患者水肿的主要原因是

A.醛固酮增多

B.球-管失衡

C.饮水过多

D.肾小球滤过率下降

E.血浆胶体渗透压下降

【答案】E

39.影响癔症发病最主要的因素是患者的

A.器质性病变

B.心理因素

C.血型

D.年龄

E.经济状况

【答案】B

40.在儿科的实习护士下班后在电梯中与外科护士说“告诉你,×××大明星的女儿今天入住我们病房,你想知道是啥原因?”外科护士的正确回答是

A.“我们去病房说吧,这里是公共场所,不适合讨论病情。”

B.“你简单跟我说说病情好了,我不能去看她。”

C.“请不要跟我说这些,你不能透露这些消息。”

D.“如果是外科的疾病就告诉我,我也许能帮你。”

E.“告诉我床号,明天我自己去看她。”

【答案】C

41.麻疹患者在出疹期首先出皮疹的部位

A.前额、面、颈

B.耳后、发际

C.胸、背

D.胸、膜

E.四肢

【答案】B

42.肺炎球菌肺炎患者的典型临床症状不包括

A.寒战、高热

- B.咳嗽
- C.咳铁锈色痰
- D.胸痛
- E.腹胀

【答案】E

43.患者,男,56岁。胃癌。在应用化疗药辅助治疗时,注射部位刺痛、水肿,并出现条索状红线。正确的处理措施是

- A.局部热敷
- B.局部按摩
- C.加快注射速度
- D.减慢注射速度
- E.立即给予抗生素

【答案】A

44.患者,女,30岁。因“绒毛膜癌”入院行化疗。为确保化疗药物剂量准确,护士应在什么时候为其测量体重

- A.每疗程用药前
- B.每疗程用药中
- C.每疗程用药后
- D.每疗程用药前和用药中
- E.每疗程用药前、用药中和用药后

【答案】A

45.患者,男,28岁。淋雨后寒战、高热,咳嗽、咯痰,痰液为铁锈色;查体:体温 39.8℃,右下肺呼吸运动减弱,语颤增强,叩诊浊音,听诊有支气管呼吸音和湿啰音。首选的治疗药物是

- A.丁胺卡那
- B.青霉素
- C.庆大霉素
- D.罗红霉素
- E.头孢他啶

【答案】B

46.心脏复苏的首选药物是

- A.氯化钙
- B.阿托品
- C.碳酸氢钠
- D.利多卡因

E.肾上腺素

【答案】E

47.患者,男,45岁,十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物时,护士应提出质疑

- A.氢氧化铝凝胶
- B.口服补液盐
- C.奥美拉唑
- D.枸橼酸铋钾
- E.克拉霉素

【答案】B

48.关于肝性脑病患者饮食护理的叙述,正确的是

- A.每日总热量以脂肪为主
- B.血氨偏高者限制蛋白质摄入
- C.病情好转后主要选择动物蛋白
- D.应控制饮食中维生素 C 的摄入
- E.每日饮水量不少于 2000mL

【答案】B

49.患者,女性,54岁。患“肝硬化”6年,现呕血 600mL,心慌乏力,脉搏细速。体检:精神萎靡,皮肤干燥。体温 36.7℃,脉搏 108 次/分,呼吸 24 次/分,血压 80/60mmHg。属于主观资料的是

- A.皮肤干燥
- B.心慌乏力
- C.脉搏细速
- D.呕血 600mL
- E.体温 36.7℃

【答案】B

50.患者,男性,80岁。慢支肺气肿病史 30年,近 1 周来出现咳嗽,咳大量黏液脓痰,伴心悸、气喘,查体呼吸急促、发绀明显,颈静脉怒张、下肢水肿。该患者氧疗时,给氧浓度和氧流量应为

- A.29%,2L/min
- B.33%,3L/min
- C.37%,4L/min
- D.41%,5L/min

E.45% ,6L/min

【答案】A

51.腰椎穿刺术后患者去枕仰卧的目的是

- A.有利于脑部血液循环
- B.防止脑水肿
- C.减轻头晕头痛
- D.预防颅内压减低引起头痛
- E.防止昏迷

【答案】D

52.关于 1 型糖尿病特点的描述,正确的是

- A.好发于成年人
- B.起病缓慢
- C.病情较稳定
- D.血浆胰岛素细胞抗体阳性
- E.血浆胰岛素水平正常或偏高

【答案】D

53.患者在进行甲状腺摄碘试验检查前应禁食含碘食物的时间为

- A.3 天
- B.4~6 天
- C.1~2 周
- D.3~4 周
- E.7~60 天

【答案】E

54.中医情志是指

- A.怒、喜、思、悲、恐
- B.气、血、津、精、神
- C.风、寒、暑、湿、火
- D.酸、苦、甘、辛、咸
- E.心、肝、脾、肺、肾

【答案】A

55.下列可引起继发性腹膜炎的疾病是

- A.上呼吸道感染
- B.胃十二指肠溃疡穿孔
- C.乙型肝炎
- D.子宫内膜炎
- E.胸腔积液

【答案】B

56.骨肉瘤最常见的转移部位是

- A.胃
- B.肺
- C.肝
- D.脑
- E.结肠

【答案】B

57.保健门诊护士不能从事的工作内容是

- A.健康体检
- B.疾病普查
- C.预防接种
- D.开具处方
- E.健康教育

【答案】D

58.过期妊娠定义为妊娠达到或超过

- A.37 周
- B.39 周
- C.41 周
- D.42 周
- E.43 周

【答案】D

59.对于结核病患者入院时换下的衣物,正确的处理是

- A.直接焚烧
- B.直接存入患者储物柜
- C.消毒后存放
- D.直接交给患者家属
- E.消毒后交给患者

【答案】C

60.护士增进个人人际关系吸引力的要素,不包括

- A.提供治疗性的环境
- B.无条件地关心患者,给予温暖
- C.适度的同感心
- D.绝对地保密
- E.敏锐的询问

【答案】D

61.关于授权原则,不正确的是

- A.视能授权
- B.公平竞争
- C.合法合理
- D.监督控制
- E.权责对等

【答案】B

62.不符合癫痫患者用药原则的是

- A.选择最佳药物
- B.长期用药
- C.规律用药
- D.三药联合
- E.定时测血药浓度

【答案】D

63.用已经制订的目标为依据来检查和评价目标完成情况的管理方法称为

- A.过程管理
- B.人员管理
- C.统筹管理
- D.目标管理
- E.时间管理

【答案】D

64.颈外静脉穿刺点在下颌角与锁骨上缘中点

- A.之上 1/3 处
- B.之上 1/2 处
- C.之下 1/4 处
- D.之下 1/3
- E.平环状软骨处

【答案】A

65.按照《医疗事故处理条例》规定,重大医疗事故的报告时限是

- A.2 天
- B.1 天
- C.12 小时
- D.5 小时
- E.2 小时

【答案】C

66.患者在住院期间,护士整理病历应排

在首页的是

- A.住院病历首页
- B.长期医嘱单
- C.临时医嘱单
- D.体温单
- E.入院记录

【答案】D

67.护士采取的护理措施以保持病室安静,但应除外

- A.减少探视
- B.医护人员进行各种操作时做到“四轻”
- C.病室桌椅安装防噪声垫
- D.治疗车轴、门轴应经常润滑
- E.关好门窗,避免噪声

【答案】E

68.取坐位测量血压时,应使肱动脉

- A.平第 2 肋软骨,与心脏在同一水平上
- B.平第 3 肋软骨,与心脏在同一水平上
- C.平第 4 肋软骨,与心脏在同一水平上
- D.平腋前线,与心脏在同一水平上
- E.平腋后线,与心脏在同一水平上

【答案】C

69.临床死亡期患者生命仍有复苏的可能,此期持续时间一般是

- A.11~15 分钟
- B.9~10 分钟
- C.7~8 分钟
- D.5~6 分钟
- E.3~4 分钟

【答案】D

70.物理消毒灭菌法中,效果最可靠的是

- A.高压蒸汽灭菌法
- B.煮沸法
- C.日光暴晒法
- D.烤箱烘烤
- E.紫外线灯管消毒法

【答案】A

71.急性腹膜炎患者休克的主要原因是

- A. 体温过高
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 剧烈疼痛
- D. 血容量减少及毒素吸收
- E. 细菌大量繁殖

【答案】D

72. 高热患者用冰袋降温,其原理是

- A. 对流
- B. 辐射
- C. 传导
- D. 蒸发
- E. 蒸发加对流

【答案】C

73. 临终患者最早出现的心理反应阶段是

- A. 发泄期
- B. 愤怒期
- C. 忧郁期
- D. 接受期
- E. 否认期

【答案】E

74. 门诊发现传染患者时,护士采取的首要措施是

- A. 安排患者提前就诊
- B. 进行卫生宣教与候诊教育
- C. 将患者隔离诊治
- D. 转入急诊科
- E. 组织其他患者撤离

【答案】C

75. 乳腺癌淋巴转移的主要部位是

- A. 同侧腋窝淋巴结
- B. 同侧胸骨旁淋巴结
- C. 颈部淋巴结
- D. 锁骨下淋巴结
- E. 纵隔淋巴结

【答案】A

76. 禁忌使用鼻饲的患者是

- A. 昏迷
- B. 口腔手术

- C. 脑出血
- D. 婴幼儿
- E. 食管胃底静脉曲张

【答案】E

77. 以下符合小儿生长发育顺序规律的是

- A. 由高级到低级
- B. 各系统发育快慢均衡
- C. 生长发育年龄阶段速度均衡
- D. 先慢后快
- E. 由简单到复杂

【答案】E

78. 肝硬化晚期患者出现大量腹水,腹水产生的主要原因是

- A. 门静脉高压和低蛋白血症
- B. 淋巴回流受阻
- C. 饮食不当
- D. 醛固酮和抗利尿激素增多
- E. 右心功能不全

【答案】A

79. 紫外线空气消毒时,有效距离与时间的要求是

- A. 1m, 不少于 30 分钟
- B. 3m, 不少于 30 分钟
- C. 1m, 不少于 45 分钟
- D. 2m, 不少于 30 分钟
- E. 3m, 不少于 45 分钟

【答案】D

80. 氧疗法中,流量为 4L/分,其氧浓度为

- A. 27%
- B. 30%
- C. 33%
- D. 37%
- E. 39%

【答案】D

81. 非语言沟通的特点不包括

- A. 多种渠道
- B. 多种功能

- C.文化的差异性
- D.有意识的行为
- E.具有多种含义

【答案】D

82.青春期最突出的表现是

- A.意外发生率高
- B.生长发育最迅速时期
- C.生长发育速度变慢,语言及动作能力

提高较快

- D.接受教育的最佳时期
- E.生长发育旺盛,生殖器官迅速发育

成熟

【答案】E

83.患者,男性,25岁,遭遇车祸,内脏受损,出血1200ml,发生失血性休克,护士此时应首先满足患者哪一层次的需要

- A.生理的需要
- B.生存的需要
- C.爱与归属的需要
- D.家属知晓的需要
- E.自我实现的需要

【答案】A

84.患者,女性,34岁,急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病患者。病后5天出现严重面神经麻痹、吞咽困难,呼吸麻痹、构音含糊。首要的治疗措施是

- A.糖皮质激素治疗
- B.鼻饲营养丰富的流质
- C.营养神经治疗
- D.抗生素治疗
- E.气管切开,呼吸机辅助呼吸

【答案】E

85.患者,女性,31岁。阴道分娩后行热水坐浴,护士交待其坐浴的时间是

- A.5~10分钟
- B.10~15分钟
- C.15~20分钟
- D.20~35分钟
- E.30~45分钟

【答案】C

86.患者,男性,55岁。因上消化道大出血导致失血性休克急诊入院,遵医嘱大量输入库存血800ml,患者出现全身发冷,输静脉周围局部皮温正常。护士首先应

- A.拔针后另外穿刺,继续输血
- B.热敷患者穿刺局部
- C.使用恒温器加热血液

D.轻者减慢输血速度,继续观察,重者立即停止输血

- E.给予吸氧

【答案】D

87.患者,女性,51岁。因便秘需为其行大量不保留灌肠,护士为其准备灌肠液的温度应为

- A.10~15℃
- B.15~20℃
- C.25~30℃
- D.39~41℃
- E.45~50℃

【答案】D

88.患者,男性,35岁。肢端发凉、怕冷及间歇性跛行6个月就诊,查体皮肤温度低,足背静脉充盈时间延长,诊断为血栓闭塞性脉管炎,本病最常发生的部位是

- A.下肢大、中动脉
- B.下肢深静脉
- C.上肢大动脉及深静脉
- D.下肢中、小动静脉
- E.上肢中、小动静脉

【答案】D

89.患者,女性,46岁,因怀疑上消化道出血入院,需做粪便隐血试验。护士向其介绍试验前3天可进食的是

- A.猪肝
- B.鸭血
- C.豆制品
- D.菠菜
- E.牛肉丸

【答案】C

90.患者,女性,24岁。因宫外孕出血导致休克急诊入院,急诊护士应给患者采取的体位是

- A.头低足高位
- B.截石位
- C.中凹卧位
- D.仰卧位,头偏向一侧
- E.端坐位

【答案】C

91.护校学生小何 2011 年 5 月 21 日通过了护士注册资格考试,她的护士执业注册申请必须在

- A.1年内提出
- B.2年内提出
- C.3年内提出
- D.4年内提出
- E.5年内提出

【答案】C

92.护士为来院体检的小儿进行小儿疾病预防指导,对正常小儿为预防维生素 D 缺乏性佝偻病,小儿应预防性服用维生素 D 到

- A.2岁
- B.3岁
- C.4岁
- D.5岁
- E.6岁

【答案】A

93.某产妇,诊断为产褥期感染,且感染严重,医嘱除了广谱抗生素治疗外,短期还可加用

- A.肾上腺糖皮质激素
- B.阿司匹林
- C.镇静药
- D.肾上腺素
- E.麦角新碱

【答案】A

94.患者,女性,36岁。因水肿、蛋白尿入院,临床诊断为肾病综合征。该患者的饮

食可选用

- A.正常量蛋白饮食
- B.高脂肪饮食
- C.低蛋白饮食
- D.低脂肪饮食
- E.低胆固醇饮食

【答案】A

95.患者,男性,28岁。约 1 小时前食用有毒蘑菇急送入院。患者意识清醒,护士首选的处理方法是

- A.口服催吐
- B.给予药物导泻
- C.快速输液清除毒素
- D.电动吸引器洗胃
- E.自动洗胃机洗胃

【答案】A

96.患者,女性,30岁。运动时摔倒造成左腕部扭伤 8 小时,局部青紫、肿胀、充血,目前应采取的措施正确的是

- A.冰袋冷敷
- B.局部理疗
- C.局部中药熨敷
- D.热水袋敷
- E.局部针灸

【答案】A

97.患者,女性,40岁。右侧锁骨下静脉置管进行输液时,突然主诉胸部异常不适并出现呼吸困难、发绀,心前区闻及响亮持续的“水泡音”,患者可能发生了

- A.发热反应
- B.空气栓塞
- C.过敏反应
- D.急性肺水肿
- E.合并肺部感染

【答案】B

98.患者,男性,32岁。在与歹徒搏斗时被尖刀捅伤导致开放性气胸,正确的现场急救方法是

- A.氧气吸入

- B. 气管插管辅助呼吸
- C. 厚敷料封闭伤口
- D. 胸腔穿刺排气
- E. 闭式胸膜腔引流

【答案】C

99. 患者, 男性, 62 岁。陈旧性心肌梗死, 心功能 II 级, 护士对患者的活动量指导正确的是

- A. 正常体力活动
- B. 轻度限制体力活动, 活动时增加休息
- C. 中度限制体力活动
- D. 严格限制体力活动
- E. 绝对卧床休息

【答案】B

100. 患者, 女性, 23 岁。反复下肢瘀斑, 月经量增多 1 年。查血象: 血红蛋白 80g/L, 红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$, 血小板 $19 \times 10^9/L$ 。初步诊断为慢性特发性血小板减少性紫癜。患者的首优护理问题是

- A. 焦虑
- B. 体液不足
- C. 有感染的危险
- D. 营养缺乏: 低于机体需要量
- E. 潜在并发症: 颅内出血

【答案】E

101. 新生儿, 日龄 8 天, 由于家里温度低, 为了给小孩保暖, 妈妈给宝宝穿了两层棉衣, 盖了两床被子, 夜间患儿发热, 体温高达 $39.7^{\circ}C$, 最佳的降温方法是

- A. 肌内注射退热针
- B. 温水拭浴
- C. 贴退热贴
- D. 降低环境温度或打开包被
- E. 使用激素降温

【答案】D

102. 患者, 男性, 48 岁。风湿性心脏病病史 10 年, 本次因阵发性夜间呼吸困难入院。查体典型的二尖瓣面容。听诊心尖部闻及舒张期隆隆样杂音, 护士指导患者多活

动下肢, 温水泡脚, 目的是

- A. 减轻心脏负担
- B. 预防风湿复发
- C. 防止附壁血栓形成
- D. 防止动脉栓塞
- E. 防止下肢静脉血栓形成

【答案】E

103. 护士巡视病房, 发现患者输液不滴, 挤压时感觉输液管有阻力, 松手时无回血, 应判断为

- A. 输液瓶位置过低
- B. 针头滑出血管外
- C. 输液管漏气
- D. 针头斜面紧贴血管壁
- E. 针头阻塞

【答案】E

104. 患者, 男性, 50 岁。诊断为“冠心病、心绞痛”, 拟择日行主动脉-冠状动脉旁路移植手术。术前护士查房时发现患者一个人默默地对着窗户发呆、神情非常无助。耐心询问患者, 患者诉说一方面担心手术发生意外, 另一方面担心不手术会有心肌梗死的风险, 所以非常恐惧, 此时护士采取的措施除外

- A. 告诉患者手术没有任何风险
- B. 指导患者放松的方法, 做好术前心理准备
- C. 请手术成功的患者现身说法, 鼓励患者积极配合手术
- D. 请患者家属一起做好患者的思想工作
- E. 告诉患者手术对缓解病情、防止病情恶化有重要的作用

【答案】A

105. 患者, 女性, 27 岁。患慢性咽喉炎。最近上感后咳嗽加剧, 痰黏稠, 医嘱给予超声雾化吸入治疗。超声雾化吸入治疗的目的不包括

- A. 治疗呼吸道感染

- B.减轻咳嗽
- C.解除支气管痉挛
- D.湿化呼吸道
- E.促进食欲

【答案】E

106.患者,男性,50岁。入院第2天清晨主诉昨夜难入睡,易惊醒。下午医生加开医嘱:地西洋,5mg,PO,sos。但当晚患者睡眠良好,该医嘱未予执行。次日上午,护士应在医嘱栏内

- A.用红笔写上“失效”
- B.用蓝笔写上“未用”
- C.用红笔写上“未用”
- D.用蓝笔写上“作废”
- E.用蓝笔写上“失效”

【答案】C

107.患者,男性,25岁,劳动后口渴厉害,随手将窗台上的“矿泉水”一饮而尽。饮后感口腔有刺鼻气味,腹部烧灼样剧痛。发现将过氧乙酸误服,来院急诊。护士为患者洗胃,不宜选择的液体是

- A.生理盐水
- B.镁乳
- C.5%醋酸
- D.米汤
- E.牛奶

【答案】C

108.患者,女性,45岁,行乳腺癌根治术。家属感觉伤口处包扎过紧,护士的解释其目的是

- A.防止伤口裂开
- B.保证有效的引流
- C.防止皮瓣坏死
- D.便于肢体活动
- E.预防伤口感染

【答案】C

109.患者,男性,45岁,车祸导致高位截瘫合并尿潴留。留置导尿的护理不正确的是

A.倾倒尿液时,引流管不可高于耻骨联合

- B.每周更换集尿袋1次
- C.每周更换导尿管1次
- D.消毒尿道口自上而下,由内向外
- E.极度虚弱的患者,第1次导尿量

<1000ml

【答案】B

110.患者,男性,30岁。因腹泻、腹痛拟行乙状结肠镜检查,护士应指导患者采取的体位是

- A.右侧卧位
- B.左侧卧位
- C.膝胸卧位
- D.截石位
- E.蹲位

【答案】C

111.患者,女性,25岁。高位截瘫,因护理不周引起压疮,为促进创面干燥和肉芽组织生长使用红外线治疗时,其照射最佳灯距和时间是

- A.5~10cm;10~20分钟
- B.15~20cm;10~20分钟
- C.30~50cm;20~30分钟
- D.60~70cm;20~30分钟
- E.15~20cm;20~30分钟

【答案】C

112.患者,女性,25岁。因产后乳汁淤积引起急性乳房炎伴脓肿形成,此时最重要的处理措施是

- A.局部按摩
- B.局部敷仙人掌
- C.全身应用抗生素
- D.脓肿切开引流
- E.停止哺乳

【答案】D

113.患者,男性,49岁,胃癌晚期。因病情日趋恶化,对医务人员和家属常发脾气,该患者此时的心理反应属于

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 接受期
- D. 默认期
- E. 躁狂期

【答案】B

114. 初产妇, 顺产后阴道出血量大, 暗红色。检查发现子宫体软。护士采取的首要措施是

- A. 检查胎盘是否完整
- B. 检查软产道有无损伤
- C. 抽血检查凝血功能
- D. 按摩子宫
- E. 做好输血准备

【答案】D

115. 患者, 女性, 20 岁, 因车祸急诊入院, 抢救无效死亡。家属情绪激动, 冲医护人员喊道“这么年轻的姑娘, 进医院的时候还可以和我说话, 怎么就死了! 你们怎么治的?” 此时影响家属心理状态的主要原因是

- A. 医院的救治不得力
- B. 医护人员与家属沟通不够
- C. 家属对结果无法接受
- D. 医护人员技术水平欠佳
- E. 缺乏对医护人员的信任

【答案】C

116. 社区护士向某工厂职工宣讲职业防护。其中讲解女性如果发生了工作期间长发被卷入转动的机器, 头皮完全撕脱时, 其处理方法应该是

- A. 用消毒液清洗后, 隔水放置于有冰的容器中送医院
- B. 用无菌辅料包裹后, 放置于有冰容器中送医院
- C. 用无菌敷料包裹后, 隔水放置于有冰的容器中送医院
- D. 不做任何处理送医院
- E. 不需要保留和处理

【答案】C

117. 足月顺产儿, 现已 6 个月大, 体检指标均正常, 保健护士应指导家长为婴儿添加最重要的食物是

- A. 蛋糕
- B. 鱼肉泥
- C. 粥
- D. 水果泥
- E. 蛋黄

【答案】E

118. 男性, 53 岁, 体重 93kg, 因工作压力大和应酬较多, 近来经常出现恶心、呕吐、视物模糊、头晕等症状。查体: 血压 180/95mmHg。护士向其解释导致出现上述状况最主要的发病机制是

- A. 高级神经中枢功能紊乱
- B. 肥胖
- C. 饮酒
- D. 年龄偏大
- E. 高血压脑病

【答案】A

119. 患者, 女性, 60 岁, 肝性脑病。近日出现烦躁, 有时神志不清, 静脉输液时有躁动。护士为患者使用约束带时, 要注意许多要点, 但除外

- A. 松紧合适
- B. 局部置衬垫
- C. 维护患者的自尊
- D. 注意被约束肢体的皮肤颜色
- E. 每 6 小时松解 1 次

【答案】E

120. 患者, 男性, 65 岁, 心率 121 次/分, 心音强弱不等, 心律不规则, 测脉搏时脉细弱, 65 次/分且极不规则, 为准确观察, 护士应

- A. 同时测脉率和心率
- B. 先测心率, 后测脉率
- C. 2 人, 同时分别测心率和脉率
- D. 1 人, 同时测心率和脉率
- E. 3 人, 一人测心率, 一人测脉率, 一人

计时

【答案】C

121. 患儿, 女, 3 岁, 入院后拒绝治疗且哭闹不止。护士不妥当的处理是

- A. 多鼓励患儿
- B. 允许患儿把喜爱的玩具留在身边
- C. 转移患儿的注意力
- D. 取得家属的配合
- E. 对患儿拒绝治疗的行为进行批评

【答案】E

122. 患者, 女性, 60 岁, 疑诊为肺癌。若留取痰标本查找癌细胞, 则固定标本的溶液宜选用

- A. 95% 乙醇
- B. 75% 乙醇
- C. 10% 甲醇
- D. 40% 甲醛
- E. 稀盐酸

【答案】A

123. 患者, 男性, 55 岁, 口舌干燥。查体: 皮肤弹性差, 眼窝凹陷, 尿比重 1.029, 血清钠浓度为 157mmol/L, 应首先补充

- A. 3%~5% 的氯化钠注射液
- B. 11.2% 乳酸钠注射液
- C. 5% 葡萄糖注射液
- D. 低分子右旋糖酐注射液
- E. 林格液

【答案】C

124. 患者, 男性, 63 岁, 有高血压冠心病史 5 年, 入院血压 195/135mmHg, 经治疗后稍有下降, 但时有波动, 患者精神紧张焦虑, 护士为其拟定的护理措施不包括

- A. 测得血压偏高时应保持镇静
- B. 测后与原基础血压对照后。向患者、家属做好解释
- C. 安慰患者保持稳定乐观的情绪
- D. 将血压计与患者视线平行, 以便知晓病情
- E. 进行健康教育, 促进患者改变不良生

活方式

【答案】D

125. 患者, 女性, 64 岁, 因意外跌倒致昏迷送来急诊。初步诊断颅内出血, 股骨骨折。护士已经建立静脉通道、心电监护, 需立即行 CT 检查。护士护送患者时的方法不包括

- A. 选用平车运送
- B. 护士站在患者头侧
- C. 护送时不用停心电监护
- D. 运送前同家属说明
- E. 运送期间暂时停止输液

【答案】E

126. 患者, 男性, 22 岁。建筑工人, 左下肢外伤后未得到及时、正确地处理, 而导致破伤风。护士为该患者更换敷料后, 污染敷料的处理方法是

- A. 紫外线杀毒后再清洗
- B. 戊二醛浸泡后清洗
- C. 送焚烧炉焚烧
- D. 丢入污物桶后再集中消毒处理
- E. 在日光下曝晒后再清洗

【答案】C

127. 患者, 女性, 37 岁, 因颈部蜂窝织炎入院, 护士为其制定护理计划, 其中正确的护理应除外

- A. 及早切开减压
- B. 注意观察呼吸状况
- C. 营养支持
- D. 物理降温
- E. 使用大剂量抗生素

【答案】D

128. 患者, 女性, 57 岁。半小时前因在公园晨练时晕倒, 被急诊送入院时已昏迷。对于此患者应采取的护患关系模式是

- A. 指导—合作型
- B. 主动—被动型
- C. 被动—被动型
- D. 主动—合作型

E.共同参与型

【答案】B

129.患者,女性,58岁。脑血管意外,左侧肢体偏瘫。主诉骶尾部疼痛,护士仔细观察后确认是压疮的炎性浸润期。为患者进行晨晚间护理时,护士应特别注意

- A.健康教育
- B.心理护理
- C.床单位整理
- D.体位舒适
- E.观察局部皮肤情况

【答案】E

130.患者,女性,60岁,高血压,脑出血,左下肢瘫痪。预防压疮最好的护理措施是

- A.每2小时为患者翻身、按摩1次
- B.每天请家属检查皮肤是否有破损
- C.骨隆突处用气圈
- D.使患者保持右侧卧位
- E.帮助患者做肢体功能锻炼

【答案】A

131.患者,女性,70岁。丧偶独居,因骨折卧床,感孤独,自诉思念儿女。不恰当的处理是

- A.社区护士定期随访,多探视
- B.左邻右舍、亲朋好友多探视
- C.送老人至清静处疗养
- D.鼓励子女多与老人联络
- E.志愿者提供及时的个性化服务

【答案】C

132.初产妇,产后10天仍有阴道出血,考虑为胎盘残留,首先的治疗是

- A.行刮宫术
- B.绝对卧床
- C.行开腹探查术
- D.行子宫动脉结扎
- E.输血,补充血容量

【答案】A

133.护士在沟通中得知一位患者曾有吸毒史,患者要求其保密。她可以告知的对

象是

- A.护理部主任
- B.医务处处长
- C.患者的主治医师
- D.患者的同事
- E.患者的家属

【答案】C

134.患者,女性,45岁,2型糖尿病,拟进行胰岛素治疗。护士询问患者“你知道使用胰岛素要注意哪些问题么?”这一问题属于

- A.客观问题
- B.主观问题
- C.开放式问题
- D.封闭式问题
- E.非指导性问题

【答案】C

135.患者,女性,30岁。服美曲膦酯(敌百虫)中毒,急诊抢救。护士为其洗胃清除毒物,禁用的洗胃液是

- A.清水
- B.1:15 000~1:20 000高锰酸钾
- C.2%~4%碳酸氢钠
- D.1%盐水
- E.0.9%生理盐水

【答案】C

136.患者,男性,15岁,1型糖尿病,患者需终身注射胰岛素。护士对其及家长进行如何注射胰岛素的指导中,不正确的是

- A.行皮下注射,进针角度90°
- B.不可在发炎、有瘢痕、硬结处注射
- C.进针不能有回血
- D.经常更换注射部位
- E.注射剂量要准确

【答案】A

137.初产妇,30岁,孕40周。半夜阴道流出水样物约300ml急诊入院,诊断为胎膜早破。护士应为患者采取的卧位是

- A.头高足低位
- B.俯卧位

- C.头低足高位
- D.截石位
- E.膝胸卧位

【答案】C

138.患者,女性,28岁,全身关节痛,面部有蝶形斑,血抗Sm抗体(+),诊断为系统性红斑狼疮,医嘱避免日光照射,外出穿长袖上衣和长裤,戴帽子或撑遮阳伞。护士为患者解释其中的原因是

- A.紫外线可致内分泌紊乱
- B.紫外线是本病的重要诱因
- C.紫外线直接破坏皮肤黏膜
- D.紫外线加重关节痛
- E.紫外线直接损害骨髓

【答案】B

139.患儿,10个月。晨起打喷嚏,午后发热,突然抽搐持续5分钟,入院后诊断为热性惊厥,首选的抗惊厥药物为

- A.苯妥英钠
- B.苯巴比妥
- C.地西洋
- D.10%水合氯醛
- E.硫酸镁

【答案】C

140.患者,女性,34岁,因“不孕症”就诊。行各项检查后,发现患者患有梅毒。门诊护士将此信息告知了科室的其他护士和其他来就诊的患者。该护士的行为属于

- A.侵犯了患者的公平权
- B.侵犯患者的隐私权
- C.侵犯患者的同意权
- D.侵犯患者的生命健康权
- E.侵犯患者风险知情权

【答案】B

141.患者,男性,55岁,慢性肾衰竭,尿毒症。护士观察:患者24小时尿量70ml,下腹部空虚,无胀痛。判断该患者目前的排尿状况是

- A.尿频

- B.尿失禁
- C.少尿
- D.尿闭
- E.多尿

【答案】D

142.护士长为今天当班的护士小白、小兰、小于和小柯进行工作的安排,小白是处理医嘱的主班护士,小兰是治疗护士,小于是药疗护士,小柯是生活护理护士。每隔一段时间护士长安排她们进行调换岗位。这种工作方式被称为

- A.个案护理
- B.功能制护理
- C.责任制护理
- D.小组护理
- E.临床路径

【答案】B

143.某产妇,28岁,顺产一男婴。护士查房时发现其门窗紧闭,该护士向其解释通风的优点,应除外

- A.减少感染的发生
- B.减少细菌数量
- C.增加氧含量
- D.降低二氧化碳含量
- E.改善空气质量

【答案】A

144.患者,女性,40岁。因减肥过度造成严重营养不良。遵医嘱行深静脉输注全营养混合液。护士为患者行锁骨下静脉置管,应该警惕最严重的并发症是

- A.气胸
- B.血胸
- C.神经损伤
- D.管损伤
- E.空气栓塞

【答案】E

(145~146题共用题干)

患儿,8个月,患支气管肺炎。1小时前患儿突然烦躁不安、呼吸困难、发绀,心率

200/分,心音低钝,肺部喘鸣,双肺细湿啰音密集,肝大。

145.该患儿可能患有

- A.毛细支气管炎
- B.脓气胸
- C.肺不张
- D.支气管肺炎
- E.心力衰竭

【答案】E

146.为患儿输液,速度宜控制在每小时

- A.5 ml/kg
- B.6 ml/kg
- C.11 ml/kg
- D.15 ml/kg
- E.20 ml/kg

【答案】A

(147~148 题共用题干)

患者,女性,33岁,颅脑外伤急诊。在全麻下行开颅探查术,术后返回病房。

147.护士为患者准备该床的目的是

- A.供暂离床活动的患者使用
- B.便于接受麻醉后尚未清醒的患者
- C.方便患者的治疗和护理
- D.保持病室整洁,准备接受新患者
- E.预防皮肤并发症的发生

【答案】B

148.监护室护士应为患者准备的床单位是

- A.暂空床,橡胶单、中单上缘距床头 30

~40cm

B.麻醉床,根据病情铺橡胶单及中单,中单应遮住橡胶单

C.备用床,床中部和床上部各加一橡胶中单、中单

D.暂空床,床中部和床尾部各加一橡胶中单、中单

E.麻醉床,盖被扇形折叠置于床的一侧,开口向里

【答案】B

(149~150 题共用题干)

患者,女性,58岁。因冠心病入院治疗,现好转出院,但患者告知仍有便秘的问题。

149.护士为患者进行出院指导,错误的是

- A.保证足够的水分摄入
- B.定时采用简易通便剂
- C.坚持腹部按摩
- D.指导养成定时排便的习惯
- E.多吃水果和蔬菜

【答案】B

150.患者多吃水果可以通便,水果中能起通便作用的营养素是

- A.糖类
- B.纤维素
- C.维生素 C
- D.蛋白质
- E.水果内胶原物质

【答案】B