

中医外科学

1. 中医外科内治法的总则是

- A. 温、托、补
- B. 清、消、补
- C. 清、补、托
- D. 消、通、补
- E. 消、托、补

2. 多气多血的经脉是

- A. 少阳经
- B. 阳明经
- C. 太阳经
- D. 少阴经
- E. 太阴经

3. 太乙膏的功效是

- A. 清热消肿，散瘀化痰
- B. 活血祛腐，解毒止痛
- C. 消肿止痛，提脓祛腐
- D. 消肿清火，解毒生肌
- E. 温经和阳，祛风散寒

4. 下列关于外科疾病总的发病机理的叙述，错误的是

- A. 气血凝滞
- B. 经络阻塞
- C. 邪正盛衰
- D. 脏腑失和
- E. 热毒火毒

(5~6 题共用备选答案)

- A. 邪气偏盛
- B. 阴阳失调
- C. 阴毒结聚
- D. 正气不足
- E. 经络阻塞

5. 形成瘤的主要病机是

6. 形成岩的主要病机是

(7~8 题共用备选答案)

- A. 红丝疔
- B. 失荣
- C. 漆疮
- D. 水火烫伤
- E. 酒糟鼻

7. 其病因属感受特殊之毒的是

8. 其病因属外来伤害的是

9. 外感六淫中，属于暑邪的致病特性的是

- A. 发病迅速，来势猛击，焮红灼热



- B.热轻则痒，热甚则痛，热胜则肉腐
- C.肿势散漫，痛无定处，不红不热
- D.其性趋下，重浊黏腻，酸胀沉重
- E.肿势宣浮，痛无定处，走注甚速

10.下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是

- A.有无麻木
- B.有无脓液
- C.有无出血
- D.有无灼热
- E.有无瘙痒

11.外科疾病辨证的总纲是

- A.脏腑
- B.经络
- C.气血
- D.阴阳
- E.局部

12.外疡发于多血少气之经，治疗时应注重的是

- A.破血、行气
- B.行气、活血
- C.行气、滋养
- D.破血、补托
- E.行气、补托

13.十二经脉中，多气多血之经是

- A.足厥阴肝经
- B.足太阳膀胱经
- C.手阳明大肠经
- D.足少阳胆经
- E.手少阴心经

14.外科辨肿，肿而不硬，皮色不泽，苍白或紫暗，皮肤清冷，其性质是

- A.寒肿
- B.气肿
- C.血肿
- D.痰肿
- E.湿肿

15.肿势或软如绵，或硬如馒，形态各异，不红不热。其肿的性质是

- A.热肿
- B.寒肿
- C.风肿
- D.痰肿
- E.湿肿

(16~17 题共用备选答案)

- A.热肿
- B.寒肿
- C.风肿



D.气肿

E.湿肿

16.发病急骤，漫肿宣浮的是

17.皮肉重垂胀急，深按凹陷的是

18.按外科辨痛，“痛而酸胀，肢体沉重，按之出现可凹性水肿或见糜烂流滋”。其疼痛原因是

A.风

B.湿

C.痰

D.热

E.化脓

19.疼痛时轻时重，发作不定，忽然痛忽然停止，其疼痛是

A.刺痛

B.持续痛

C.阵发痛

D.卒痛

E.裂痛

20.下列各项，不属“痒”病因的是

A.血瘀

B.热胜

C.湿胜

D.虫淫

E.风胜

(21~22 题共用备选答案)

A.气血充足

B.气火有余

C.气血虚

D.蓄毒日久损伤筋骨

E.血络受损

21.脓色绿黑稀薄者，其病机为

22.脓液黄浊质稠，色泽不净者，其病机为

23.辨溃疡，疮面呈翻花或如岩穴属

A.瘰疬溃疡

B.麻风溃疡

C.梅毒溃疡

D.岩性溃疡

E.流痰溃疡

24.创面边缘整齐，坚硬削直而如凿成，基底高低不平，有稀薄臭秽分泌物。其溃疡属于

A.麻风性溃疡

B.压迫性溃疡

C.疮痍性溃疡

D.梅毒性溃疡

E.岩性溃疡

25.肿疡毒势方盛，正气已虚。治疗应首选的方剂是



- A.透脓散
- B.托里消毒散
- C.四君子汤
- D.四物汤
- E.逍遥散

(26~27 题共用备选答案)

- A.五味消毒饮
- B.仙方活命饮
- C.黄连解毒汤
- D.犀角地黄汤
- E.清骨散

26.疮疡内治，清气分热之常用方剂是

27.疮疡内治，清血分热之常用方剂是

28.下列各项，不属漏渍法适应证的是

- A.阳证疮疡初起
- B.阴证疮疡
- C.美容
- D.保健

E.创面干燥，僵而不敛

29.膏药在古代的名称是

- A.硬膏
- B.软膏
- C.薄贴
- D.油膏
- E.敷贴

30.辨别蛇头疔成脓与否，用什么方法最为可行

- A.痛剧而呈搏动性者
- B.应指验脓法
- C.穿刺验脓法
- D.痛甚脉数者
- E.透光验脓法

31.患者，男，38岁。左颧面部疔疮，根深坚硬，形如钉丁状，红肿灼痛，伴发热，恶寒，头痛等全身症状，舌红苔腻，脉滑数。其治法是

- A.清热消肿
- B.和营消肿
- C.清热凉血
- D.清热解毒
- E.和营托毒

32.治疗体表脓肿，实施切开引流的有利时机是

- A.肿疡初起
- B.肿疡溃后
- C.脓肿中央出现透脓点
- D.溃疡肉芽暗红
- E.疮疡肿硬



33. 下列切开法的注意事项中，错误的是
- A. 在关节部位，宜谨慎开刀，切口应越过关节
  - B. 血管瘤、岩肿不宜切开
  - C. 患者体弱应先内服调补药，然后开刀
  - D. 面部疔疮，尤其是口鼻部位，忌早期开刀
  - E. 进刀时，刀头要求向上挑取，不宜向下割划

34. 下列各项中需用砭镰法治疗的是

- A. 托盘疔
- B. 颜面部疔
- C. 红丝疔
- D. 蛇眼疔
- E. 有头疽

35. 红丝疔的好发部位是

- A. 面部
- B. 胸腹部
- C. 四肢后侧
- D. 四肢内侧
- E. 四肢外侧

36. 附骨疽脓腔较深、脓液不易畅流者宜采用

- A. 药线引流
- B. 垫棉法
- C. 扩创引流
- D. 导管引流
- E. 以上皆非

37. 丹毒的主要病因病机是

- A. 风温夹痰凝结经络
- B. 风温湿热蕴结肌肤
- C. 外邪侵犯，血分有热，郁于肌肤
- D. 经络阻塞，气血凝滞
- E. 暑湿热毒流注肌间

38. 患者，男，30岁。右手掌红肿热痛，整个手掌肿胀高突，掌心失去正常的凹陷，手背肿势明显，疼痛剧烈，红肿蔓延到手臂，伴发热头痛。其诊断是

- A. 蛇头疔
- B. 蛇眼疔
- C. 蛇肚疔
- D. 托盘疔
- E. 红丝疔

(39~40 题共用备选答案)

- A. 痈
- B. 瘰疬
- C. 流痰
- D. 有头疽
- E. 红丝疔

39. 易发生内陷的疾病是

金英杰医学网  
JINYINGJIE.COM



40.可发生走黄的疾病是

41.患者，女，24岁。患腿痈1周，溃腐3天，脓腐稠厚且多，不易脱落。外用掺药应首选

- A.青黛散
- B.八二丹
- C.红灵丹
- D.八宝丹
- E.三石散

42.患儿，5岁。颌下有肿块，形似鸡卵，皮肤焮红灼热，肿势高突，压痛明显，按之中软，有波动感，高热不退。其治法是

- A.清热疏风，化痰散结
- B.清热疏风，托里透脓
- C.清热疏风，泻火解毒
- D.清热疏风，利湿消肿
- E.滋阴清热，托里透脓

43.患儿，女，7岁。结喉处红肿绕喉，根脚散漫，肿势延及颈部两侧，按之中软，有应指感。治疗应首选

- A.内服普济消毒饮
- B.外治以菊花汁调制玉露散箍围束毒
- C.半流质饮食
- D.切开排脓
- E.药线引流

44.患者，女，32岁。左臀部出现硬结，红热不显，有触痛，步行不便，有患部肌肉注射史。应首先考虑的是

- A.无头疽
- B.有头疽
- C.臀痈
- D.痈
- E.肉瘤

45.患者臀部漫肿不红，结块坚硬，病情进展缓慢，无全身症状，舌苔白腻，脉缓。其证候是

- A.湿火蕴结证
- B.湿痰凝滞证
- C.气血两虚证
- D.气滞痰凝证
- E.痰热蕴结证

46.王某，男，69岁。患者项部有头疽月余，症见疮形平塌，根盘散漫，疮色紫滞，疮腐难脱，脓水稀少，身热不退，唇燥口干，舌红苔薄黄中剥，脉细数，伴有消渴证。治疗应首选

- A.仙方活命饮
- B.托里消毒散
- C.竹叶黄芪汤
- D.十全大补汤
- E.五味消毒饮

47.疮疡三陷证中，火陷证的治法是

- A.凉血清热解毒，养阴清心开窍



- B.补益气血，清心安神开窍
- C.温补脾肾，清心开窍
- D.托毒透邪，养阴清心开窍
- E.生津养胃，清心解毒

48.患者，男，48岁。背部生疮，初起肿块上有一粟粒样脓头，抓破后局部肿痛加剧，色红灼热，脓头相继增多，溃后如蜂窝状，伴有寒热头痛，纳呆，便秘，溲赤，舌质红，苔黄，脉弦数。其诊断是

- A.疔
- B.疖
- C.有头疽
- D.发
- E.痈

49.下列各项中不属于痈的疾病是

- A.颈痈
- B.脐痈
- C.腋痈
- D.锁喉痈
- E.委中毒

50.治疗火陷证的首选的方剂

- A.托里消毒散
- B.附子理中汤
- C.五味消毒饮
- D.清营汤
- E.龙胆泻肝汤

51.下列各项，不属疔疮走黄原因的是

- A.麻痘余毒未清
- B.误食辛热之品
- C.早期失治
- D.挤压碰撞
- E.过早切开

52.哺乳期乳房疼痛有肿块，按之痛重。首先考虑的诊断是

- A.乳癖
- B.乳痈
- C.乳癌
- D.乳核
- E.乳癆

53.患者，女，28岁。产后乳房胀痛，位于乳房外上方皮肤焮红，肿块形似鸡卵，压痛明显，按之中软，有波动感，伴壮热口渴。切开引流的切口是

- A.循乳络方向作放射状切口
- B.乳晕旁弧形切口
- C.脓肿处作任意切口
- D.以乳头为中心的弧形切口
- E.脓肿波动明显处作切口

54.乳痈初起的主要症状是



- A.乳头溢液，不痛不痒
- B.乳头破碎，痛如刀割
- C.乳晕肿痛，皮肤微红
- D.乳房肿痛，恶寒发热
- E.乳房肿块，垂坠作痛

55.下列各项不属于乳痈外治法初期的是

- A.鲜菊花捣烂外敷
- B.金黄散外敷
- C.乳房按摩
- D.及时切开排脓
- E.局部外敷

56.患者，男，50岁。右颜面部红肿疼痛伴发热2天，皮色鲜红，色如涂丹，压之褪色，扪之灼手，边界清楚，触痛明显，大便2日未行。治疗应首选

- A.葶藶渗湿汤加减
- B.五味消毒饮加减
- C.普济消毒饮加减
- D.黄连解毒汤加减
- E.犀角地黄汤加减

57.患者，女，24岁。有先天性乳头凹陷史。近1月来发现右乳晕内侧有一直径约3cm肿块，局部疼痛不适，形态不规则，边界尚清，质地硬韧，挤压后可见白色脂汁样物质溢出。首先考虑

- A.乳晕部痈疔
- B.乳腺癌
- C.浆细胞性乳腺炎
- D.导管内乳头状瘤
- E.乳房部漏管

58.患者，女，40岁。双乳肿块界限不清，经前乳房胀痛，伴有月经不调，腰酸乏力，舌质淡红，苔白，脉细。治疗应首选

- A.左归丸
- B.开郁散
- C.逍遥贝蒺散
- D.二仙汤合四物汤
- E.六味地黄汤

59.乳核的肿块特点是

- A.形如鸡卵，光滑，柔韧，活动，无痛
- B.坚硬如石，表面不平，固定不活动，与皮肤粘连
- C.结节样肿块，位于乳晕下，按压乳窍溢血
- D.肿胀疼痛，皮肤灼热焮红，形成脓肿
- E.肿块扁圆，多位于乳晕中央，轻度疼痛

60.患者，女，24岁。患有乳腺纤维瘤，肿块较小，不红不热，不觉疼痛，推之可移动，伴胸闷叹息，舌红苔薄白，脉弦细。治法是

- A.疏肝解郁，理气和中
- B.调摄冲任
- C.疏肝解郁，化痰散结



D.健脾和胃

E.调补气血，清热解毒

61.治疗乳岩肝郁痰凝证，应首选的方剂是

A.神效瓜蒌散合开郁散

B.二仙汤合开郁散

C.八珍汤

D.人参养荣汤

E.参苓白术散

62.张某，女，52岁。左乳癌晚期，破溃外翻如菜花，疮口渗流血水，面色苍白，动则气短，身体瘦弱，不思饮食，舌淡红，脉沉细无力。其治法是

A.疏肝解郁

B.扶正解毒

C.调理冲任

D.化痰散结

E.调补气血

63.治疗乳岩冲任失调首选的方剂

A.神效瓜蒌散合开郁散

B.二仙汤合开郁散

C.八珍汤合开郁散

D.人参养荣汤合开郁散

E.参苓白术散合开郁散

64.治疗气瘕应首选

A.海藻玉壶汤

B.四海舒郁丸

C.开郁散

D.逍遥散

E.桃红四物汤

65.患者，女，38岁。结喉右侧可及3 cm×3 cm×3 cm肿物，表面光滑，质韧，无压痛，随吞咽上下移动。应首先考虑的是

A.气瘕

B.肉瘕

C.血瘕

D.石瘕

E.瘕疝

66.下列各项，不属瘕疝特征的是

A.颈中两侧结块

B.皮色不变

C.微有灼热


D.疼痛牵引至耳后枕部

E.容易化脓

67.颈前肿块初起皮色不变，后红肿灼热，疼痛明显，伴恶寒发热，头痛，口渴咽干，苔薄黄。此属

A.肝郁气滞

B.风热痰凝



- C.血瘀化热
- D.痰瘀内结
- E.气滞痰凝

68. 下列关于脂瘤叙述错误的是

- A.好发于青春期
- B.多发于汗腺、皮脂腺丰富的部位
- C.最有效的治疗方法是手术切除
- D.痰湿化热型脂瘤可服用龙胆泻肝汤
- E.脂瘤肿块不规则，边界不清楚

69. 患者，男，40岁。左肩部可见一肿块，呈扁平团块状，边界清楚，暗红色，触之柔软，推之可动，无明显疼痛。应首先考虑的是

- A.血管瘤
- B.失荣
- C.肾岩
- D.肉瘤
- E.肉瘤

70. 患者，男，46岁。背部皮下肿块，无疼痛，生长缓慢，呈扁平分叶状，质软活动，界线清楚，皮色如常，与皮肤无粘连。其诊断是

- A.脂瘤
- B.骨瘤
- C.肉瘤
- D.气瘤
- E.血管瘤

71. 失荣辨证属于阴毒结聚证者，正确的治法为

- A.益气养荣，疏肝散结
- B.益气养血，化痰散结
- C.疏肝解郁，活血散结
- D.养阴解毒，疏肝解郁
- E.温阳散寒，化痰散结

72. 治疗失荣早期气郁痰结证，应首选

- A.和营散坚丸
- B.柴胡清肝汤
- C.桃红四物汤
- D.化痰开郁方
- E.二陈汤

73. 患者，男，30岁。颈部肿块，溃后脓水清稀，夹有败絮样物质，经久不敛。应首先考虑的是

- A.发
- B.瘰疬
- C.颈痛
- D.失荣
- E.无头疽

74. 患者，男，68岁。因感冒伴发口唇成群小水疱，破碎后呈糜烂与结痂，自觉瘙痒，灼热。其治法是

- A.内服黄连解毒汤
- B.内服普济消毒饮
- C.内服五味消毒饮
- D.外搽青吹口油膏
- E.外搽白玉膏

75.治疗疣目湿热血瘀证，应首选的方剂是

- A.治疣方加板蓝根、夏枯草
- B.马齿苋合剂加薏苡仁、冬瓜仁
- C.桃红四物汤加薏苡仁、板蓝根
- D.四物汤加薏苡仁、板蓝根
- E.龙胆泻肝汤加薏苡仁、板蓝根

76.患者，男，38岁。两手出现皮下小水疱，疱壁破裂，叠起白皮，中心已愈，四周续起疱疹。诊断为鹅掌风，外治应首选的药物是

- A.雄黄膏
- B.皮脂膏
- C.疯油膏
- D.青黛膏
- E.复方土槿皮酊

77.患者，男，30岁。两大腿内侧可见3枚钱币形红斑，边界清楚，中心消退，外围扩张，无明显疼痛，瘙痒感明显，多在夏季加重，入冬减轻。应首先考虑的是

- A.圆癣
- B.紫白癜风
- C.白秃疮
- D.鹅掌风
- E.肥疮

78.筋瘤的病因病机是

- A.寒湿凝滞，痰浊瘀阻
- B.长期站立，劳倦伤气
- C.长期卧床，气血运行不畅
- D.肾阳不足，寒湿之邪外侵
- E.跌仆损伤，气血凝滞


79.湿疮湿热浸淫证的治疗主方

- A.龙胆泻肝汤合五味消毒饮
- B.龙胆泻肝汤合草薢渗湿汤
- C.小儿化湿汤
- D.当归饮子
- E.四物消风饮

80.下列有皮肤损害的疾病，禁用糖皮质激素的是

- A.牛皮癣
- B.接触性皮炎
- C.天疱疮
- D.湿疹
- E.水痘

81.药毒之热毒入营证的治疗方剂首选



- A. 萹藨渗湿汤
- B. 清营汤
- C. 增液汤合益胃汤
- D. 消风散
- E. 五神汤

82. 药毒气阴两虚证的治疗方剂首选

- A. 萹藨渗湿汤
- B. 清营汤
- C. 增液汤合益胃汤
- D. 消风散
- E. 五神汤

83. 首发药毒的潜伏期一般是

- A. 10 天以内
- B. 5~20 天
- C. 1 个月
- D. 24 小时内
- E. 药后半小时

84. 患者，男，31 岁。颈项部皮肤增厚，干燥，瘙痒较剧，情绪波动时，瘙痒随之加剧，部分皮肤因反复搔抓形成苔藓样变化。其诊断是

- A. 接触性皮炎
- B. 牛皮癣
- C. 白疔
- D. 慢性湿疹
- E. 紫白癜风

85. 寻常型白疔进行期，外治应首选

- A. 10% 硫黄软膏
- B. 黄连膏
- C. 三黄洗剂
- D. 热烘疗法
- E. 5% 薄荷脑洗剂

86. 患者，男，33 岁。患白疔，发病较久，皮疹多呈斑片状，颜色淡红，鳞屑减少，干燥皲裂，自觉瘙痒，伴口干，舌质淡红，苔少，脉沉细。其治法是

- A. 清热泻火，凉血解毒
- B. 清利湿热，解毒通络
- C. 活血化瘀，解毒通络
- D. 养血滋阴，润肤息风
- E. 清热凉血，解毒消斑

87. 以下哪一项为淋病临床特点

- A. 龟头红肿，包皮内有大量脓性分泌物
- B. 外生殖器有多个痛性溃疡，表面有脓性分泌物，尿道口红肿
- C. 尿道分泌物少，为黏液状
- D. 尿道口刺痛，尿道口排出脓性分泌物
- E. 外生殖器多为单个无痛性溃疡

(88~89 题共用备选答案)



- A.龙胆泻肝汤
- B.知柏地黄丸
- C.萆薢渗湿汤
- D.萆薢化毒汤
- E.清营汤

88.治疗淋病湿热毒蕴证的主方是

89.治疗淋病阴虚毒恋证的主方是

90.沈某，男，28岁。外生殖器及肛门出现单个质坚韧丘疹，腹股沟部有杏核样大、色白坚硬之肿块，伴口苦纳呆，尿短赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉弦数。其证候是

- A.肝经湿热
- B.痰瘀互结
- C.脾虚湿蕴
- D.气血两虚
- E.气阴两虚

91.晚期梅毒引起器官破坏的特异性病理变化是

- A.干酪样坏死
- B.树胶样肿
- C.闭塞性动脉内膜炎
- D.血管周围炎
- E.血管中毒性损害

(92~93题共用备选答案)

- A.扩肛法
- B.切开疗法
- C.肛裂侧切术
- D.纵切横缝法
- E.挂线疗法

92.适用于不伴有结缔组织外痔、皮下瘻等的陈旧性肛裂的手术是

93.适用于早期肛裂,无结缔组织外痔、肛乳头肥大等合并症者的手术是

94.患尖锐湿疣，外生殖器及肛门出现疣状赘生物，色灰，质柔软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭，小便色黄，不畅，舌苔黄腻，脉弦数。治拟利湿化浊，清热解毒。应首选

- A.黄连解毒汤
- B.萆薢化毒汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.知柏地黄丸
- E.土茯苓合剂

95.治疗内痔之湿热下注证的方药是

- A.凉血地黄汤
- B.槐花散
- C.脏连丸
- D.止痛如神汤
- E.补中益气汤

96.患者，男，78岁。腰痛，尿流突然中断，尿频，尿急，尿痛，小便混赤，口干欲饮。舌红，苔黄腻，脉弦数。可以服用如下哪种方剂

- A.三金排石汤加减



- B.金铃子散加减
- C.石韦汤加减
- D.济生肾气丸加减
- E.六味地黄丸

97.贯穿结扎法最适用的是

- A.内痔嵌顿
- B.静脉曲张性外痔
- C.血栓性外痔
- D.赘皮外痔
- E.Ⅱ、Ⅲ期内痔

98.肛隐窝炎的并发症是

- A.肛口肿胀
- B.肛口疼痛
- C.肛口出血
- D.肛乳头炎
- E.肛口潮湿

99.积极治疗对预防肛痈、肛漏有重要意义的疾病是

- A.肛裂
- B.内痔
- C.外痔
- D.肛隐窝炎
- E.息肉痔

100.关于一次切开挂线法治疗肛痈的适应证,错误的是

- A.肛门旁皮下脓肿
- B.坐骨直肠间隙脓肿
- C.骨盆直肠间隙脓肿
- D.直肠后间隙脓肿
- E.马蹄形脓肿

101.患者,男。肛门左侧皮下有一肿物5天,锨红热痛,按之应指。其诊断是

- A.坐骨直肠间隙脓肿
- B.骨盆直肠间隙脓肿
- C.直肠后间隙脓肿
- D.肛旁皮下间隙脓肿
- E.直肠脱出嵌顿

(102~103 题共用备选答案)

- A.截石位 3、7、11 点
- B.截石位 3、9 点
- C.截石位 6、12 点
- D.截石位 1、8 点
- E.截石位 4、10 点

102.血栓外痔好发于肛门齿线下

103.内痔好发于肛门齿线上

104.患者肛门刺痛明显,便时便后尤甚,肛门紧缩,裂口色紫暗,便秘,舌紫黯,脉涩,治疗应首选的方剂是

- A.脾约麻仁丸
- B.润肠汤
- C.六磨汤
- D.当归芍药汤
- E.大承气汤

105.患者，男，30岁。便后肛门部疼痛、出血反复发作10年。检查：肛门外观截石位6点有结缔组织外痔，并有梭形裂口通向肛内，边缘不齐，创面较深，术中见肛管狭窄明显。应首选的治疗措施是

- A.注射疗法
- B.扩肛疗法
- C.切除疗法
- D.纵切横缝
- E.肛裂切开

106.患者肛门部有物反复脱出近10年。检查：脱出物呈圆锥状，长约7cm，上可见沟纹。其诊断是

- A.混合痔
- B.内痔三期
- C.一度直肠脱垂
- D.二度直肠脱垂
- E.三度直肠脱垂

107.下列各项，不属锁肛痔排便习惯改变的是

- A.排便次数增多
- B.便秘
- C.便血
- D.便意频频
- E.排便不尽感

108.患者，男，38岁。患急性子痛2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛引及子系(精索)，舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，气血壅滞，经络阻隔为患。治宜清热解毒，利湿消肿，应首选

- A.透脓散
- B.滋阴除湿汤
- C.草薢化毒汤
- D.柴胡疏肝散
- E.枸橘汤加减

109.睾丸及附睾的急性化脓性感染称为

- A.子痰
- B.囊痈
- C.子痛
- D.脱囊
- E.卵子瘟

110.尿石症患者小腹痛，尿流突然中断，尿频，尿急，尿痛，小便混赤，口干欲饮，舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A.金铃子散
- B.石韦散

- C.化坚二陈汤
- D.三金排石汤
- E.济生肾气丸

111.男，43岁。尿道中有白色分泌物滴出3年，劳累后更为明显，伴腰膝酸冷，放射至会阴部，形寒肢冷，精神不振，头晕。首选

- A.龙胆泻肝丸
- B.知柏地黄丸
- C.左归丸
- D.济生肾气丸
- E.独活寄生汤

112.患者小便频数黄赤3年，尿道灼热涩痛，排尿不畅，时有点滴不通，小腹胀满，大便干燥，口苦口黏，舌暗红，苔黄腻，脉滑数。B超示前列腺6.5 cm×5.5 cm×5 cm，光滑无结节。其治法是

- A.清热利湿，消癥通闭
- B.补脾益气，温肾利尿
- C.行气活血，通窍利尿
- D.滋补肾阴，通窍利尿
- E.温补肾阳，通窍利尿

113.患者，男，70岁。进行性排尿困难2年。症见精神不振，面色白，畏寒喜暖，腰膝冷，夜尿3~4次/日，舌苔薄白，脉沉细。其证候是

- A.湿热下注，膀胱涩滞
- B.中气下陷，膀胱失约
- C.肾阴不足，水液不利
- D.肾阳不足，气化无权
- E.下焦蓄血，瘀阻膀胱

114.治疗前列腺增生，肾阳不足，气化无权证，应首选

- A.金锁固精丸
- B.济生肾气丸
- C.真武汤
- D.附桂八味丸
- E.调元肾气丸

115.烧伤患者，面色苍白，体温不升，呼吸气微，表情淡漠，嗜睡，四肢厥冷，汗出淋漓，舌淡无苔，脉微欲绝。证候是

- A.火热伤津证
- B.阴伤阳脱证
- C.火毒内陷证
- D.气血两伤证
- E.脾胃虚弱证

116.某男半小时前被热气灼伤两前臂，现局部疼痛剧烈，有散在水疱，个别破溃，基底部呈均匀红色、潮湿。其诊断是

- A.面积约为9%的浅Ⅱ度烧伤
- B.面积约为4.5%的Ⅱ度烧伤
- C.面积约为9%的Ⅲ度伤
- D.面积约为9%的Ⅰ度烧伤





E.面积约为 9%的深 II 度烧伤

117.小面积烧伤初期可用

- A.清凉油
- B.红油膏
- C.金黄膏
- D.冲和膏
- E.黄连膏

118.蛇咬伤后,辨证为风毒(神经毒)者,其治法是

- A.活血通络,驱风解毒
- B.清热解毒,凉血止血
- C.清利湿热,凉血息风
- D.凉血息风,豁痰开窍
- E.清热解毒,活血祛风,凉血止血

119.肌肉强直性痉挛是破伤风的典型症状之一,其首先出现的部位是

- A.上肢
- B.下肢
- C.头面
- D.颈项
- E.躯干

120.破伤风的潜伏期一般为

- A.24 小时
- B.2~3 天
- C.4~14 天
- D.20~30 天
- E.2~6 个月

(121~122 题共用备选答案)

- A.四妙勇安汤
- B.清利通络汤
- C.活血通脉汤
- D.复元活血汤
- E.活血散瘀汤

121.治疗股肿血脉瘀阻证的代表方剂是

122.治疗股肿湿热下注证的代表方剂是

123.患者,男,36 岁。手术后 1 周突然出现右下肢疼痛肿胀,皮肤色泽发绀,皮温增高,浅静脉怒张,大腿内侧有明显压痛,并伴有低热。应首先考虑的是

- A.脱疽
- B.血栓性浅静脉炎
- C.血栓性深静脉炎
- D.动脉硬化闭塞症
- E.糖尿病坏疽

124.排尿困难、排尿费力,呈点滴状,或出现尿流中断及急性尿潴留。排尿时疼痛明显,可放射至阴茎头部,诊断为

- A.尿道结石
- B.膀胱结石



金英杰医学网  
JINYINGJIE.COM

- C.肾结石
- D.输尿管结石
- E.胆囊炎

125.患者，男，73岁。左下肢内腓疮，面积5 cm×5 cm，现疮面仍有少许腐肉。外治应首选

- A.红油膏、九一丹
- B.白玉膏、生肌散
- C.金黄膏、九一丹
- D.金黄膏掺桃花散
- E.青黛膏、九一丹

126.脱疽初起，患者足背动脉、股后动脉的脉象多表现为

- A.弦数
- B.洪大
- C.结代
- D.微弱
- E.绝

127.患者，男，66岁。有高血压病史10余年。2年来双下肢发凉麻木，时有小腿部抽痛及间歇性跛行，近来足痛转为持久性静止痛，夜间尤甚，往往抱膝而坐，足背动脉搏动消失，诊断是

- A.血栓闭塞性脉管炎
- B.雷诺氏病
- C.糖尿病足
- D.动脉硬化性闭塞症
- E.动脉栓塞

128.治疗脱疽血脉瘀阻证，应首选的方剂是

- A.阳和汤
- B.桃红四物汤
- C.顾步汤
- D.四妙勇安汤
- E.黄芪鳖甲汤



129.男，35岁。患脱疽2年，目前左小腿足趾紫红，下垂时更甚，抬高则见苍白，足背毳毛脱落，皮肤、肌肉萎缩，趾甲变厚，趺阳脉搏动消失，患肢持久性静止痛，尤以夜间较甚，舌紫暗苔薄白，脉沉细。治疗应首选

- A.阳和汤
- B.顾步汤
- C.四妙勇安汤
- D.桃红四物汤
- E.独活寄生汤

(130~131题共用备选答案)

- A.内痔
- B.外痔
- C.肛乳头肥大
- D.肛漏
- E.锁肛痔

130.适宜采用硬化注射疗法的是

131.适宜采用挂线疗法的是

(132~133 题共用备选答案)

- A.寒湿阻络
- B.血脉瘀阻
- C.湿热毒盛
- D.热毒伤阴
- E.气阴两虚

132.脱疽表现为患肢黯红、紫红或青紫，下垂更甚，肌肉萎缩，趺阳脉搏动消失，患肢持久性疼痛，夜间尤甚。其证候是

133.脱疽表现为患肢黯红而肿，患肢如煮熟之红枣，渐变为紫黑色，呈浸淫蔓延，溃破腐烂，疼痛异常，彻夜不得安眠。证候

134.《刘涓子鬼遗方》的作者是

- A.危亦林
- B.龚庆宣
- C.葛洪
- D.王怀隐
- E.王焘

135.世界上最早用含碘食物治疗甲状腺疾病的记载见于

- A.《五十二病方》
- B.《肘后备急方》
- C.《刘涓子鬼遗方》
- D.《诸病源候论》
- E.《千金方》

(136~137 题共用备选答案)

- A.陈实功
- B.王维德
- C.高锦庭
- D.齐德之
- E.陈自明（《外科精要》）

136.明清“正宗派”的代表医家是

137.明清“全生派”的代表医家是

138.疔的治疗方法，以下列哪项为主

- A.散风清热
- B.泻火解毒
- C.凉血活血
- D.清热解毒
- E.和营解毒

139.结块范围约 3 cm，突起根浅，中心有一脓头，出脓即愈的疾病是

- A.疔病
- B.无头疔
- C.蜈蚣疔
- D.有头疔
- E.有头疽



140. 下列疔疮，容易损筋伤骨的是

- A. 烂疔
- B. 红丝疔
- C. 颜面疔
- D. 疫疔
- E. 手足疔

141. 下列属于无头疔的特点是

- A. 皮肤上有一红色结块，范围约 3 cm 左右，无脓头
- B. 红色结块，范围约 3 cm 大小，灼热疼痛，突起根浅，中心有一脓头
- C. 多发于儿童头部
- D. 不易成脓易溃、易敛
- E. 不易溃烂、不易收敛

142. 疫疔的致病因素属

- A. 外感六淫邪毒
- B. 外来伤害
- C. 情志内伤
- D. 饮食不洁
- E. 感受特殊之毒

143. 颈痈初起内治方剂最宜

- A. 五味消毒饮
- B. 仙方活命饮
- C. 牛蒡解肌汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 普济消毒饮

144. 有头疽初起症状多见

- A. 粟粒样脓头
- B. 蜂窝样脓头
- C. 肿块坚硬如钉钉之状
- D. 漫肿无头
- E. 腐烂疮面

145. 丹毒发于小腿，称为

- A. 流火
- B. 抱头火丹
- C. 内发丹毒
- D. 赤游丹
- E. 流注

146. 颜面部疔和疔的鉴别要点是

- A. 脓的形质
- B. 皮肤颜色
- C. 根脚深浅
- D. 起病速度
- E. 发热程度

147. 新生儿丹毒称

- A. 赤游丹



- B.抱头火丹
- C.流火
- D.内发丹毒
- E.腿游风

148.痈的一般范围是

- A.6~9 cm
- B.1~3 cm
- C.3~6 cm
- D.6~12 cm
- E.9~30 cm

149.患者，男。48岁。背部生疮，初起肿块上有一粟粒样脓头，抓破后局部肿痛加剧，色红灼热，脓头相继增多。溃后如蜂窝状，伴有寒热头痛，纳呆，便秘，溲赤，舌质红，苔黄，脉弦数。其诊断是

- A.疔
- B.疱
- C.有头疽
- D.发
- E.痈

150.患者，女，50岁。5天前左足3、4趾缝足癣水疱溃破，次日局部红肿疼痛，并见红线1条向上走窜至小腿中段，边界清晰，伴有发热，左胯腹部淋巴结肿痛。其诊断是

- A.流火
- B.流注
- C.青蛇毒
- D.蛇串疮
- E.红丝疔

151.附睾及睾丸的急性化脓性感染，称为

- A.子痰
- B.子痈
- C.囊痈
- D.水疝
- E.脱囊

152.检查乳房的最佳时间是

- A.经前
- B.经后3天
- C.经后7~10天
- D.经后2周
- E.经后3周

153.乳痈初起，证属肝气不舒，胃热壅滞。内治应首选

- A.逍遥散
- B.透脓散
- C.四妙汤
- D.瓜蒌牛蒡汤
- E.牛蒡解肌汤

154.乳痈热毒炽盛证最常用的方剂是



- A.瓜蒌牛蒡汤加减
- B.牛蒡解肌汤
- C.透脓散加减
- D.橘叶散加减
- E.开郁散加减

155.乳房与哪些经脉相关

- A.肝经、胆经
- B.脾经、肾经、督带脉
- C.肝经、肾经、带脉、督脉
- D.肝经、肾经、脾经、冲任脉
- E.脾经、胃经、带脉、督脉

156.陈旧性肛裂伴肛管狭窄者手术时多选用

- A.扩肛法
- B.纵切横缝法
- C.肛裂侧切术
- D.切开疗法
- E.挂线疗法

157.患者，女，52岁。左乳癌晚期，破溃外翻如菜花，疮口渗流血水，面色苍白，动则气短，身体瘦弱，不思饮食，舌淡红，脉沉细无力。其治法是

- A.疏肝解郁
- B.扶正解毒
- C.调理冲任
- D.化痰散结
- E.调补气血

158.结喉之处肿势散漫，坚硬灼痛，壮热口渴，吞咽困难的疾病是

- A.颈痈
- B.瘰疬
- C.发颐
- D.髂核
- E.锁喉痈

159.中医的失荣相当于西医所说的

- A.体表肿物
- B.脂肪瘤
- C.颈部淋巴结转移癌
- D.毛细血管瘤
- E.海绵状血管瘤

160.下列哪项不是失荣的特点

- A.质地坚硬
- B.表面凹凸不平
- C.多发于青少年
- D.肿块联结成串
- E.预后不良

161.下列哪一项不是血瘤的特点

- A.边界不清



中医执业医师  
WWW.ZHONGYIYIJI.COM

- B.触之如海绵状
- C.柔软而局限
- D.色泽鲜红或暗紫
- E.盘曲如蚯蚓状

162.有头疽初起的局部症状是

- A.粟粒样脓头
- B.肿硬如钉丁
- C.漫肿而无头
- D.腐烂如莲蓬
- E.腐烂大于尺

163.海绵状血管瘤的显著特点是

- A.皮色鲜红
- B.压缩性大
- C.青筋累累
- D.边界不清
- E.质地坚硬

164.肉瘤的西医病名是

- A.脂肪肉瘤
- B.骨骼肌肉瘤
- C.脂肪瘤
- D.纤维肉瘤
- E.平滑肌肉瘤

165.凡发生于颈部或耳之前后的一类岩证，面容憔悴，形体消瘦者，称之为

- A.石瘿
- B.失荣
- C.石疽
- D.筋瘤
- E.血瘤

166.脂瘤独有的特征是

- A.数目不等，大小不一，肿形如馒，推之可移
- B.青筋垒垒，盘曲成团，质地柔软，表面青蓝
- C.瘤中心有粗大毛囊孔，可挤出臭味脂浆
- D.瘤体单发，质地硬韧，界限清楚，推之可移
- E.瘤体深隐，质地坚硬，境界清楚，推之不移

167.患者，男，65岁。患背部有头疽月余，局部疮形平塌，根盘散漫，疮色紫滞，溃后脓水稀少，伴有唇燥口干，便艰溲短，舌质红，脉细数。内治应首选的方剂是

- A.仙方活命饮
- B.竹叶黄芪汤
- C.托里消毒散
- D.知柏地黄汤
- E.清骨散

168.蛇串疮的特点是

- A.皮肤上出现红斑、水疱或丘疱疹
- B.排列成带状，沿一侧周围神经分布区出现



- C.好发于胸胁部
- D.好发于春秋季节
- E.以上都是

169.患儿，男，9岁。头皮部初起丘疹色红，灰白色鳞屑成斑，毛发干枯，容易折断，易于拔落而不疼痛，已有年余，自觉瘙痒。其诊断是

- A.肥疮
- B.牛皮癣
- C.白秃疮
- D.白疔
- E.圆癣

170.牛皮癣的皮损特点是

- A.瘙痒性风团，发无定处，骤起骤退，消退后不留任何痕迹
- B.对称分布，多形损害，剧烈瘙痒
- C.皮损呈圆形或多角形的扁平丘疹，常融合成片，极易形成苔藓样变
- D.皮损为暗红、淡紫色或皮肤色多角形扁平丘疹，有蜡样光泽，网状纹
- E.皮损基底淡红色，上覆银白色鳞屑，剥后有薄膜现象和点状出血

171.下列哪项不是瘾疹的病因病机

- A.禀性不耐，卫外不固，风邪乘虚侵袭
- B.风寒、风热客于肌表
- C.肠胃湿热郁于肌表
- D.气血不足，虚风内生
- E.风湿热邪浸淫肌肤

172.肛漏手术成败的关键在于

- A.切除瘻管管壁
- B.避免损伤内括约肌
- C.正确找到内口并切开或切除
- D.将外口及瘻管切除
- E.以上都不是

173.下列哪一项为尖锐湿疣的中医病因病机

- A.湿热秽浊由下焦前阴入侵，阻于膀胱及肝经
- B.湿热秽浊之邪侵及肝经、下注阴部
- C.风热毒邪搏于肌肤而生
- D.秽浊之毒酿生湿热，下注皮肤黏膜
- E.淫秽疫毒与湿热、风邪杂合所致

(174~175 题共用备选答案)

- A.疼痛、出血、便秘
- B.流脓、疼痛、瘙痒
- C.肛门坠胀、有异物感
- D.肛周红、肿、热、痛
- E.便下脓血、黏液，便意频数

174.肛漏的局部症状为

175.肛裂的局部症状多为

176.患者男性，54岁。5年前腰部因疼痛，外贴膏药后皮肤出现局限性红肿，后起水疱，伴瘙痒，自行治疗后皮损结痂，有色素沉着，5年中病情反复发作，皮损肥厚干燥，有鳞屑，



瘙痒剧烈，舌淡红，苔薄，脉弦细数。其治疗方药是

- A. 黄连解毒汤加减
- B. 凉膈散加减
- C. 消风散合当归饮子加减
- D. 龙胆泻肝汤加减
- E. 化斑解毒汤合龙胆泻肝汤加减

177. 患者出现全身泛发性丘疹、斑丘疹 2 天，9 天前有因感冒服用阿莫西林史，2 天前躯干起针尖至米粒大小的丘疹或斑丘疹，色鲜红，伴瘙痒，后皮损很快密集融合，伴有发热，口唇焦燥，口渴不欲饮，小便黄，舌绛，苔少，脉洪数。诊断为何病

- A. 荨麻疹型药疹
- B. 麻疹样型药疹
- C. 多形红斑型药疹
- D. 湿疹样型药疹
- E. 剥脱性皮炎型药疹

178. 电烙法适应于

- A. 低位带蒂息肉
- B. 小儿无蒂息肉
- C. 较高位的小息肉
- D. 较低位的小息肉
- E. 以上都不是

179. 切开法适用于

- A. 适用于距离肛门 4 cm 以内，有内外口的低位肛漏
- B. 复杂性肛漏切开疗法或切除疗法的辅助方法
- C. 低位单纯性肛漏和低位复杂性肛瘘
- D. 高位肛瘘
- E. 肛门周围有皮肤病患者

180. II 度直肠脱垂的形态是

- A. 颗粒状
- B. 花瓣状
- C. 长柱形
- D. 圆锥形
- E. 以上均非

参考答案

1. 【参考答案】E

2. 【参考答案】B

【解析】多气多血——阳明经（大肠）（胃）。

3. 【参考答案】D

【解析】太乙膏性偏清凉，功能消肿清火，解毒生肌，可用于红肿热痛明显之阳证疮疡，为肿疡、溃疡的通用方。

4. 【参考答案】E

5. 【参考答案】A

【解析】形成瘤的主要病机是邪气偏盛。

6. 【参考答案】D



中华医药网  
JINYINGJIE.COM

【解析】形成岩的主要病机是正气不足。

7. 【参考答案】C

【解析】病因属感受特殊之毒的是漆疮。

8. 【参考答案】D

【解析】病因属外来伤害的是水火烫伤。

9. 【参考答案】B

【解析】暑邪的致病特性是热轻则痒，热甚则痛，热胜则肉腐。

10. 【参考答案】D

【解析】外科辨别阴证、阳证要点是有无灼热。

11. 【参考答案】D

【解析】外科疾病辨证的总纲是阴阳。

12. 【参考答案】D

【解析】外疡发于多血少气之经，治疗时应注重的是破血、补托。

13. 【参考答案】C

【解析】多气多血之经是手阳明大肠经。

14. 【参考答案】A

【解析】寒肿的特征是肿而不硬，皮色不泽，苍白或紫暗，皮肤清冷。

15. 【参考答案】D

【解析】痰肿的特征是肿势或软如绵，或硬如馒，形态各异，不红不热。

16. 【参考答案】C

【解析】风肿特点：发病急骤，漫肿宣浮。

17. 【参考答案】E

【解析】湿肿特点：皮肉重垂胀急，深按凹陷。

18. 【参考答案】B

【解析】“痛而酸胀，肢体沉重，按之出现可凹性水肿或见糜烂流滋的”的疼痛原因是湿。

19. 【参考答案】C

【解析】疼痛时轻时重，发作不定，忽然痛忽然停止，其疼痛是阵发痛。

20. 【参考答案】A

【解析】“痒”病因有热胜、湿胜、虫淫、风胜。

21. 【参考答案】D

【解析】脓色绿黑稀薄者的病机是蓄毒日久损伤筋骨。

22. 【参考答案】B

【解析】脓液黄浊质稠，色泽不净的病机是气火有余。

23. 【参考答案】D

【解析】疮面呈翻花或如岩穴属岩性溃疡。

24. 【参考答案】D

【解析】梅毒性溃疡表现为：创面边缘整齐，坚硬削直而如凿成，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。

25. 【参考答案】B

【解析】肿疡毒势方盛，正气已虚者首选托里消毒散。

26. 【参考答案】C

【解析】疮疡内治，清气分热之常用方剂是黄连解毒汤。

27. 【参考答案】D

【解析】疮疡内治，清血分热之常用方剂是犀角地黄汤。

28. 【参考答案】 E

【解析】 焮法适应证：阳证疮疡初起、阴证疮疡、美容、保健等。

29. 【参考答案】 C

【解析】 膏药在古代称为薄贴。

30. 【参考答案】 E

31. 【参考答案】 D

32. 【参考答案】 C

【解析】 体表脓肿实施切开引流的有利时机是脓肿中央出现透脓点。

33. 【参考答案】 A

【解析】 关节区切开法：避免越过关节，常为横切口，弧形切口，S形切口。

34. 【参考答案】 C

【解析】 适用于急性阳证疮疡，如下肢丹毒、红丝疔及疔疮、痈肿初起，外伤瘀血肿痛，痔疮肿痛等。

35. 【参考答案】 D

36. 【参考答案】 D

【解析】 附骨疽脓腔较深、脓液不易畅流者宜采用导管引流。是将导管（或塑胶管或橡皮管）插入疮口中，引导脓水外流的一种引流方法。

37. 【参考答案】 C

38. 【参考答案】 D

【解析】 托盘疔为掌中间隙感染。

39. 【参考答案】 D

40. 【参考答案】 E

41. 【参考答案】 B

【解析】 疔的外用掺药应首选八二丹。

42. 【参考答案】 A

【解析】 颈痈：风热痰毒证的一治法为散风清热，化痰消肿。

43. 【参考答案】 D

【解析】 疔出现应指感时应切开排脓。

44. 【参考答案】 C

【解析】 臀痈的发病特点成脓较快是发病急，病位深，范围广，难于起发，成脓较快，但腐溃较难，收口亦慢。

45. 【参考答案】 B

【解析】 此病证属湿痰凝滞证。

46. 【参考答案】 C

【解析】 有头疽阴虚火炽证方选竹叶黄芪汤。

47. 【参考答案】 A

48. 【参考答案】 C

【解析】 范围常超过 9~12cm，大者可在 30cm 以上。好发于项后、背部等皮肤厚韧之处。

49. 【参考答案】 D

50. 【参考答案】 D

【解析】 治疗火陷证的首选的方剂是清营汤。

51. 【参考答案】 A

【解析】 疔疮走黄原因的是误食辛热之品、早期失治、挤压碰撞、过早切开。

52. 【参考答案】 B

【解析】乳痈多见于产后 3~4 周的哺乳期妇女。

53. 【参考答案】A

【解析】乳痈切开引流应循乳络方向作放射状切口。

54. 【参考答案】B

【解析】初期：乳头皲裂，刺痛；乳房肿痛，皮色微红，或伴有恶寒发热。

55. 【参考答案】D

【解析】乳痈外治法初期未成脓，因此不包括切开排脓。

56. 【参考答案】C

57. 【参考答案】C

【解析】粉刺性乳痈即西医学的浆细胞性乳腺炎，其特点是多在非哺乳期或非妊娠期发病，常有乳头凹陷或溢液，初起肿块多位于乳晕部，化脓溃破后脓中夹有脂质样物质。

58. 【参考答案】D

【解析】该病例为乳癖冲任失调证；治法：调摄冲任；方用二仙汤合四物汤。

59. 【参考答案】A

【解析】乳核是发生在乳房部最常见的良性肿瘤，相当于西医的乳腺纤维腺瘤，其特点是好发于 20~25 岁青年妇女，乳中结核，形如丸卵，边界较清楚，表面较光滑，推之可活动，肿块一般无疼痛感，与月经周期无关。

60. 【参考答案】C

61. 【参考答案】A

【解析】乳岩肝郁痰凝证：主症：乳房部肿块质硬而边界不清，情志抑郁，胸闷肋胀，苔薄脉弦，治法：疏肝解郁，化痰散结，方药：神效瓜蒌散合开郁散加减。

62. 【参考答案】E

【解析】本病例属正虚毒炽证——主症：乳房肿块扩大，精神萎靡，面色晦暗，饮食少进，舌紫或瘀斑，苔黄，脉弱无力，——治法：调补气血，清热解毒，——方药：八珍汤加减，配加半枝莲、白花蛇舌草、硃穿、露峰房等清热解毒之品。

63. 【参考答案】B

【解析】冲任失调证——主症：乳房结块坚硬，经期紊乱，素有经前乳房胀痛，舌淡苔薄，脉弦细，——治法：调摄冲任，理气散结，——方药：二仙汤合开郁散加减。

64. 【参考答案】B

【解析】治疗气瘿应首选四海舒郁丸。

65. 【参考答案】B

【解析】患病年龄常在 40 岁以下，多为女性，结喉正中附近，有单个肿块或多个结节，表面光滑，质地柔韧坚实，按之不痛，推之可移，可随吞咽上下移动。

66. 【参考答案】B

【解析】瘰疬特点是结喉两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓，相当于西医的急性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎。

67. 【参考答案】B

68. 【参考答案】E

69. 【参考答案】A

【解析】血管瘤是指人体的体表血络扩张，纵横丛集而形成的肿瘤，可发生于身体任何部位，大多数为先天性，其特点是病变局部色泽鲜红或暗紫，或呈局限性柔软肿块，边界不清，触之如海绵状，相当于西医疾病的血管瘤。

70. 【参考答案】C

【解析】肉瘤的特点是软似棉，肿似馒，皮色不变，不紧不宽，如肉之隆起，相当于西医的

脂肪瘤，小的肉瘤可不处理，大者宜手术切除。属良性肿瘤。

71. 【参考答案】 E

72. 【参考答案】 D

【解析】失荣早期气郁痰结证——主症：颈部或耳前、耳后有坚硬之肿块，肿块较大，聚结成团，与周围组织粘连而固定，有轻度刺痛或胀痛，颈项有牵扯感，活动转侧不利，患部皮色暗红微热，伴胸闷肋痛、心烦口苦等症，舌质红，苔微黄腻，脉弦滑。——治法：理气解郁，化痰散结。——方药：化痰开郁方。

73. 【参考答案】 B

【解析】瘰疬的特点：颈部肿块，溃后脓水清稀，夹有败絮样物质，经久不敛。

74. 【参考答案】 D

【解析】热疮是发热后或高热过程中在皮肤黏膜交界处所发生的急性疱疹性皮肤病，相当于西医的单纯疱疹，其特点是：皮损为成群的水疱，有的互相融合，好发于口唇、鼻孔周围、面颊、等皮肤黏膜交界处。局部外用药物以清热、解毒、燥湿、收敛为主，可用紫金锭或金黄散或青吹口散油膏、黄连膏等。

75. 【参考答案】 B

【解析】疣目湿热血瘀证——治法：清化湿热，活血化瘀，——方药：马齿苋合剂加冬瓜仁、薏苡仁，推疣法：在疣的根部用棉花棒与皮肤平行向前推进，还可以用鸦胆子散敷贴法。

76. 【参考答案】 E

77. 【参考答案】 A

【解析】圆癣皮损多呈钱币状、圆形，边界清楚，中心消退，外围扩张，无明显疼痛，瘙痒感明显，多在夏季加重，入冬减轻。

78. 【参考答案】 B

【解析】筋瘤好发于下肢，相当于西医学的下肢静脉曲张，与长期站立、劳倦伤气有关。

79. 【参考答案】 B

【解析】湿疮湿热浸淫证的治疗主方为龙胆泻肝汤合萹薹渗湿汤。

80. 【参考答案】 E

【解析】水痘为病毒感染，糖皮质激素禁用于病毒感染。

81. 【参考答案】 B

【解析】药毒之热毒入营证——主症：皮疹鲜红或紫红，灼热痒痛，伴高热，神志不清，舌红绛，镜面舌，脉洪数，——治法：清热凉血，解毒护阴；——方药：清营汤加减。

82. 【参考答案】 C

【解析】药毒气阴两虚——主症：药疹后期大片脱屑，伴低热，神疲乏力，口干欲饮，舌红少苔，脉细数，——治法：益气养阴清热，——方药：增液汤合益胃汤加减。

83. 【参考答案】 B。

【解析】有一定的潜伏期，第二次发病多在用药后 5~20 天内，重复用药常在 24 小时内发生，短者甚至在用药后瞬间或数分钟内发生。

84. 【参考答案】 B

【解析】牛皮癣特点是：皮损多呈圆形或多角形的扁平丘疹融合成片，剧烈瘙痒，搔抓后皮损肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，极易形成苔藓化。

85. 【参考答案】 B。

【解析】寻常型白疮进行期，外治应用黄连膏。

86. 【参考答案】 D

【解析】白疮血虚风燥证——主症：皮疹呈斑片状，颜色淡红，鳞屑较少，干燥皲裂，自觉瘙痒，舌红，苔少，脉沉细，——治法：养血滋阴，润肤息风，——方药：当归饮子加减。

87. 【参考答案】D

88. 【参考答案】A

89. 【参考答案】B

【解析】淋病湿热毒蕴证的主方是龙胆泻肝汤；淋病阴虚毒恋证的主方是知柏地黄丸。

90. 【参考答案】A

【解析】口苦纳呆，尿短赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉弦数可辨证为肝经湿热证。

91. 【参考答案】B

【解析】晚期梅毒引起器官破坏的特异性病理变化是树胶样肿。

92. 【参考答案】C

93. 【参考答案】

94. 【参考答案】

95. 【参考答案】C

96. 【参考答案】A

【解析】湿热蕴结证——主症：腰痛或小腹痛，或尿流中断，尿频，尿急，尿痛，舌红苔黄腻，脉弦数；——治法：清热利湿，通淋排石；——方药：三金排石汤加减。

97. 【参考答案】E

【解析】结扎术适应证：适用于Ⅱ～Ⅲ期的内痔，特别是纤维型内痔。

98. 【参考答案】D

【解析】肛隐窝炎常并发肛乳头炎和肛乳头肥大，可成为肛周脓肿和肛瘘的发病根源。

99. 【参考答案】D

【解析】积极治疗对预防肛痈、肛漏有重要意义的疾病是肛隐窝炎。

100. 【参考答案】A

【解析】一次切开挂线法：适应证 适用于高位脓肿，如由肛隐窝感染而致坐骨直肠间隙脓肿，骨盆直肠间隙脓肿，直肠后间隙脓肿及马蹄形脓肿等。

101. 【参考答案】D

【解析】肛门旁皮下脓肿 发生于肛门周围的皮下组织内，局部红、肿、热、痛明显，脓成按之有波动感，全身症状轻微。

102. 【参考答案】B

103. 【参考答案】A

104. 【参考答案】C

【解析】肛裂：证见气滞血瘀，用六磨汤破气。

105. 【参考答案】D

【解析】有梭形裂口通向肛内，边缘不齐，创面较深，术中见肛管狭窄明显，首选的治疗措施是：纵切横缝。

106. 【参考答案】D

【解析】二度脱垂 为直肠全层脱出，脱出物长 5~10 cm，触之较厚，有弹性，便后有时需用手回复。

107. 【参考答案】C

【解析】锁肛痔排便习惯改变 也是直肠癌常见的早期症状。表现为排便次数增多，便意频繁，便不尽感等。有时为便秘，同时肛门内有不适或下坠感。

108. 【参考答案】E

【解析】子痛：湿热下注证——治法：清热利湿，解毒消肿；——方药：枸橘汤或龙胆泻肝汤加减。疼痛剧烈者，加延胡索、金铃子。

109. 【参考答案】C

【解析】子痰是发生于肾子的疮癆性疾病，相当于西医的附睾结核，故排除 A；囊痈是发于睾丸以外的阴囊部位的急性化脓性疾病，故排除 B；脱囊指阴囊红肿溃破，甚至睾丸外悬，故排除 D；卵子瘟由腮腺炎病毒经血侵入睾丸所致，患者忽然囊红发热，睾丸一侧或双侧肿大，故排除 E。子痈指睾丸及附睾的化脓性疾病

110. 【参考答案】 D

【解析】尿石症：湿热蕴结证——主症：腰痛或小腹痛，或尿流中断，尿频，尿急，尿痛，舌红苔黄腻，脉弦数；——治法：清热利湿，通淋排石；——方药：三金排石汤加减。

111. 【参考答案】 D

【解析】慢性前列腺炎：肾阳虚损证——治法：补肾助阳；——方药：济生肾气丸加减。

112. 【参考答案】 A

【解析】湿热蕴结证——主症：尿频，尿急，尿痛，尿道有灼热感，排尿终末或大便时偶有白浊，苔黄腻，脉滑数；——治法：清热利湿。

113. 【参考答案】 D

【解析】肾阳虚损证——主症：多见于中年人，排尿淋漓，腰膝酸软。阳痿早泄，形寒肢冷。

114. 【参考答案】 B

【解析】肾阳虚损证——治法：补肾助阳；——济生肾气丸加减。

115. 【参考答案】 B

【解析】阴伤阳脱证——主症：神疲倦卧，面色苍白，呼吸气微，自汗肢冷，脉微欲绝或虚大无力。

116. 【参考答案】 A

【解析】两前臂为：9%；浅Ⅱ度烧伤 伤及真皮浅层。局部红肿，有大小不一水疱，内含黄色或淡红色血浆样液体或蛋白凝固的胶冻物，愈后短期内可有色素沉着，不留瘢痕。

117. 【参考答案】 A

118. 【参考答案】 A

【解析】风毒证——治法：活血通络，驱风解毒；——方药：活血驱风解毒汤。

119. 【参考答案】 C

【解析】肌肉强直性痉挛是破伤风的典型症状之一，其首先出现的部位是头面。

120. 【参考答案】 C

【解析】破伤风的潜伏期长短不一，一般为 4~14 天，短者 24 小时之内，长者数月或数年不等。潜伏期的长短与创伤性质部位、伤口的早期处理方式以及是否接受过预防注射因素有关。潜伏期越短，病情越严重，预后也越差，死亡率也越高。

121. 【参考答案】 C

122. 【参考答案】 A

【解析】治疗股肿血脉瘀阻证的代表方剂是活血通脉汤；治疗股肿湿热下注证的代表方剂是四妙勇安汤。

123. 【参考答案】 B

【解析】血栓性浅静脉炎的临床表现发病部位以四肢多见(尤其多见于下肢)，次为胸腹壁等处。(1)初期(急性期) 在浅层脉络(静脉)上出现条索状物，患处疼痛，皮肤发红，手触之较硬，扪之发热，按压疼痛较明显，肢体沉重；(2)后期(慢性期) 患处遗有一条索状物，其呈黄褐色，可有按压疼痛，或结节破溃形成疔疮。

124. 【参考答案】 A

【解析】尿道结石：主要表现为排尿困难、排尿费力，呈点滴状，或出现尿流中断及急性尿潴留。排尿时疼痛明显，可放射至阴茎头部，后尿道结石可伴有会阴和阴囊部疼痛。

125. 【参考答案】 C

【解析】 疔疮的外治初期：局部红肿、若溃破渗液较多者，宜用洗药治疗。渗液量较少者，局部红肿，渗液量少者，宜金黄膏薄敷，1日1次。亦可加少量九一丹撒布于疮面上，再盖金黄膏。

126. 【参考答案】 D

【解析】 脱疽是由四肢末端经脉闭阻不通引起的。初起时经脉尚未完全闭阻，但阳气微弱鼓动无力，其脉微弱。

127. 【参考答案】 D

【解析】 动脉硬化性闭塞症 多见于40岁以上的中、老年人，双侧下肢常同时发病，多数病人血胆固醇含量较高，脂蛋白代谢异常，并伴有高血压、冠状动脉供血不足等并发症。临床特点是好发于四肢末端，以下肢多见，初起患肢末端发凉、怕冷、苍白、麻木，可伴间歇性跛行，继则疼痛剧烈，日久患趾(指)坏死变黑，甚至趾(指)节脱落。

128. 【参考答案】 B

【解析】 血脉瘀阻证——治法：活血化瘀，通络止痛；——方药：桃红四物汤加减。

129. 【参考答案】 D

【解析】 脱疽：血脉瘀阻证——治法：活血化瘀，通络止痛；——方药：桃红四物汤加减。

130. 【参考答案】 A

131. 【参考答案】 D

132. 【参考答案】 B

133. 【参考答案】 C

【解析】 脱疽：血脉瘀阻证——主症：患趾(指)肿胀疼痛加重，皮色暗红或紫暗，皮肤发凉干燥，趺阳脉搏动消失，舌暗红或有瘀斑，舌苔薄白，脉弦涩。患肢持久性疼痛，夜间尤甚。湿热毒盛证——主症：患肢剧痛，局部肿胀，皮肤紫暗，呈浸淫蔓延，溃破腐烂，便秘溲赤，舌红苔黄腻，脉弦数。

134. 【参考答案】 C

【解析】 《刘涓子鬼遗方》的作者是龚庆宣。

135. 【参考答案】 B

【解析】 世界上最早用含碘食物治疗甲状腺疾病的记载见于《肘后备急方》。

136. 【参考答案】 A

137. 【参考答案】 B

【解析】 明清“正宗派”的代表医家是陈实功；明清“全生派”的代表医家是王维德。

138. 【参考答案】 D

139. 【参考答案】 D

140. 【参考答案】 E

【解析】 发于颜面部的疔疮很容易走黄而有生命危险；发于手足部的疔疮则易损筋伤骨。

141. 【参考答案】 A

【解析】 无头疔：无脓头。

142. 【参考答案】 E

【解析】 疫疔的致病因素属疫疔的致病因素属。

143. 【参考答案】 C

【解析】 风热痰毒证——内治：散风清热，化痰消肿；——方药：牛蒡解肌汤或银翘散加减。牛蒡解肌翘丹栀，夏枯荆薄石斛玄，疏风清热又散肿、牙痛颈毒皆可医。牛蒡子疏散风热；清热解毒透疹；宣肺利咽散肿。

144. 【参考答案】 A



【解析】有头疽初起症状多见粟粒样脓头。

145. 【参考答案】A

【解析】生于躯干部者，称内发丹毒；发于头面部者，称抱头火丹；发于小腿足部者，称流火；新生儿多生于臀部，称赤游丹毒。

146. 【参考答案】C

【解析】颜面部疔和疔的鉴别：疔好发于颜面部，但红肿范围不超过 3 cm，无明显根脚，一般无全身症状。疔肿势范围约 3~6 cm，但根深坚硬，状如钉丁。

147. 【参考答案】A

【解析】生于躯干部者，称内发丹毒；发于头面部者，称抱头火丹；发于小腿足部者，称流火；新生儿多生于臀部，称赤游丹毒。

148. 【参考答案】A

【解析】疔<痈<发<有头疽；疔 3 cm 左右；痈 6~9 cm；有头疽常超过 9~12 cm，大者可超过 30。

149. 【参考答案】C

【解析】特点是初起皮肤上即有粟粒样脓头，焮热红肿胀痛，迅速向深部及周围扩散，脓头相继增多，溃烂后状如莲蓬、蜂窝，范围常超过 9~12 cm，大者可在 30 cm 以上。好发于项后、背部等皮肤厚韧之处，多见于中老年人及消渴病患者，并且容易发生内陷。

150. 【参考答案】E

【解析】红丝疔是发于四肢，皮肤呈红丝显露，迅速向上走窜的急性感染性疾病。可伴恶寒发热等全身症状，邪毒重者可内攻脏腑，发生走黄。

151. 【参考答案】B

【解析】附睾及睾丸的急性化脓性感染，称为子痈。

152. 【参考答案】C

【解析】检查乳房的最佳时间是经后 7~10 天。

153. 【参考答案】D

【解析】气滞热壅证——主症：乳汁郁积结块，肿胀疼痛，伴有恶寒发热，周身酸楚，口渴，便秘，苔薄，脉数；——治法：疏肝清胃，通乳消肿；——方药：瓜蒌牛蒡汤加减。

154. 【参考答案】E

【解析】热毒炽盛证——治法：清热解毒，托里透脓；——方药：透脓散加味。

155. 【参考答案】D

【解析】乳房与肝经、肾经、脾经、冲任脉相关，女子乳头、乳房：肝、胃；男子乳头、乳房：肝、肾，此外还有：脾、冲任二脉至胸中。

156. 【参考答案】B

【解析】陈旧性肛裂伴肛管狭窄者手术时多选用纵切横缝法。

157. 【参考答案】E

【解析】正虚毒炽证——主症：乳房肿块扩大，精神萎靡，面色晦暗，饮食少进，舌紫或瘀斑，苔黄，脉弱无力。——治法：调补气血，清热解毒。——方药：八珍汤加减。

158. 【参考答案】E

159. 【参考答案】C

【解析】中医的失荣相当于西医所说的颈部淋巴结转移癌。

160. 【参考答案】C

【解析】颈部淋巴瘤多见于 40 岁以上男性。颈部淋巴结炎多见于儿童，颈部淋巴结结核多见于儿童或青年。

161. 【参考答案】E

【解析】蔓状血管瘤：由曲张、蜿蜒、盘曲如肠襻状的异常血管群组成，可见曲张的血管影，质软，用手摸有明显的波动感，且温度较高（小动脉和静脉形成）。筋瘤：盘曲如蚯蚓状，指下肢静脉曲张交错成团。

162.【参考答案】A

163.【参考答案】B

【解析】海绵状血管瘤：柔软肿物局限，压缩性大，色紫暗。

164.【参考答案】C

【解析】肉瘤的西医病名是脂肪瘤。

165.【参考答案】B

【解析】凡发生于颈部或耳之前后的一类岩证，面容憔悴，形体消瘦者，称之为失荣。相当于西医的颈部淋巴瘤。

166.【参考答案】C

【解析】脂瘤独有的特征是瘤中心有粗大毛囊孔，可挤出臭味脂浆。

167.【参考答案】B

【解析】患背部有头疽月余，诊断为有头疽；溃后脓水稀少，伴有唇燥口干，诊断为阴虚火炽证；治法为滋阴生津，清热托毒；方药为竹叶黄芪汤加减。

168.【参考答案】E

【解析】特点是：皮肤上出现红斑、水疱或丘疱疹，累累如串珠，排列成带状，沿一侧周围神经分布区出现，局部刺痛。

169.【参考答案】C

【解析】白秃疮病变初起，头皮覆盖有圆形或不规则形的灰白色鳞屑的斑片，小者如豆，大者如钱，日久蔓延，扩大成片。毛发干枯，容易折断，易于拨出，而不疼痛，头发自行折断，长短参差不齐。在接近头皮的毛发于外围，常有灰白色菌鞘围绕。自觉瘙痒。发病部位以头顶、枕部居多。白秃皮损为厚积的银白色鳞屑性斑片，头发呈束状，无断发现象，并有薄膜现象及筛状出血。

170.【参考答案】C

【解析】特点是：皮损多呈圆形或多角形的扁平丘疹融合成片，剧烈瘙痒，搔抓后皮损肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，极易形成苔藓化。

171.【参考答案】E

【解析】本病因先天禀赋不足，卫外不固，风邪乘虚侵袭所致；或表虚不固，风寒、风热外袭；或饮食不节，肠胃积热，复感风邪。

172.【参考答案】C

【解析】肛漏手术成败的关键在于正确找到内口并切开或切除。

173.【参考答案】D

【解析】尖锐湿疣的中医病因病机是秽浊之毒酿生湿热，下注皮肤黏膜。

174.【参考答案】B

175.【参考答案】A

【解析】本病有周期性疼痛，大便时出血，量少色鲜红，便秘。

176.【参考答案】C

【解析】接触性皮炎：血虚风燥证——主症：病程长，皮损肥厚干燥有鳞屑，或呈苔藓样变，舌淡红苔薄，脉细；——治法：养血润燥，祛风止痒；——方药：当归饮子合消风散加减。

177.【参考答案】B

【解析】麻疹样型皮损多为密集、红色、帽针头至米粒大的斑疹或斑丘疹，常对称性分布，可泛发全身，以躯干部位为多见，类似于麻疹。

178.【参考答案】C

【解析】电烙法适应于较高位的小息肉。

179.【参考答案】C

【解析】切开法适用于低位单纯性肛漏和低位复杂性肛瘘。

180.【参考答案】D

【解析】直肠脱垂：1度 3~5cm；2度 5~10cm，圆锥状；3度 10cm 以上圆柱状。

