

210-1

试卷标码:1601

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

**2020 年临床执业助理医师资格考试
模拟试卷
(医学综合笔试部分)**

报考类别：临床执业助理医师

第一单元

考试日期：2020 年 8 月 21 日

考试时间：9：00—11：00

考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 体内脂肪大量动员时，肝内生成的乙酰 CoA 主要生成
 - 胆固醇
 - 二氧化碳和水
 - 葡萄糖
 - 酮体
 - 草酰乙酸
- 下列不符合 1 型糖尿病特点的是
 - 容易发生酸中毒
 - 常伴有胰岛素抵抗
 - 罕见高渗性非酮症性昏迷
 - 血浆胰岛素水平明显减低
 - 对胰岛素敏感
- 肩关节脱位时，肱骨头最容易脱出的方向是
 - 前方
 - 外侧
 - 内侧
 - 上方
 - 后方
- 下列不属于抗甲状腺药物副作用的是
 - 乳酸酸中毒
 - 血管炎
 - 粒细胞缺乏症
 - 皮疹
 - 中毒性肝病
- 变性蛋白质的主要特点是
 - 分子量降低
 - 溶解性增加
 - 溶解性降低
 - 生物学活性降低
 - 共价键被破坏
- 胆固醇不能转化为
 - 维生素 D
 - 雄激素
 - 雌激素
 - 醛固酮
 - 胆色素
- 患者经抗肿瘤治疗后尿检发现大量葡萄糖和氨基酸，推测其肾单位受损部位是
 - 近端小管
 - 肾小球
 - 集合管
 - 髓袢升支粗段
 - 远端小管
- 用力牵拉肌肉时，肌张力突然降低的原因是
 - 肌梭抑制
 - 拮抗剂抑制
 - 骨骼肌疲劳
 - 协同肌兴奋
 - 腱器官兴奋
- 内脏痛的主要特点是
 - 刺痛
 - 慢痛
 - 定位不精确
 - 必有牵涉痛
 - 对牵拉不敏感

10. 不属于缓解哮喘急性发作药物的是
- 静脉用糖皮质激素
 - 抗胆碱能药物
 - 短效茶碱
 - 速效 β_2 受体激动剂
 - 白三烯调节剂
11. 下列关于抑制性突触后电位的描述, 正确的是
- 具有“全或无”性质
 - 是局部去极化电位
 - 是局部超极化电位
 - 由突触前膜递质释放量减少所致
 - 由突触后膜对钠通透性增加所致
12. 用于鉴别 COPD 和支气管哮喘的试验是
- 过敏原试验
 - 支气管激发试验
 - 低氧激发试验
 - 运动试验
 - 支气管舒张试验
13. 常以肌无力为最早表现的电解质紊乱是
- 低钙血症
 - 高钙血症
 - 高磷血症
 - 低钾血症
 - 高钾血症
14. 苯丙酮尿症属于
- 染色体畸变
 - 常染色体隐性遗传
 - 常染色体显性遗传
 - X 连锁显性遗传
 - X 连锁隐性遗传
15. 典型的食管癌症状特点是
- 持续性胸骨后异物感
 - 胸痛
 - 间断吞咽困难伴呕吐
 - 渐进加重的吞咽困难
 - 反酸、胃灼热伴吞咽困难
16. 能增加左心室后负荷的临床情况是
- 室间隔缺损
 - 二尖瓣反流
 - 高血压
 - 主动脉瓣反流
 - 房间隔缺损
17. 与宫颈上皮内瘤变 III 级发病关系最密切的是
- HIV
 - HSV
 - HCV
 - HBV
 - HPV
18. 富含维生素 A 的食物是
- 粮谷类
 - 猕猴桃
 - 动物肝脏
 - 奶及奶制品
 - 马铃薯
19. 老年人无痛性肉眼血尿, 首先应考虑为
- 泌尿系畸形
 - 泌尿系肿瘤
 - 泌尿系感染
 - 泌尿系结石
 - 泌尿系结核
20. 不符合急性单纯性阑尾炎表现的是
- 有低热表现
 - 右下腹局部压痛
 - 右下腹局限性轻度反跳痛
 - 白细胞计数轻度升高
 - 均有腹肌紧张
21. 急性面神经炎的临床表现
- 偏侧面部全部表情肌瘫痪
 - 偏侧面部疼痛
 - 偏侧面下部表情肌瘫痪
 - 偏侧面部全部表情肌抽搐
 - 偏侧面上部表情肌瘫痪
22. 骨囊肿好发于

- A.长管状骨骨端
B.扁骨骨端
C.长管状骨干骺端
D.短状骨骨端
E.短骨干骺端
- 23.囊尾蚴在人体最常见的寄生部位是
A.脊髓
B.心脏
C.脑
D.眼
E.皮下及肌肉
- 24.胺碘酮的药理作用是
A.加快心肌传导
B.收缩冠状动脉
C.增加心肌耗氧量
D.增加心肌自律性
E.明显延长心肌不应期
- 25.COPD,慢性肺源性心脏病患者发生Ⅱ型呼吸衰竭时,下列治疗措施中不恰当的是
A.无创通气
B.持续高浓度吸氧
C.静脉点滴糖皮质激素
D.雾化吸入支气管舒张剂
E.静脉点滴祛痰药物
- 26.以下需要限期手术的疾病是
A.外伤性肠破裂
B.急性阑尾炎
C.脂肪瘤
D.腹股沟疝
E.胃癌
- 27.肛裂“三联征”是指
A.肛裂、出血、肛乳头肥大
B.肛裂、疼痛、前哨痔
C.肛裂、前哨痔、肛乳头肥大
D.疼痛、出血、前哨痔
E.疼痛、便秘、出血
- 28.治疗新生儿缺氧缺血性脑病控制惊厥首选的药物是
A.苯妥英钠
B.苯巴比妥钠
C.氯丙嗪
D.水合氯醛
E.地西泮
- 29.唯一能通过胎盘进入胎儿体内的免疫球蛋白是
A.IgM
B.IgA
C.IgG
D.IgD
E.IgE
- 30.脂肪酸合成的原料乙酰 CoA 从线粒体转移至细胞液的途径是
A.丙氨酸-葡萄糖循环
B.糖醛酸循环
C.柠檬酸-丙酮酸循环
D.乳酸循环
E.三羧酸循环
- 31.骑跨伤导致尿道断裂时,最有效的治疗方法是
A.导尿
B.耻骨上膀胱造瘘
C.清除会阴部血肿
D.经会阴尿道修补
E.保守观察、抗炎治疗
- 32.结核分枝杆菌的生物特性中,对临床诊断最有意义的是
A.生长缓慢
B.抵抗力强
C.菌体结构复杂
D.抗酸性
E.多形性
- 33.细菌性肝脓肿致病菌最常见的侵入途径是
A.肝血管
B.胆道系统
C.肝静脉
D.门静脉

- E.肝总动脉
- 34.甲状腺癌预后最好的病理类型是
- A.乳头状癌
B.滤泡状癌
C.鳞状细胞癌
D.髓样癌
E.未分化癌
- 35.高钾血症常见的临床表现是
- A.心动过速
B.肠蠕动消失
C.四肢肌张力增强
D.便秘
E.心动过缓
- 36.产后出血最常见的原因是
- A.胎盘植入
B.血小板减少
C.子宫收缩乏力
D.胎盘嵌顿
E.胎盘粘连
- 37.术前判断胰头癌是否侵犯大血管的检查方法是
- A.MRCP
B.内镜超声
C.B 型超声
D.腹腔血管造影
E.增强 CT
- 38.铁的吸收部位是在
- A.胃窦
B.胃底
C.十二指肠及空肠上段
D.回肠中段
E.回肠末段
- 39.双胎妊娠最常见的并发症为
- A.脐带脱垂
B.产褥感染
C.产程延长,产后出血
D.胎头交锁
E.胎膜早破
- 40.对确诊苯丙酮尿症最具意义的检查是
- A.尿三氯化铁试验
B.尿蝶呤分析
C.尿 2,4-二硝基苯胍试验
D.Guthrie 细菌生长抑制试验
E.血液苯丙氨酸浓度测定
- 41.乳腺癌根治术,术前禁食时间是
- A.4 小时
B.6 小时
C.8 小时
D.12 小时
E.24 小时
- 42.下列实验室检查结果支持阵发性睡眠性血红蛋白尿诊断的是
- A.血红蛋白电泳异常
B.酸溶血(Ham)试验阳性
C.高铁血红蛋白还原试验阳性
D.抗人球蛋白(Coombs)试验阳性
E.红细胞渗透性增高
- 43.肺性脑病患者的治疗方面,下列哪项为错误的
- A.口鼻面罩无创通气
B.持续低流量给氧
C.静脉应用呼吸兴奋剂
D.鼻饲饮食
E.应用镇静剂治疗
- 44.成人出现便隐血阳性时,消化道出血量至少大于
- A.5 mL
B.6 mL
C.8 mL
D.9 mL
E.10 mL
- 45.确诊女性生殖道淋病奈瑟菌感染取分泌物部位是
- A.肛周
B.子宫腔
C.宫颈管
D.阴道壁

- E.阴道口
- 46.血尿的常见原因不包括
- A.膀胱癌
- B.IgA 肾病
- C.急性膀胱炎
- D.输尿管结石
- E.单纯性肾囊肿
- 47.右心衰竭患者最有意义的体征是
- A.心率明显增快
- B.心律显著不齐
- C.胸骨左缘 4~5 肋间闻及舒张早期奔马律
- D.胸骨左缘 3~4 肋间闻及收缩期杂音
- E.肺动脉瓣区第 2 心音明显亢进
- 48.确定患者重型颅脑损伤深昏迷最有价值的体征是
- A.眼球固定
- B.肠鸣音消失
- C.三凹征阳性
- D.深浅反射消失
- E.呼之不应
- 49.急性普通型肝炎,肝坏死的类型为
- A.桥接坏死
- B.大片坏死
- C.点状坏死
- D.灶状坏死
- E.碎片状坏死
- 50.拾物试验阳性见于
- A.踝关节结核
- B.膝关节结核
- C.腰椎结核
- D.髋关节结核
- E.肩关节结核
- 51.引起 I 型呼吸衰竭的常见病因是
- A.肺部广泛炎症
- B.慢性支气管炎
- C.慢性阻塞性肺疾病
- D.肺源性心脏病
- E.上呼吸道阻塞
- 52.切纸工人,不慎将右拇指切断,因工地距医院较远,为争取再植成功,再植时限不超过
- A.6~8 小时
- B.9~12 小时
- C.12~14 小时
- D.15~17 小时
- E.18~20 小时
- 53.韦克斯勒智力测验组成主要是
- A.表达与心理测验
- B.推理与思维测验
- C.行为与思维测压
- D.词汇与动作测验
- E.言语与操作量表测验
- 54.室性心动过速心电图诊断的最主要依据是
- A.QRS 波群形态宽大畸形
- B.心室率 100~200 次/分
- C.心室律稍微不规则
- D.心室夺获和室性融合波
- E.房室分离,房率>室率
- 55.亚急性感染性心内膜炎正确的抗菌治疗原则是
- A.根据体温变化间断给药
- B.大剂量短疗程用药
- C.口服抗生素
- D.药敏结果回报前首选庆大霉素静脉滴注
- E.早期应用,争取连续数次血培养后立即静脉滴注抗生素
- 56.下列不属于心理治疗原则的是
- A.中立原则
- B.回避原则
- C.正义原则
- D.真诚原则

- E. 保密原则
57. HIV 与感染细胞膜上 CD4 分子结合的病毒刺突是
- A. gp/60
B. p 17
C. v 24
D. gp/20
E. gp 41
58. 膀胱癌在病理学上最重要的是
- A. 病变部位
B. 浸润程度
C. 分化程度
D. 组织类型
E. 生长方式
59. 下列细菌中最常引起医院感染的是
- A. 变形杆菌
B. 耐药性金黄色葡萄球菌
C. 乙型溶血性链球菌
D. 结核分枝杆菌
E. 伤寒沙门菌
60. 小儿化脓性脑膜炎合并脑积水原因是
- A. 由于不规律用药
B. 由于血脑屏障功能差

A2 型题

- C. 由于炎性渗出物阻碍脑脊液循环而致
- D. 由于炎症累及下丘脑和垂体
- E. 以上都不是
61. 多巴胺舒张肾血管是由于
- A. 使组胺释放
B. 激动 α 受体
C. 激动 β 受体
D. 激动 M 胆碱受体
E. 激动多巴胺受体
62. 长期食用甲基汞的人群易得的疾病是
- A. 伤寒
B. 霍乱
C. 痛痛病
D. 四日市喘息
E. 水俣病
63. 颅内压增高的典型临床表现是
- A. 头痛, 恶心, 偏瘫
B. 头痛, 呕吐, 血压升高
C. 头痛, 呕吐, 视乳头水肿
D. 头痛, 抽搐, 意识障碍
E. 偏瘫, 偏盲, 偏身感觉障碍

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

64. 女, 37 岁, 人工流产后 2 年出现痛经, 进行性加重, 需服用止痛药物, 妇科检查: 子宫后倾屈, 如妊娠 50 天大小, 呈球状, 质硬, 活动受限。B 超检查示子宫肌层回声不均匀, 局部有短线状增强。最可能的诊断是
- A. 盆腔结核

- B. 子宫内膜炎
C. 慢性盆腔炎
D. 子宫肌瘤
E. 子宫腺肌病
65. 女, 42 岁, 闭经、溢乳半年, 磁共振发现垂体 $1.5\text{ cm} \times 1.0\text{ cm}$ 占位病变, 需做激素检查。下列无助于诊断的检查是

- A.泌乳素
- B.生长激素
- C.血管加压素
- D.促肾上腺皮质激素
- E.促甲状腺激素

66.女,58岁。咳嗽伴痰中带血2周,胸部X线片及CT检查发现右肺上叶周围型结节,痰细胞学检查示:鳞癌可能性大。该患者首选的治疗是

- A.化学药物治疗
- B.免疫治疗
- C.手术治疗
- D.介入治疗
- E.放射治疗

67.女,22岁。头晕、乏力1年。实验室检查:血Hb 70 g/L, RBC $3.0 \times 10^{12}/L$, WBC $4.1 \times 10^9/L$, Plt $200 \times 10^9/L$, 血清铁蛋白 $4 \mu\text{g}/L$,最可能的诊断是

- A.地中海贫血
- B.慢性病性贫血
- C.巨幼细胞贫血
- D.骨髓增生异常综合征
- E.缺铁性贫血

68.男孩,5岁。颜面、四肢水肿半个月。查体:BP 120/80 mmHg。尿常规:蛋白:3+。尿沉渣镜检查:RBC 20/HP,血总蛋白 40 g/L,白蛋白 25 g/L。最可能诊断是

- A.急性肾炎
- B.急进性肾炎
- C.慢性肾炎
- D.肾炎型肾病综合征
- E.单纯性肾病综合征

69.初产妇,28岁。分娩过程中,宫口全开2小时10分钟,露S+2,胎位LOT,宫缩强度由强转为中,持续40分钟,宫缩间歇时间由2.5分钟延长至4~5分钟,诊断为第二产程延长,造成这种情况最常见的原因是

- A.胎儿过大
- B.产妇衰竭
- C.中骨盆平面狭窄
- D.骨盆出口狭窄
- E.宫缩乏力

70.33岁,女。反复饥饿性上腹痛5年,疼痛多在餐前,进食后缓解,近段时间上腹痛加剧,并向背部放射,最可能的诊断是

- A.复合性溃疡
- B.胃溃疡
- C.十二指肠球后壁溃疡
- D.十二指肠球炎
- E.十二指肠球前壁溃疡

71.女,65岁。反复腹痛伴停止排气排便5天。少尿2天。查体:T 37.8℃,P 111次/分,R 22次/分,BP 80/50 mmHg,全腹膨隆,全腹无压痛、反跳痛,未触及包块,肠鸣音减弱。电解质:K⁺ 2.35 mmol/L,Na⁺ 137 mmol/L,Cl⁻ 106 mmol/L。以下治疗决策中正确的是

- A.静脉少量补充氯化钾溶液
- B.见尿后补钾
- C.静脉大量补充氯化钾溶液
- D.利尿后补钾
- E.口服补钾

72.女,50岁。既往有慢性乙型病毒性肝炎病史10余年,1个月前出现右上腹隐痛不适。查体:右腹部膨隆,可扪及质地坚硬,表面凹凸不平的肿块,移动性浊音阳性。腹腔积液为血性,最可能的诊断是

- A.肝血管瘤
- B.肝囊肿
- C.原发性肝癌
- D.肝包虫病
- E.肝脓肿

73.女孩,3岁。发热、咳嗽和气促1周,查体:精神不振,面色苍白,呼吸急促,皮肤可见荨麻疹样皮疹,双肺可闻及细湿啰音。

胸部 X 线片示双肺多发性小脓肿。最可能的诊断是

- A. 肺炎支原体肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 流感嗜血杆菌肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 腺病毒肺炎

74. 男性, 33 岁。患者神经衰弱 3 月余, 未经治疗, 主要表现头痛, 失眠, 脑力疲乏, 精神易兴奋, 应选择进行治疗的药物是

- A. 氯氮平
- B. 氯丙嗪
- C. 地西洋
- D. 喹硫平
- E. 利培酮

75. 女, 22 岁。咽痛、发热伴咳嗽 2 周, 颜面水肿 3 天。查体: BP 150/100 mmHg, 全身皮肤无皮疹。尿常规: 蛋白(++)。尿沉渣镜检: RBC 20~30/HP。血肌酐 115 $\mu\text{mol/L}$, 补体 C3 降低, ASO 升高。下列治疗不适宜的是

- A. 抗生素
- B. 休息
- C. 应用激素
- D. 利尿
- E. 控制血压

76. 男, 62 岁。间断上腹痛 10 余年, 加重伴餐后上腹胀 3 年, 胃镜见幽门前区大弯侧直径 1.5 cm 范围黏膜不平, 活检病理示重度异型增生, 最适当的处理方法是

- A. 口服 H_2 受体拮抗剂, 近期复查
- B. 口服胃黏膜保护剂, 近期复查
- C. 口服质子泵抑制剂治疗
- D. 近期行胃镜下黏膜切除术
- E. 近期进行胃大部分切除术

77. 男, 66 岁。劳累时胸痛 4 年, 每于上 3 层楼梯时症状发作, 含服硝酸甘油 3~5 分

钟可缓解。既往高血压病史 10 年, 糖尿病病史 8 年。可改善该患者预后的治疗措施是

- A. 长期口服他汀类药物
- B. 长期口服营养心肌类药物
- C. 冠状动脉支架植入术
- D. 冠状动脉旁路移植术
- E. 皮下注射低分子肝素

78. 女, 30 岁。左上腹被拖拉机撞伤后钝痛 1 天, 突发左上腹剧痛 3 小时。查体: P 140 次/分, BP 60/45 mmHg, 面色苍白, 四肢厥冷, 上腹中部压痛, 肌紧张, 腹部叩诊移动性浊音(+), 腹腔穿刺抽出不凝固血液。最可能的诊断是

- A. 胃破裂
- B. 脾破裂
- C. 小肠破裂
- D. 结肠破裂
- E. 肝破裂

79. 男性, 24 岁。服务业人员, 未婚, 不否认有性交行为, 半月前躯干、四肢、双手掌跖出现红斑, 无痒痛感觉, 查躯干、四肢可见玫瑰色椭圆形斑疹, 对称分布, 掌跖部可见黄豆大小铜红色领圈样脱屑, 患者最大可能是

- A. 玫瑰糠疹
- B. 红斑狼疮
- C. 梅毒
- D. 麻疹
- E. 结节性红斑

80. 女婴, 5 个月。3 天内抽搐 4 次。发作时意识不清, 持续 2 分钟, 自行缓解, 醒后活泼如常, 不伴发热。实验室检查: 血钙 1.73 mmol/L, 血镁 1.00 mmol/L, 血糖 3.9 mmol/L。最可能的诊断是

- A. 维生素 D 依赖性佝偻病
- B. 低镁血症

C.低血糖症

D.婴儿痉挛症

E.维生素 D 缺乏性手足抽搐症

81.女,33岁。闭经2年,内分泌检查血FSH 55 U/L,诊断为

A.垂体性闭经

B.卵巢性闭经

C.子宫性闭经

D.肾上腺性闭经

E.下丘脑性闭经

82.男,2岁。左侧阴囊包块,平卧后包块消失,质软,先触痛。透光试验阳性,最可能的诊断为

A.睾丸鞘膜积液

B.精索鞘膜积液

C.交通性鞘膜积液

D.睾丸肿瘤

E.腹股沟斜疝

83.女,35岁。心悸、消瘦6个月,高热、腹泻、谵语1天。查体:T 40.2℃,BP 90/60 mmHg,大汗,甲状腺Ⅱ度肿大,可闻及血管杂音,双肺未闻及干湿性啰音,心率200次/分,心律绝对不齐。应首先考虑的诊断是

A.甲状腺危象

B.感染性休克

C.甲状腺功能亢进症合并肠炎

D.甲亢性心脏病

E.急性甲状腺炎

84.男,45岁。发现血尿,蛋白尿8年。查体:BP 150/90 mmHg。实验室检查:尿蛋白定量1.2~1.8 g/d,血肌酐10 μmol/L。临床诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.肾病综合征

C.隐匿性肾小球肾炎

D.高血压肾损害

E.慢性肾小球肾炎

85.2岁患儿,4天前发热、流涕、咳嗽、结膜充血、畏光,今晨发现耳后及颈部有淡红色斑丘疹,体温39℃,两颊黏膜充血,最可能的诊断是

A.风疹

B.幼儿急疹

C.麻疹

D.肠道病毒感染

E.猩红热

86.女,18岁。腹痛、腹泻、消瘦3年。腹部阵发性疼痛,大便3~4次/日,伴黏液和血。有家族性结肠息肉病史。查体:营养不良,贫血貌,腹平软,下腹部有轻压痛。结肠镜检查见结肠内全部布满息肉,直肠病变轻。最佳手术方式是

A.结肠次全切除术

B.经腹会阴联合全结直肠切除术

C.单腔回肠造瘘术

D.电灼摘除息肉

E.全结肠切除、末端回肠直肠吻合术

87.男,24岁。低热、气促、腹胀10天。查体:心界向两侧扩大,心尖搏动点位于左侧心界内侧,心音低钝,心脏各瓣膜区未闻及杂音。肝肋下3 cm。胸部X线片示:肺野清晰,心影增大。心电图:窦性心动过速,QRS波群低电压,广泛性T波低平。该患者最可能的诊断是

A.缩窄性心包炎

B.肥厚型心肌病

C.急性心肌梗死

D.风湿性心脏病

E.急性心包炎

88.男,42岁。发热3周,胸闷3天。无咳嗽、咳痰和咯血,曾使用“三代头孢菌素”抗感染治疗无效。查体:T 37.8℃,BP 140/90 mmHg,右下肺呼吸音消失,语音共振减弱。胸部X线片示右下肺大片状密度增高

影,上缘呈外高内低弧形。为明确诊断,应首选的检查是

- A.胸腔穿刺抽液
- B.胸部 CT
- C.血肿瘤标志物
- D.超声心动图
- E.支气管镜

89.女,65岁。左膝关节严重疼痛,步行距离少于500米。查体:左膝关节屈曲挛缩形,活动受限,负重位膝关节正位X线片显示左膝内侧关节间隙消失,骨质硬化,边缘骨赘增生。最可能的诊断是

- A.骨关节炎
- B.痛风关节炎
- C.化脓性关节炎
- D.骨关节结核
- E.风湿性关节炎

90.男,46岁。吸烟12年。每天1包,自己知道吸烟的一些危害,但认为不会发生在自己身上,根据行为改变阶段理论,对于该男士目前应采取的干预步骤是

- A.继续维持,不断强化
- B.提供方法,鼓励尝试
- C.提高认识,激动动机
- D.提供信息,提高认知
- E.支持鼓励,加以强化

91.男,22岁。咳嗽伴发热3天,给予青霉素静滴抗感染治疗,用药后患者突然出现气急、胸闷、烦躁不安。查体:T 38.5℃,P 140次/分,R 37次/分,BP 75/40 mmHg,面色苍白,大汗淋漓,两肺可闻及喘鸣音,身体多部位红色皮疹。最可能的原因是

- A.急性左心衰竭
- B.哮喘急性发作
- C.过敏性休克
- D.急性呼吸窘迫综合征
- E.感染性休克

92.某病人,15岁。在生活中养成不良的抽烟习惯,父母非常恼火,心理医师建议其采取的较有效的行为治疗是

- A.环境因素和操作动作相结合
- B.厌恶刺激与不良行为相结合
- C.用转变注意力的方法来矫正
- D.条件刺激和非条件刺激相结合
- E.通过对不良行为的认识来矫正

93.女,72岁。反复咳嗽、喘息18年,1个月前搬入新居后再发加重,口服“茶碱类”药物有所缓解。查体:双肺呼吸音低,呼气相延长。胸部X线片未见明显异常。肺功能检查示FEV₁/FVC 56%,舒张试验示FEV₁%改善率12%。该患者应首先考虑的诊断是

- A.慢性阻塞性肺疾病
- B.支气管哮喘
- C.慢性充血性心力衰竭
- D.过敏性肺炎
- E.嗜酸性粒细胞性肺炎

94.患者,男,24岁,吸烟患者。因低热、咳嗽3个月,痰中带血1周来院门诊。查体:T 37.5℃,双侧颈后可触及多个可活动之淋巴结,右上肺可闻及支气管肺泡音,胸片示右上肺云雾状阴影。最可能的诊断是

- A.原发型肺结核
- B.血行播散型肺结核
- C.浸润型肺结核
- D.支气管肺癌
- E.慢性纤维空洞型肺结核

95.男性,40岁。陈旧性心肌梗死3年,高血压病史4年,体检:BP 150/95 mmHg,心率90/分,降压治疗宜首选

- A.α受体阻滞剂
- B.β受体阻滞剂
- C.利尿剂
- D.二氢吡啶类钙离子通道阻滞剂

E.非二氢吡啶类钙离子通道阻滞剂
96.初产妇,妊娠 39 周,产力正常,胎心 140 次/分,头位,双顶径 10 cm,先露浮,宫口 2 cm,对角径 11 cm,正确的处理是

- A.继续观察产程进展
- B.葡萄糖静滴
- C.剖宫产
- D.哌替啶肌注
- E.稀释缩宫素静滴

97.汽车正在行驶中,一名儿童突然冲向马路对面,司机急刹车,汽车在发出刺耳的刹车声后停住,儿童在车前的半米处跑过。这时司机顿感心跳加快,头上冒汗,手足无力,这种情绪状态是

- A.心境
- B.激情
- C.情感
- D.情操
- E.应激

98.女,33 岁,问她几岁,答“三十三,三月初三,三月桃花开,开花结果给猴吃”,该患者临床症状属于

- A.思维散漫
- B.妄想观念
- C.思维插入
- D.思维奔逸
- E.强迫观念

99.初产妇,27 岁,孕 39 周。临产后宫缩强,宫口开大 8 cm 时自然破膜,破膜后突然生呛咳,呼吸困难、发绀,血压下降,最可能发生的情况是

- A.子宫破裂
- B.前置胎盘
- C.胎盘早剥
- D.羊水栓塞
- E.胎膜早破

100.女,3 岁。右手中指疼痛 1 个月。

查体:中指屈曲,不能伸直,掌指关节掌侧处可触及 0.3 cm×0.3 cm 大小硬结,压痛,可随屈肌腱上下活动。首选的治疗方法是

- A.局部封闭治疗
- B.手术治疗
- C.口服非甾体抗炎药
- D.局部制动
- E.物理治疗

101.男,23 岁。发作性胸闷 5 年、再发 3 天。发作多以凌晨为著,无咯血和发热,发作时不经药物治疗可逐渐缓解。查体:双肺呼吸音清晰。该患者最可能的诊断是

- A.胃食管反流病
- B.支气管哮喘
- C.左心衰竭
- D.过敏性肺炎
- E.慢性支气管炎

102.女,36 岁。发现高血压 7 个月,未服药,改善生活行为后血压为 140~150/90~95 mmHg,心率 56 次/分。该患者治疗首选的药物是

- A.利血平
- B.维拉帕米
- C.哌唑嗪
- D.比索洛尔
- E.培哚普利

103.女孩,2 岁。不会走路和说话。查体:身高 65 cm,眼裂小,眼距宽,鼻梁低,全身皮肤细嫩,胸骨左缘 3~4 肋间可闻 3/6 级收缩期杂音。为明确诊断,首选的检查是

- A.心电图
- B.尿液有机酸分析
- C.血清 T₃、T₄、TSH 测定
- D.胸部 X 线片
- E.染色体核型分析

104.女孩,1 岁。诊断为蛋白质-能量营养不良。患儿突然发生面色灰白,神志不

清,脉搏减慢,呼吸暂停。应首先考虑

- A. 低钠血症
- B. 自发性低血糖
- C. 继发感染
- D. 心力衰竭
- E. 低钙血症

105. 女, 32 岁。低热伴下腹痛个月, 大便 3 次/日, 黄稀便, 无脓血, 腹部 B 超示右下腹肠壁增厚, 对诊断最有意义的检查是

- A. 结肠 X 线钡餐检查
- B. 腹部 X 线平片
- C. 腹部 CT
- D. 腹腔镜
- E. 结肠镜

106. 男, 50 岁。上腹胀痛 10 年, 多于饭后约 30 分钟加重。半年来上腹痛加重, 伴反酸, 间断呕吐胃内容物。吸烟 15 年饮白酒 10 年, 每日约半斤。患者的病变最可能位于

- A. 胃体
- B. 胃底
- C. 胃窦
- D. 十二指肠球部
- E. 贲门

107. 男, 45 岁。农民。发热 5 天, 呕吐、腹泻伴少尿 1 天。查体: 神志清楚, 结膜充血。双腋下可见“搔抓样”出血点。实验室检查: WBC $25 \times 10^9/L$, Plt $30 \times 10^9/L$, ALT 80 U/L, TBil $45 \mu\text{mol/L}$, 尿蛋白(+++)。最可能的诊断是

- A. 急性细菌性痢疾
- B. 肾综合征出血热
- C. 钩端螺旋体病
- D. 急性黄疸型肝炎

E. 疟疾

108. 患者, 男性, 28 岁。干咳、低热、盗汗半月, 今日突然咯血两口而就诊。左上肺可闻及湿啰音。首先考虑的诊断是

- A. 肺炎球菌性肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 肺脓肿
- D. 肺结核
- E. 肺癌

109. 男, 63 岁。大量饮酒 30 年, 临床诊断肝硬化失代偿期。对评估病情最重要的临床表现是

- A. 腹水
- B. 贫血
- C. 上消化道出血
- D. 脾进行性增大
- E. 出现蜘蛛痣和肝掌

110. 女性, 66 岁, 间断上腹痛 10 余年, 2 个月来加重伴饱胀, 体重下降 7 kg, Hb 90 g/L, 最可能的诊断是

- A. 功能性消化不良
- B. 胃癌
- C. 消化性溃疡
- D. 慢性肝炎
- E. 慢性胰腺炎

111. 女, 24 岁, 平素月经规则, 停经 48 天, 阴道少量流血 5 天, 偶有腹痛, 检查宫颈口关闭, 子宫大小与孕周相符, 患者可能的诊断是

- A. 难免流产
- B. 不全流产
- C. 先兆流产
- D. 完全流产
- E. 习惯性流产

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(112~113 题共用备选答案)

- A. 哌喹
- B. 氯喹
- C. 奎宁
- D. 乙胺嘧啶
- E. 伯胺喹

112. 防止疟疾复发选用的药物是

113. 控制普通型疟疾发作多选用的药物是

(114~115 题共用备选答案)

- A. 阿司匹林
- B. 呋塞米
- C. 尿激酶
- D. 氯吡格雷
- E. 低分子肝素

114. 急性右心室 ST 段抬高心肌梗死慎用的药物是

115. 急性右心室非 ST 段抬高心肌梗死不宜选用的药物是

(116~117 题共用备选答案)

- A. 肾前性急性肾损伤
- B. 急性肾小管坏死
- C. 急性间质性肾炎
- D. 急进性肾小球肾炎
- E. 肾后性急性肾损伤

116. 因“急性肠炎”静脉输注庆大霉素 1 周后出现少尿,尿钠 >40 mmol/L,少尿最可能的原因是

117. 肝硬化伴大量腹水,进行性尿量减少 1 周,尿比重 1.030,尿红细胞(-),蛋白(-)。少尿最可能原因是

(118~119 题共用备选答案)

- A. 全心衰竭
- B. 急性右心衰竭
- C. 急性左心衰竭
- D. 慢性右心衰竭
- E. 慢性左心衰竭

118. 呼吸困难,咳粉红色泡沫样痰,双肺满布干湿性啰音,双下肢无水肿,诊断宜首先考虑为

119. 夜间阵发性呼吸困难,高枕卧位,颈静脉怒张,双肺底可闻及干湿啰音。肝大,下肢水肿,诊断考虑是

(120~121 题共用备选答案)

- A. 腺病毒
- B. 轮状病毒
- C. 埃可病毒
- D. 新型肠道病毒 71 型
- E. 脊髓灰质炎病毒

120. 可导致流行性角结膜炎的病原体是

121. 目前最常见的导致手足口的病原体是

(122~124 题共用备选答案)

- A. 50~60 mL/kg
- B. 60~90 mL/kg
- C. 90~120 mL/kg
- D. 120~150 mL/kg
- E. 150~180 mL/kg

122. 小儿腹泻,中度脱水,第 1 天静脉补液量是

123. 小儿腹泻,重度脱水,第 1 天静脉补液量是

124. 重度窒息新生儿推迟喂养, 第 1 天静脉补液的量是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 醉汉步态
- B. 跨阈步态
- C. 慌张步态
- D. 剪刀样步态
- E. 共济失调步态

125. 小脑病变出现的步态是

126. 帕金森病的典型步态是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 膜性肾病
- B. 新月体性肾小球肾炎
- C. 微小病变肾病
- D. IgA 肾病

A3/A4 型题

E. 毛细血管内增生性肾小球肾炎

127. 儿童原发性肾病综合征最常见的类型为

128. 链球菌感染后急性肾小球肾炎的病理类型为

(129~130 题共用备选答案)

- A. 骨囊肿
- B. 骨肉瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 骨纤维异常增殖症

129. X 线片显示日光放射状骨膜反应的疾病是

130. X 线片显示干骺端圆形边界清楚的透亮区, 骨皮质变薄, 无骨膜反应的疾病是

答题说明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息, 在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(131~133 题共用题干)

男, 68 岁。阵发性腹痛 1 年, 自觉有“气块”在腹中窜动。起初大便次数增加, 近 3 个月腹胀、便秘, 近 3 天无肛门排气、排便, 呕吐物有粪便臭味, 一直感乏力和低热。

131. 根据病史考虑肠梗阻为

- A. 高位不完全梗阻
- B. 血运性肠梗阻
- C. 高位完全梗阻
- D. 低位完全梗阻
- E. 低位不完全梗阻

132. 该患者引起梗阻的病因最可能的是

- A. 粪块
- B. 肠系膜血栓
- C. 肿瘤
- D. 炎性狭窄

E. 粘连带

133. 禁忌使用的检查是

- A. 腹部 B 超
- B. 腹部 CT
- C. 腹部 X 线平片
- D. 结肠镜
- E. 全消化道钡餐造影

(134~135 题共用题干)

女, 17 岁。间断关节痛 1 个月, 伴面部红斑, 脱发和口腔溃疡。既往有日晒后皮肤瘙痒 1 年余。实验室检查: 血 Hb 101 g/L, WBC $3.51 \times 10^9/L$, Plt $163 \times 10^9/L$, 尿常规 (-), ESR 42 mm/h; ANA (+), 抗 SSA 抗体 (+), 血清 C3 降低。

134. 最可能的诊断是

- A. 系统性红斑狼疮

- B. 类风湿关节炎
- C. 白塞病
- D. 皮炎
- E. 干燥综合征

135. 该患者的基础治疗药物是

- A. 硫酸羟氯喹
- B. 环磷酰胺
- C. 甲氨蝶呤
- D. 头孢曲松
- E. 扑尔敏

(136~138 题共用题干)

25 岁女性, 春季, 主诉寒战、高热, 剧烈头痛 1 天, 呕吐 3 次, 查体: 神志清楚, 体温 39.8 °C, 颈强直(±), 皮肤有瘀点, 咽部略充血, 心肺腹无异常, 克氏征(-), 血白细胞 $20 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 85%, 腰穿: 脑脊液米汤样, 细胞数 $3\ 000 \times 10^6/L$, 中性 80%, 糖 1.12 mmol/L。

136. 最可能的诊断是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 脑型疟疾
- E. 流行性脑脊髓膜炎

137. 可能出现的并发症有

- A. 化脓性关节炎
- B. 中耳炎
- C. 肺炎
- D. 心内膜炎
- E. 以上均是

138. 最有效的治疗措施是

- A. 头孢霉素
- B. 青霉素 G
- C. 环丙沙星
- D. 氯霉素
- E. 庆大霉素

(139~140 题共用题干)

男, 72 岁。咳嗽、痰中带血丝半年余, 吸烟 50 余年。胸部 X 线片示左上肺近肺门处肿块影。

139. 为明确病理诊断, 首选的检查是

- A. 开胸活检
- B. 胸腔镜活检
- C. 纵隔镜活检
- D. 经胸壁肺穿刺活检
- E. 支气管镜活检

140. 如拟手术治疗, 下列不属于手术禁忌证的是

- A. 对侧肺门淋巴结转移
- B. 肝转移
- C. 锁骨上淋巴结转移
- D. 同侧肺门淋巴结转移
- E. 脑转移

(141~142 题共用题干)

女, 28 岁。G₂P₁。既往月经规律, 月经量少, 身体健康, 要求长期采取避孕措施。

141. 首选的避孕方法是

- A. 紧急避孕药
- B. 宫内节育器
- C. 安全期避孕
- D. 长效口服避孕药
- E. 外用杀精子剂

142. 其避孕原理是

- A. 抑制卵巢排卵
- B. 干扰受精卵着床
- C. 影响精子获能
- D. 阻止精子和卵子相遇
- E. 改变宫颈黏液性状

(143~145 题共用题干)

女, 28 岁。已婚, 因消瘦、乏力、多食, 心悸 3 个月就诊, 近 2 年来应用口服避孕药。

143. 下述体征最有诊断意义的是

- A. 双眼裂增宽
- B. 心动过速

C. 甲状腺Ⅱ度肿大, 双上极可闻及血管杂音

D. 皮肤潮湿

E. 双手震颤

144. 下列检查对患者诊断最有意义的是

A. 甲状腺吸碘率测定

B. TT_3 、 TT_4 、TSH 测定

C. FT_3 、 FT_4 、TSH 测定

D. TGAb、TPOAb 测定

E. 受体抗体测定

145. 当临床及实验室检查确诊为 Graves 病后, 本例病人应选择的治疗是

A. 碳酸钾治疗

B. 甲硫咪唑治疗

C. 丙基硫氧嘧啶治疗

D. 过氯酸钾治疗

E. 丙基硫氧嘧啶治疗+普萘洛尔治疗

(146~147 题共用题干)

女孩, 3 岁。生长落后, 活动后气促, 查体: 胸骨左缘第 2~3 肋间有 3/6 级收缩期喷射性杂音, P_2 亢进。X 线片示右心房、右心室扩大。

146. 该患儿最可能的诊断是

A. 室间隔缺损

B. 动脉导管未闭

C. 房间隔缺损

D. 法洛四联症

E. 肺动脉狭窄

147. 目前最佳的治疗方案是

A. 口服卡托普利

B. 随访观察

C. 手术修补

D. 防治感染

E. 口服呋喃美辛

(148~150 题共用题干)

女, 45 岁。脸圆、变红 1 年, 体重增加、月经稀发 6 个月。查体: BP 160/100 mmHg, 向心性肥胖, 皮肤薄, 面部痤疮较多, 下颌小胡须, 全身毳毛增多。腹部、大腿根部可见宽大紫纹。血钾 3.0 mmol/L, 空腹血糖 15.4 mmol/L。

148. 该患者最可能的诊断是

A. 原发性醛固酮增多症

B. 糖尿病

C. 原发性高血压

D. 女性男性化

E. 库欣综合征

149. 定性诊断最主要的检查是

A. 血 ACTH 测定

B. 小剂量地塞米松试验

C. 大剂量地塞米松试验

D. 血醛固酮测定

E. 血皮质醇测定

150. 有助于了解其病因或病变部位的检查是

A. 小剂量地塞米松试验

B. 大剂量地塞米松试验

C. 血皮质醇测定

D. OGTT

E. 血醛固酮测定

本单元试卷到此结束

参考答案

第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	A	A	D	E	A	E	C	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	D	B	D	C	E	C	B	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	C	E	B	E	C	B	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	D	B	A	E	C	E	C	C	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	B	E	A	C	E	C	D	C	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	A	E	D	E	C	D	C	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	E	C	E	C	C	E	D	E	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	C	B	C	C	E	A	B	C	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	C	A	E	C	E	E	A	A	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	B	B	C	B	C	E	D	D	D
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	E	E	B	E	C	B	D	A	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	E	B	B	C	B	A	C	A	A

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	D	E	A	A	C	C	E	B	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	C	E	A	B	E	E	B	C	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	B	C	C	E	C	C	E	B	B

1.【解析】本题考核脂肪大量动员乙酰 CoA 的去路。正常情况下,血中酮体含量很少,在饥饿、高脂低糖膳食及糖尿病时,葡萄糖利用减少,脂肪动员加强,脂肪酸分解增多,乙酰-CoA 大量生成,继而生成酮体氧化功能。故本题正确答案为 D。

3.【解析】肩关节脱位最常见,约占全身关节脱位的 50%,这与肩关节的解剖和生理特点有关,如肱骨头大,关节盂浅而小,关节囊松弛,其前下方组织薄弱,关节活动范围大,遭受外力的机会多等。它可分为前脱位与后脱位两种,常见的是前脱位。

6.【解析】本题考核胆固醇在体内转化和去路。有三条途径:①转化为胆汁酸盐(最主要的去路);②转化为类固醇激素,即在肾上腺皮质转化为皮质醇、醛固酮、雄激素;在睾丸间质细胞转化为睾酮;在卵巢及黄体转化为雌激素;③转化为 7-脱氢胆固醇,后者在紫外线的照射下转化为 VitD₃,调节钙磷代谢。胆色素为衰老红细胞的代谢产物。故本题正确答案为 E。

7.【解析】本题考核肾小管的转运功能。近端小管是大部分物质的主要重吸收部位,滤过液中的约 67%Na⁺、Cl⁻、K⁺和水被重吸收,还有 85%的 HCO₃⁻以及全部的葡萄糖、氨基酸都在此被重吸收。故本题正确答案为 A。

8.【解析】本题考核腱器官的作用。当肌肉受到牵拉时,首先兴奋肌梭而发动牵张反射,导致受牵拉的肌肉收缩;当牵拉进一步加大时,兴奋腱器官,使牵张反射受到抑制,这样可避免牵拉的肌肉受到损伤。故本题正确答案为 E。

9.【解析】本题考核内脏痛的特点。特点:①最主要特点为定位不准确;②发生缓慢、持续时间长;③对牵拉刺激、扩张刺激敏感,对切割、烧灼刺激不敏感;④特别能引起不愉快的情绪活动。故本题正确答案为 C。

11.【解析】本题考核抑制性突触后电位的特点。抑制性突触后电位是由神经递质作用于突触后膜引起的突触后膜发生超级化。故本题正确答案为 C。

12.【解析】COPD 和支气管哮喘都有气流受限,但前者的气流受限不可逆,后者的气流受限可逆,因此这是两者鉴别的关键。临床上常用支气管舒张试验(BDT)来测定气流受限的可逆性(E)。具体为吸入支气管舒张剂后,FEV₁较用药前多 12%,其绝对值增加>200 mL,为支气管舒张试验阳性,此为支气管哮喘的特点。其余试验均非用于二者的鉴别。

25.【解析】Ⅱ型呼吸衰竭氧疗时须注意保持低浓度吸氧,防止血氧含量过高,故本题选 B。

41.【解析】胃肠道手术病人,术前 1~2 天(结肠、直肠手术前 3 天)开始进流食。其他手术,饮食可不受限制,但都应在术前 12 小时禁食、术前 4 小时禁水,以防因麻醉或手术中

的呕吐而引起窒息或吸入性肺炎。必要时可置胃管行胃肠减压。一般手术前 1 天做肥皂水灌肠;结肠或直肠手术应行清洁灌肠,并于手术前 3 天起口服肠道制菌药物。当肠道不需彻底清洗时,手术前夜口服泻药,可使直肠排空。故本题选 D。

43.【解析】肺性脑病患者治疗中,禁用镇静剂,镇静剂抑制呼吸中枢,会加重肺性脑病,故本题选 E。

47.【解析】①心肌严重损害时出现奔马律,常见于心力衰竭、急性心梗、重症心肌炎等,具有诊断意义。重症左心衰时可于心尖部闻及舒张早期奔马律,重症右心衰时于三尖瓣听诊区(胸骨左缘 4~5 肋间)闻及舒张早期奔马律。答案为 C。②右心衰时,可因右心室显著扩大而出现三尖瓣关闭不全的反流性杂音,于三尖瓣区(胸骨左缘 4~5 肋间)可闻及高调吹风样全收缩期杂音,答案 D 不正确。③心率明显增快无特异性,可见于绝大多数心脏病。心律显著不齐见于房颤。肺动脉瓣区第二心音明显亢进见于肺动脉高压。

51.【解析】①I 型呼吸衰竭是指缺氧性呼吸衰竭,血气分析特点是 $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$, PaCO_2 降低或正常,主要见于肺换气障碍(通气/血流比例失调、弥散功能损害和肺动-静脉分流)疾病,如严重肺部感染性疾病、间质性肺疾病、急性肺栓塞等;②慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病、肺源性心脏病、上呼吸道阻塞可导致 II 型呼吸衰竭。故本题选 A。

52.【解析】清创缝合,开放性骨折内固定术,断指再植的时间均为:6~8 小时。

54.【解析】室性心动过速心电图:(1)3 个或以上的室早连续出现。

(2)QRS 波群形态畸形,时限超过 0.12 秒;ST-T 波方向与 QRS 波主波方向相反。

(3)心室率通常为 100~250 次/分;心律规则,但亦可略不规则。

(4)心房独立活动与 QRS 波群无固定关系,形成房室分离。

(5)通常发作突然开始。

(6)心室夺获与室性融合波(特征性)。

55.【解析】①亚急性感染性心内膜炎的抗生素应用原则是:早期应用,在连续送 3~5 次血培养后,即开始治疗;静脉用药,以保持高而稳定的血药浓度(C 错 E 对)。②亚急性感染性心内膜炎最常见的症状是发热,故不能根据体温变化给药,故 A 错。③需足量、大剂量、长疗程、联合用药,旨在完全消灭赘生物内的致病菌,故 B 错。④亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是草绿色链球菌,故在药敏结果回报前应经验性用药,首选青霉素,或加用庆大霉素(D 错)。

77.【解析】①根据题意:66 岁男性患者劳累时胸痛,硝酸甘油可缓解,应诊断为稳定型心绞痛。长期口服他汀类药物,能有效降低血清胆固醇、低密度脂蛋白,延缓粥样斑块进展,预防心肌梗死,改善预后。②CD 为血管重建治疗,主要用于冠脉严重狭窄或可能堵塞的患者,可改善症状,但不能改善预后。BE 不属于稳定型心绞痛的常规治疗。

87.【解析】①依据患者临床特点:心界向两侧扩大,心音低钝,心电图肢体导联 QRS 波群低电压,可诊断为急性心包炎(E)。②缩窄性心包炎多由急性心包炎病史常在 1 年以上逐渐演变而来,心界一般不大,可有心包叩击音。肥厚型心肌病常有胸骨左缘第 3~4 肋间收缩期喷射性杂音。急性心肌梗死常表现为突发胸痛,压榨性,向左上肢放射,心界不大,心电图示病理性 Q 波。风心病常有风湿热如发热以及心脏瓣膜受损的表现。

88.【解析】①“胸片示右下肺大片状密度增高影,上缘呈外高内低弧形”,为胸腔积液的典型征象。患者右下肺呼吸音消失,语音共振减弱,应诊断为右侧胸腔积液。患者为中年

男性,长时间发热,用头孢菌素治疗无效,应首先考虑结核性胸水。为明确诊断,其首选检查为胸腔穿刺抽液行胸液常规+结核杆菌检查(A);②超声心动图为确诊胸腔积液的首选检查方法;胸腔穿刺抽液为确诊胸腔积液后明确病因的首选检查方法。本例已拍摄胸片确诊了胸腔积液,为明确胸腔积液的病因,首选胸穿抽液检查,故本题选 A。

91.【解析】①青霉素过敏属 I 型超敏反应,发展迅速,重者可导致过敏性休克。病人在使用青霉素后出现呼吸困难,血压下降,双肺喘鸣音,多处皮疹,应为过敏性休克(C)。②急性左心衰竭和哮喘急性发作均可出现肺水肿,但不会出现过敏性皮疹,故 AB 不正确。急性呼吸窘迫综合症时肺部多为湿啰音而不是喘鸣音,也不会出现皮疹,故 D 错。感染性休克与题干不符,故 E 错。

93.【解析】①患者存在反复咳嗽、喘息,使用支气管舒张剂后可缓解;肺功能检查示 $FEV_1/FVC < 0.70$,提示存在气流受限;支气管舒张试验示 FEV_1 改善率为 12%,提示气流受限是可逆的,故应诊断为支气管哮喘而不是慢阻肺,因为慢阻肺气流受限是不可逆的(选 B)。其余选项的表现均余本例不符。

94.【解析】①吸烟患者,长期低热、咳嗽,伴痰中带血,考虑肺结核,胸片示右上肺云雾状阴影,考虑浸润型肺结核。故本题选 C;②原发型肺结核胸部 X 线片呈现哑铃形阴影,即原发病灶、引流淋巴管炎和肿大的肺门淋巴结,形成典型的原发综合征;③浸润型肺结核多发生在肺尖和锁骨下,胸片示小片状或斑点状阴影;④支气管肺癌多有长期吸烟史,表现为刺激性咳嗽,痰中带血、胸痛和消瘦等症状,胸部 X 线表现肺癌肿块常呈分叶状,有毛刺、切迹,形成偏心厚壁空洞;⑤慢性纤维空洞型肺结核胸片呈纤维厚壁空洞、肺门抬高和肺纹理呈垂柳样,纵膈向患侧移位。

95.【解析】 β 受体阻滞剂是能选择性地与 β 肾上腺素受体结合、从而拮抗神经递质和儿茶酚胺对 β 受体的激动作用的一种药物类型。 β 受体阻滞剂主要作用机制是通过抑制肾上腺素能受体,减慢心率,减弱心肌收缩力,降低血压,减少心肌耗氧量,防止儿茶酚胺对心脏的损害,改善左室和血管的重构及功能。

101.【解析】青年男性,发作性胸闷,以凌晨为著,可自行缓解,查体双肺呼吸音清,应考虑为哮喘,选 B。胃食管反流病表现为反流和烧心。左心衰竭常表现为咳嗽,咳粉红色泡沫痰,双肺底湿啰音。过敏性肺炎的病理特征是弥漫性间质病变,常表现为接触抗原数小时后出现发热、呼吸困难、干咳、胸痛、紫绀等。慢性支气管炎常表现为中老年爱抽烟的男性,长期咳嗽咳痰。

108.【解析】患者女性,干咳、低热、盗汗、咯血考虑肺结核的可能性大,故本题选 D。

(139~140 题)【解析】①患者老年男性,有长期吸烟史,长期咳嗽,痰中带血丝,应首先考虑肺癌。胸片示左上肺门处肿块影,考虑为中央型肺癌。为明确诊断,首选支气管镜活组织病理学检查(E)。开胸活检损伤大,不宜作为首选;胸腔镜活检、经胸壁肺穿刺活检常用于靠近胸壁周围型肺癌的诊断;纵膈镜活检多用于纵膈病变的诊断。②肺癌已发生肺外转移者,都不是手术适应证,故可首先排除答案 BCE。

210-2

试卷标码:1601

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

2020 年临床执业助理医师资格考试 模拟试卷

(医学综合笔试部分)

报考类别：临床执业助理医师

第二单元

考试日期：2020 年 8 月 21 日

考试时间：13：30—15：30

考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____

第二单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- | | |
|---|--|
| <p>1.引起子宫脱垂的最常见原因是</p> <p>A.分娩损伤</p> <p>B.长期重体力劳动</p> <p>C.肥胖体质</p> <p>D.慢性咳嗽</p> <p>E.习惯性便秘</p> <p>2.上消化道出血最常见的原因是</p> <p>A.胃癌</p> <p>B.消化性溃疡</p> <p>C.反流性食管炎</p> <p>D.急性糜烂出血性胃炎</p> <p>E.肝硬化食管胃底静脉曲张</p> <p>3.消化性溃疡并发急性穿孔时,不可能出现</p> <p>A.板状腹</p> <p>B.全腹压痛、反跳痛</p> <p>C.肝浊音界缩小</p> <p>D.肠鸣音亢进</p> <p>E.膈下游离气体</p> <p>4.结核性腹膜炎不可能出现的体征是</p> <p>A.腹部压痛</p> <p>B.腹部触诊呈揉面感</p> <p>C.移动性浊音阴性</p> <p>D.振水音阳性</p> <p>E.腹部包块</p> | <p>5.不符合急性胰腺炎腹痛特点的是</p> <p>A.腹痛多位于上腹中部</p> <p>B.可向腰背呈带状放射</p> <p>C.常在饱食、脂餐或大量饮酒后发生</p> <p>D.腹痛剧烈,不能为一般解痉剂缓解</p> <p>E.呕吐后腹痛可减轻</p> <p>6.对肝性脑病患者的饮食治疗不恰当的是</p> <p>A.高热量</p> <p>B.高碳水化合物</p> <p>C.高维生素</p> <p>D.高蛋白质</p> <p>E.不能进食者可鼻饲或静脉滴注葡萄糖</p> <p>7.不属于缓解哮喘急性发作药物的是</p> <p>A.静脉用糖皮质激素</p> <p>B.抗胆碱能药物</p> <p>C.短效茶碱</p> <p>D.速效 β_2 受体激动剂</p> <p>E.白三烯调节剂</p> <p>8.消化性溃疡最常见的并发症为</p> <p>A.穿孔</p> <p>B.癌变</p> <p>C.出血</p> <p>D.幽门梗阻</p> |
|---|--|

- E. 贲门梗阻
9. 关于早期流产表现的描述, 正确的是
- A. 稽留流产子宫大小与停经周数相符
- B. 完全流产宫口关闭, 子宫接近正常大小
- C. 早期流产先有腹痛后有阴道出血
- D. 难免流产的宫颈口尚未扩张
- E. 不全流产子宫大小与停经周数相符
10. 以下关于全身性外科感染治疗的描述, 正确的是
- A. 均需应用抗真菌药物
- B. 尽早处理感染原发灶
- C. 等待培养结果再选用抗生素
- D. 尽量选用窄谱抗生素
- E. 首要的措施是加强抗生素的应用
11. 溃疡性结肠炎的病变最常见于
- A. 回肠末端及升结肠
- B. 全结肠
- C. 升结肠
- D. 降结肠
- E. 直肠及乙状结肠
12. 预防乙型肝炎最有效的措施是
- A. 严格管理血制品
- B. 应用一次性医疗器械
- C. 饮食饮水卫生
- D. 接种疫苗
- E. 注射丙种球蛋白
13. 腹股沟斜疝与直疝最有意义的鉴别点是
- A. 发病年龄
- B. 突出途径
- C. 疝块外形
- D. 疝内容物是否进入阴囊
- E. 还纳疝内容物后, 压迫深环, 疝内容物是否再突出
14. 产褥期的临床表现与处理错误的是
- A. 产后 10 小时, 体温 37.9 °C —— 观察
- B. 产后 4 小时尿潴留 —— 诱导排尿
- C. 产后 3 天会阴伤口化脓 —— 拆线扩创
- D. 产后 7 天, 下腹痛 —— 镇痛药止痛
- E. 产后 1 天, 会阴水肿 —— 红外线照射
15. 结石梗阻胆管并继发感染时, 其典型的临床表现为 Charcot 三联征, 即腹痛
- A. 胆囊肿大和休克
- B. 腹部肿块和黄疸
- C. 肝区叩痛和休克
- D. 精神症状和黄疸
- E. 寒战高热和黄疸
16. 关于早期胃癌的描述正确的是
- A. 病灶局限于胃肌肉层
- B. 病灶局限于黏膜或黏膜下层
- C. 无淋巴结转移
- D. 病灶直径小于 1 cm
- E. 病灶局限于胃小弯
17. III 度胎盘早剥的并发症不包括
- A. 子宫胎盘卒中
- B. 凝血功能障碍
- C. 子宫破裂
- D. 产后出血
- E. 急性肾功能衰竭
18. 下列不属于绞窄性肠梗阻的临床表现的是
- A. 持续性腹痛, 逐渐加重
- B. 阵发性腹痛, 腹胀对称
- C. 病情发展迅速, 早期出现休克
- D. 腹胀不对称
- E. 腹膜刺激症状
19. 右心衰竭体循环淤血的表现是
- A. 端坐呼吸

- B.心源性哮喘
C.劳力性呼吸困难
D.阵发性夜间呼吸困难
E.肝颈静脉反流征阳性
- 20.引起继发性腹膜炎的病因不包括
A.急性阑尾炎
B.溃疡穿孔
C.胆囊穿孔
D.肝硬化腹水感染
E.手术污染
- 21.一婴儿诊断为散发性甲状腺功能减退症,不正确的治疗方法是
A.应终身服用甲状腺制剂
B.明确诊断后立即治疗
C.供给各种维生素及矿物质
D.需加用碘剂治疗
E.需供给充足的蛋白质
- 22.子痫发作时孕妇直接死因是
A.心脏病
B.脑出血
C.Ⅲ度胎盘早剥
D.急性重型肝炎
E.急性肾功能衰竭
- 23.诊断胆道蛔虫症的主要依据是
A.典型症状和特征
B.静脉胆道造影
C.X线钡餐造影
D.内镜逆行胆管检查
E.大便找虫卵
- 24.先兆临产比较可靠的征象是
A.见红
B.胎动活跃
C.胎儿下降感
D.尿中hCG明显增多
E.在夜间出现下腹部不适的宫缩,清晨消失
- 25.微小肝癌是指肿块直径小于等于
A.1 cm
B.2 cm
C.3 cm
D.4 cm
E.5 cm
- 26.肝右叶巨大肿瘤压迫下腔静脉时,考虑的治疗方法不包括
A.肝动脉结扎术
B.肝动脉塞术
C.肝动脉灌注化疗
D.肝移植手术
E.肝叶切除术
- 27.患儿经补液纠正脱水酸中毒后发生惊厥,可能的原因是
A.低钠血症
B.低钾血症
C.低钙血症
D.低血糖
E.碱中毒
- 28.急性面神经炎的临床表现为
A.偏侧面部全部表情肌瘫痪
B.偏侧面部疼痛
C.偏侧面下部表情肌瘫痪
D.偏侧面部全部表情肌抽搐
E.偏侧面上部表情肌瘫痪
- 29.胰头癌晚期出现持续性剧烈腹痛,向腰背部放射,是因为
A.胰管梗阻致管腔内压增高
B.肿瘤压迫胆管梗阻所致
C.肿瘤累及周围其他脏器
D.肿瘤增大膨胀胰腺被膜
E.肿瘤侵及腹腔神经丛
- 30.颅内压增高时不正确的处理是

- A.应用脱水剂
 B.液体摄入量限制在每日 1 500 ~ 2 000 mL
 C.密切观察生命体征
 D.轻泻剂疏通大便
 E.高位灌肠
- 31.21-三体综合征最常见的染色体核型异常是
 A.47,XXY
 B.47,XX(或XY),+21
 C.G/D 易位
 D.G/G 易位
 E.嵌合体
- 32.水痘发热后开始出皮疹的天数是
 A.1 天
 B.2 天
 C.3 天
 D.4 天
 E.5 天
- 33.细菌性阴道病首选的治疗药物是
 A.抗厌氧菌药物
 B.抗病毒药物
 C.抗革兰阴性菌药物
 D.抗革兰阳性菌药物
 E.抗真菌药物
- 34.新生儿散发性甲状腺功能减退症最早出现的症状是
 A.腹泻
 B.贫血
 C.生理性黄疸消退延迟
 D.心率正常
 E.体温低
- 35.在正常月经周期中,子宫内膜出现高度分泌活动,腺上皮细胞增大,细胞内有分泌颗粒,间质疏松水肿,以上组织学变化属

- 于子宫内膜
 A.增生早期
 B.增生晚期
 C.分泌早期
 D.分泌晚期
 E.月经前期
- 36.以下哪项不属于新生儿生理性黄疸典型的临床表现
 A.生后第 3 天出现皮肤、巩膜黄染
 B.生后第 10 天黄疸基本消退
 C.精神状态和食欲良好
 D.ALT 30 U,AST 28 U
 E.血清胆红素 75 μmol/L,血清结合胆红素 67 μmol/L
- 37.以下不属于肠外营养治疗适应证的是
 A.短肠综合征
 B.空肠造瘘
 C.回肠造瘘
 D.乙状结肠造瘘
 E.克罗恩病
- 38.足月新生儿的原始反射不包括
 A.觅食反射
 B.腹壁反射
 C.握持反射
 D.拥抱反射
 E.吸吮反射
- 39.诊断结核性脑膜炎最可靠的依据是
 A.脑脊液中细胞数的增多,以淋巴细胞增多为主
 B.脑脊液中糖及氯化物下降
 C.脑脊液中蛋白质含量增加
 D.颅压高,脑脊液呈毛玻璃状
 E.脑脊液中找到抗酸杆菌
- 40.重度低渗脱水伴休克时,扩容治疗采

用的含钠液液体张力是

- A. 1/5 张
- B. 1/3 张
- C. 1/2 张
- D. 2/3 张
- E. 等张

41. 不符合小儿原发综合征常见表现的是

- A. 结核菌素试验强阳性
- B. X 线胸片示“双极影”
- C. X 线胸片上肺叶有空洞形成
- D. 低热、盗汗
- E. 食欲减退、消瘦

42. 成人胸腹前侧、会阴和两大腿前侧烧伤时, 烧伤面积估计是

- A. 25%
- B. 28%
- C. 30%
- D. 32%
- E. 34%

43. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是

- A. 发病年龄不同
- B. 致病细菌种类不同
- C. 预后不同
- D. 腹腔有无原发性病灶
- E. 治疗原则不同

44. 腹腔镜胆囊切除术手术前 12 小时开始禁食, 4 小时开始禁水, 主要理由是

- A. 利于手术操作
- B. 防止术中、术后呕吐
- C. 防止患者腹胀
- D. 减少胃肠道污染
- E. 减少术后排便

45. 引起维生素 D 缺乏性手足搐搦发作

的血清钙离子浓度的临界值是小于

- A. 0.75 mmol/L
- B. 1.0 mmol/L
- C. 1.25 mmol/L
- D. 1.5 mmol/L
- E. 1.75 mmol/L

46. 关于小儿神经反射的描述, 错误的是

- A. 握持反射在 3~4 个月时消失
- B. 拥抱反射在 3~6 个月时消失
- C. 新生儿提睾反射不易引出
- D. 腹壁反射在 1 岁后比较容易引出
- E. 2 岁以下小儿巴宾斯基征阳性属病理

现象

47. 颈淋巴结结核肿块特征不包括

- A. 无红热, 有波动感
- B. 融合成团, 不易推动
- C. 质硬, 无痛, 可推动
- D. 形成窦道或溃疡
- E. 破溃后流出稀薄粪臭味脓液

48. 腹部闭合性损伤中最易损伤的实质性器官是

- A. 肝脏
- B. 脾脏
- C. 胰腺
- D. 肾脏
- E. 肾上腺

49. 代谢性酸中毒时最突出的临床表

现是

- A. 呼吸浅而慢
- B. 呼吸深而快
- C. 神志欠清楚
- D. 腱反射亢进
- E. 心率加快

50. 破伤风病人典型的症状是在肌紧张性收缩的基础上, 发生阵发性肌肉强烈痉

挛,通常最先受影响的肌群是

- A. 面部表情肌
- B. 咀嚼肌
- C. 颈部肌群
- D. 背部肌群
- E. 四肢肌

51. 休克患者血压与中心静脉压均降低表明是

- A. 心功能不全
- B. 血容量相对过多
- C. 血容量严重不足
- D. 血容量轻度不足
- E. 微循环代偿期

52. 抢救经呼吸道吸入的危重急性中毒,首要采取的措施是

- A. 清除尚未吸收的毒物
- B. 排出已吸收的毒物
- C. 使用解毒剂
- D. 对症治疗
- E. 立即脱离现场及急救维持生命体征

53. 硝酸甘油抗心绞痛的作用机制是

- A. 抑制心肌收缩力
- B. 释放 NO
- C. 增加心肌供氧量
- D. 减慢房室传导
- E. 收缩外周血管

54. 确定肺结核是否为传染源的最主要依据是

- A. 血沉检查
- B. X 线检查
- C. 痰结核菌检查
- D. 结核菌素试验
- E. 血结核抗体检查

55. 鉴别上尿路结石与腹腔钙化灶常用的检查方法是

- A. CT
- B. 腹部侧位 X 线平片
- C. MRI
- D. B 超
- E. 静脉尿路造影

56. 提示结核性脑膜炎进入晚期的临床表现是

- A. 性格改变
- B. 肢体瘫痪或偏瘫
- C. 昏迷、频繁惊厥
- D. 脑膜刺激征
- E. 脑神经障碍

57. 行胃高选择性迷走神经切断术时,作为保留分支标志的是其

- A. 胃前支
- B. 胃后支
- C. 肝胆支
- D. 腹腔支
- E. “鸦爪”支

58. 急性乳房炎的重要病因是

- A. 乳汁淤积加细菌入侵
- B. 乳腺分泌障碍
- C. 哺乳次数增多
- D. 乳腺组织发育不良
- E. 全身和局部抵抗力下降

59. 持续性心房颤动是指心房颤动持续时间

- A. 大于 7 天
- B. 大于 1 个月
- C. 大于 24 小时
- D. 大于 48 小时
- E. 大于 3 个月

60. 胃食管反流病的主要发病机制不包括

- A. 胃排空异常

- B.下食管括约肌压力降低
C.异常的下食管括约肌一过性松弛
D.夜间胃酸分泌过多
E.食管酸清除能力下降
- 61.尿渗透压降低常见于
A.糖尿病
B.甲状腺功能亢进症
C.甲状旁腺功能亢进症
D.中枢性尿崩症
E.原发性醛固酮增多症
- 62.对诊断门静脉高压最有价值的依据是
A.腹水征阳性
B.食管胃底静脉曲张
C.脾大和脾功能亢进
D.肝功能异常
E.肝掌阳性
- 63.卵巢动静脉通过的韧带是
A.圆韧带
B.骨盆漏斗韧带
C.宫骶韧带
D.阔韧带
E.主韧带
- 64.急性肾小球肾炎的主要临床表现是
A.少尿,水肿,蛋白尿,低蛋白血症
B.血尿,蛋白尿,水肿,低蛋白血症
C.水肿,少尿,蛋白尿,高血压
D.血尿,少尿,水肿,蛋白尿
E.水肿,少尿,血尿,高血压
- 65.体内细胞色素 C 直接参与的反应是
A.糖酵解
B.叶酸还原
C.肽键合成
D.生物氧化
E.脂肪酸合成
- 66.佝偻病颅骨软化多发生于
A.1 个月
B.2 个月
C.3~6 个月
D.6~12 个月
E.12 个月以上
- 67.小儿前囟闭合的时间约在
A.3 个月
B.4 个月
C.6 个月
D.12 个月
E.1~1.5 岁
- 68.休克在微循环衰竭期最突出的情况是
A.代谢性碱中毒
B.毛细血管内“可进可出”
C.后括约肌收缩状态
D.前括约肌收缩状态
E.血管内高凝状态
- 69.关于糖皮质激素抗炎作用的正确叙述是
A.直接杀灭病原体
B.能提高机体的防御功能
C.促进创口愈合
D.抑制病原体生长
E.对抗各种原因,如物理、生物等引起的各种炎症
- 70.二尖瓣关闭不全的典型体征是
A.心尖部 Austin-Flint 杂音
B.心尖部粗糙的收缩期杂音
C.心尖部 S₁ 亢进
D.A₂ 增强
E.心界呈梨形

A2 型题**答题说明**

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

71.女,28岁,G₂P₁。停经2月余,阴道少量流血10天。妇科检查:宫体如4个月妊娠大小。B超显示宫腔内充满落雪状光点,未测到胎体和胎盘回声,双附件区探及直径5cm大小无回声包块。初步诊断是

- A. 双侧卵巢肿瘤
- B. 稽留流产
- C. 羊水过多
- D. 葡萄胎
- E. 绒癌

72.女,49岁。烧伤后3小时入院。大腿、小腿及足部布满大小不等的水疱,可见潮红创面,疼痛明显。该患者的烧伤面积是

- A. 45%
- B. 20%
- C. 40%
- D. 35%
- E. 32%

73.61岁女性,活动中突感眩晕,头痛,呕吐,步行不稳,20分钟后昏迷,呼吸节律不整,诊断为脑出血,其部位为

- A. 脑颞叶
- B. 脑桥
- C. 小脑
- D. 基底节
- E. 脑室

74.女,29岁。腰背痛2年。下腰段及骶髂关节压痛,腰椎活动明显受限,X线片

示双侧骶髂关节虫蚀样破坏,脊柱呈“竹节样”改变,最可能的诊断是

- A. 化脓性脊柱炎
- B. 强直性脊柱炎
- C. 腰椎结核
- D. 腰椎间盘突出症
- E. 腰椎肿瘤

75.女孩,3岁。发热、咳嗽和气促1周,查体:精神不振,面色苍白,呼吸急促,皮肤可见荨麻疹样皮疹,双肺可闻及细湿啰音。胸部X线片示双肺多发性小脓肿。最可能的诊断是

- A. 肺炎支原体肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 流感嗜血杆菌肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 腺病毒肺炎

76.女,62岁。突发上腹痛1天,发热6小时,呼吸困难1小时,查体:T 38.6℃,R 32次/分,BP 90/60 mmHg,P 110次/分,巩膜轻度黄染。上腹部压痛,轻度肌紧张,肠鸣音1次/分,血淀粉酶 860 U/L,血氧分压 50 mmHg。首先考虑的诊断是

- A. 肠系膜动脉栓塞
- B. 急性胆囊炎感染中毒性休克
- C. 肺炎
- D. 急性心肌梗死
- E. 急性胰腺炎合并呼吸窘迫综合征

77.51岁男性,车祸3小时入院。诊断:

骨盆骨折,左股骨干骨折及左胫骨开放性骨折,首先应密切观察的并发症是

- A.泌尿性感染
- B.休克
- C.创口感染
- D.疼痛
- E.坠积性肺炎

78.女,50岁。突发呼吸困难,胸痛,晕厥,查体:颈静脉充盈,肺动脉瓣区第二心音亢进,最可能的原因为

- A.右心衰竭
- B.左心衰竭
- C.呼吸衰竭
- D.冠心病
- E.肺动脉栓塞

79.男,59岁。右侧阴囊逐渐增大5年,无疼痛,查体见右侧阴囊肿大,大小约15 cm×10 cm,呈囊性,未触及睾丸,透光试验阳性。首先应该考虑的诊断是

- A.睾丸鞘膜积液
- B.精索静脉曲张
- C.腹股沟斜疝
- D.睾丸肿瘤
- E.睾丸炎

80.孕妇,28岁,主诉乏力,易倦,检查血红蛋白低于正常。则应该补充的物质是

- A.猪肝,肉类
- B.蔬菜,水果
- C.淀粉类主食
- D.豆浆,牛奶
- E.含钙多的物质

81.女,31岁。产后2个月出现怕脏,担心宝宝被细菌感染,因而反复洗手、反复清洗奶瓶。丈夫下班回来,要求其必须换洗所有衣物。有时出现把宝宝扔出窗外的冲动,

但从未真的实施。患者明知这些想法和行为不合理,也试图控制,但没有效果,内心非常痛苦。该患者最可能的诊断为

- A.抑郁症
- B.恐惧症
- C.疑病障碍
- D.精神分裂症
- E.强迫障碍

82.女,28岁。颈部肿块7天,可随吞咽上下活动,欲确诊病变的性质,应采取的诊断方法为

- A.细针穿刺细胞学检查
- B.甲状腺CT
- C.甲状腺B超
- D.甲状腺功能测定
- E.甲状腺核素测定

83.男,30岁。双手关节肿胀、疼痛2个月,发热伴胸痛1周,查体:见口腔溃疡。血常规:WBC $2.11 \times 10^9/L$,Hb 90 g/L,PLT $65 \times 10^9/L$;尿蛋白(++),RBC(++);胸片X线示双侧少量胸腔积液,最可能的诊断是

- A.再生障碍性贫血
- B.肾小球肾炎
- C.结核性胸膜炎
- D.类风湿关节炎
- E.系统性红斑狼疮

84.女性,60岁。上腹痛2小时,伴恶心、呕吐,为胃内容物2次,在下列疾病诊断中,可能性最小的是

- A.急性阑尾炎
- B.心肌梗死
- C.急性胰腺炎
- D.急性胃炎
- E.梅尼埃综合征

85.男,50岁。2天前餐后突然出现右上

腹阵发性绞痛,恶心。尿色呈浓茶样。以往有类似发作。查体:急性病容,巩膜黄染。腹部无肌紧张,右上腹深压痛,最可能的诊断是

- A.胆总管结石
- B.胆道蛔虫病
- C.胆总管囊肿
- D.急性胰腺炎
- E.急性胆囊炎

86.男,49岁。头部棍击伤,无昏迷史及意识障碍,无颅骨骨折,1个月后发现颅内高压症状,最可能的诊断是

- A.多发颅内血肿
- B.急性颅内血肿
- C.慢性硬膜外血肿
- D.慢性硬膜下血肿
- E.脑震荡后遗症

87.女,60岁。左乳房红肿、增大1个月,进展较快,无疼痛、发热。查体:左乳房红肿,局部温度略高,发硬,但未触及包块,左腋窝有肿大淋巴结,稍硬,活动度好,无压痛。血常规正常。最可能的诊断是

- A.急性乳腺炎
- B.炎性乳腺癌
- C.乳房结核
- D.导管内乳头状瘤
- E.乳腺增生症

88.女,40岁,发热。头痛,间断呕吐3周。既往有中耳炎病史,MRI见右颞叶内圆形病灶,边界清楚,中央为长 T_1 ,长 T_2 信号,可能的诊断是

- A.脑炎
- B.脑梗死
- C.脑膜瘤
- D.脑脓肿

E.脑转移瘤

89.女性,71岁。健康体检时B超发现胆囊内有约0.8cm直径结石,随体位活动,口服法胆囊造影,充盈缺损不明显,既往无胃病史,无胆囊炎发作史,无心脏病、糖尿病史,目前的治疗建议是

- A.溶石疗法
- B.观察,随诊
- C.中药排石
- D.选择性胆囊切除术
- E.选择性腹腔镜胆囊切除术

90.女,40岁。10年来常出现畏寒、少汗、乏力、纳差,月经不调、便秘,少语少动表情淡漠,近半年来出现面色苍白,眼睑颊部水肿,反应迟钝,有一过性幻视。患者最可能的诊断是

- A.肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
- B.肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
- C.精神分裂症
- D.甲状腺功能低下所致精神障碍
- E.甲状腺功能亢进所致精神障碍

91.女,58岁。反酸、胃灼热5年,胃镜检查:食管下段黏膜多发条形破损,相互融合。该患者首选的治疗药物是

- A.硫糖铝
- B.法莫替丁
- C.奥美拉唑
- D.枸橼酸铋钾
- E.碳酸铝镁

92.女,20岁。9个月前开始右上臂肿胀,疼痛,诊断为右肱骨上端肉瘤,优选的治疗方案是

- A.前化疗加根治性手术加术后放疗
- B.化学治疗
- C.化学治疗加放射治疗

D.左肩关节离断术

E.肿瘤刮除术

93.女,25岁。腹痛伴呕吐10小时,起初疼痛在脐周,继而右下腹疼痛逐渐加重。既往无腹痛与便血史。查体:全腹紧张,有明显压痛和反跳痛,麦氏点压痛明显,肠鸣音减弱,腹穿抽出脓性液体,最可能的诊断是

A.阑尾炎穿孔

B.克罗恩病穿孔

C.肠套叠坏死

D.肠伤寒穿孔

E.胃穿孔

94.女,32岁。间断上腹痛5年,空腹时出现。Hp(+),应选择的联合治疗方案的是

A.法莫替丁+抗生素

B.前列腺素+硫糖铝

C.奥美拉唑+阿托品

D.硫糖铝+阿托品+抗生素

E.奥美拉唑+CBS(胶态铋)+抗生素

95.男,40岁。因发热伴全身不适、头痛4天,少尿半天,于1月10日来诊,家中卫生条件差。有鼠。查体:T 39.5℃,P 120次/分,BP 80/50 mmHg,神志清晰,腋下皮肤散在出血点,面颈部充血,眼睑水肿,颈无抵抗,Kernig征(-),实验室检查:血WBC $21 \times 10^9/L$,N 0.7,异型淋巴细胞0.15,Hb 160 g/L,尿蛋白(+++),镜检有红细胞及管型,最可能的诊断是

A.肾综合征出血热

B.钩端螺旋体病

C.流行性感胃

D.败血症

E.流行性脑脊髓膜炎

96.女,35岁,G₅P₀。停经5个月,患风

湿性心脏病20年,心功能Ⅲ级,曾因风湿性心脏病行人工流产术3次。B超示中期妊娠,拟行剖宫取胎术。该患者最佳的避孕方法是

A.紧急避孕药

B.长效避孕针

C.宫内节育器

D.短效口服复方避孕药

E.输卵管绝育术

97.女,32岁。反复发作性干咳伴胸闷5年,多于春季发作,无发热、咯血及夜间阵发性呼吸困难,多次胸片检查无异常,常用抗生素治疗效果不明显。无高血压病史。全身体检无阳性体征。为明确诊断首选的检查是

A.胸部CT

B.心脏超声波

C.支气管激发试验

D.动脉血气分析

E.纤维支气管镜

98.女,40岁。3年来经常夜间上腹不适,2日前进油腻食,突然右上腹部阵发性绞痛伴恶心,入院时体温38℃,巩膜轻度黄染,有上腹肌紧张,压痛明显,肠鸣音弱,WBC $16 \times 10^9/L$,血清淀粉酶为128温氏单位,应首先考虑诊断的疾病是

A.胆道蛔虫症

B.急性胰腺炎

C.急性阑尾炎

D.溃疡穿孔

E.急性化脓性胆囊炎

99.女,30岁。已婚,突发腹痛,阴道流血1天。血压60/40 mmHg,体检发现一侧下腹部持续剧烈疼痛,阴道后穹窿穿刺抽出不凝血,最有价值的体征是

- A. 一侧下腹部持续性剧烈疼痛
- B. 突发腹痛
- C. 阴道后穹窿穿刺抽出不凝血
- D. 阴道流血 1 天
- E. 血压 60/40 mmHg

100. 女, 76 岁。持续性心房颤动 2 年。有脑血栓和糖尿病病史。查体: BP 120/65 mmHg, 心率 87 次/分, 心脏各瓣膜区未闻及杂音。该患者最适宜的抗栓治疗措施是

- A. 口服氯吡格雷
- B. 静脉滴注肝素
- C. 口服阿司匹林
- D. 口服华法林
- E. 皮下注射低分子肝素

101. 某边远医院收治一名异位妊娠破裂失血性休克的患者, 需紧急输血, 需要注意的是

- A. 向上级医院申请血源
- B. 生命第一, 可以不考虑血液安全
- C. 临时采集血液, 并确保采血用血安全
- D. 收集家属血液
- E. 等待安全血液, 暂不处理

102. 女性, 28 岁。继发不孕 5 年, 经后 4 天突起高热、寒战, 下腹痛, 右侧甚, 血压 110/80 mmHg, P 120 次/分, T 39 °C, 白细胞 $18 \times 10^9/L$, 中性 80%, 下腹轻压痛, 妇科查体: 宫颈稍大稍软, 有压痛, 双侧附件增厚, 压痛。诊断为

- A. 急性盆腔结缔组织炎
- B. 急性盆腔腹膜炎
- C. 急性子宫内膜炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 以上均不是

103. 男, 30 岁。健康查体时 ECG 发现偶发房性期前收缩。既往体健。查体: 心界不

大, 心率 80 次/分, 心脏各瓣膜区未闻及杂音。该患者最恰当的处理措施是

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 寻找病因, 定期随诊
- C. 口服普罗帕酮
- D. 口服美西律
- E. 口服胺碘酮

104. 患者男性, 18 岁。左上臂近端疼痛、肿胀 1 个月。就诊拍 X 线片显示: 左肱骨上段膨胀性囊状透亮区, 边界清, 内有骨性间隔将囊腔分成蜂窝状。最可能的诊断是

- A. 骨囊肿
- B. 骨纤维异样增殖症
- C. 动脉瘤样骨囊肿
- D. 内生性软骨瘤
- E. 骨肉瘤

105. 男, 69 岁。因脑梗死住院 1 个月, 近 2 周出现高热咳嗽, 咳血痰。查体: 体温 39.2 °C, 意识模糊, 呼吸急促, 口唇发绀, 双散在湿啰音, 血 WBC $21 \times 10^9/L$, 胸片: 右肺大片状阴影, 其中可见多个气囊腔。该患者最可能得的是

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 铜绿假单胞菌肺炎

106. 女, 45 岁。发热、腹痛、腹泻 2 小时, 大便 10 余次, 为脓血便, 5 小时前曾在小餐馆进食。实验室检查血 WBC $13.0 \times 10^9/L$, N 0.85, L 0.15, 镜检: WBC 80/HP, RBC 10/HP, 最可能的诊断是

- A. 急性胃肠炎
- B. 急性阑尾炎

- C.急性病毒性腹泻
D.急性细菌性痢疾
E.食物中毒

107.男,78岁。2小时前被家属发现意识不清急送入院。有慢性阻塞性肺疾病病史30年,近1周来嗜睡。查体:BP 150/90 mmHg,昏迷,球结膜水肿,口唇发绀,双下肺可闻及湿啰音,该患者最可能的诊断是

- A.电解质紊乱
B.左心衰竭
C.脑梗死
D.肺性脑病
E.感染中毒性脑病

108.女,57岁。因吞咽、饮水困难2周,现有乏力、尿少、极度口渴来诊,查体:血压正常,唇干,眼窝凹陷,烦躁不安,出现躁狂、幻觉,有时昏迷,该患者应考虑为

- A.中度高渗性缺水
B.中度低渗性缺水
C.重度等渗性缺水
D.重度高渗性缺水
E.中度等渗性缺水

109.女性,60岁。不慎跌倒,右手背着

地,当即右腕肿痛,腕下垂,活动受限。其首选的诊断是

- A.Colles骨折
B.Smith骨折
C.尺神经损伤
D.桡神经损伤
E.腕关节脱位

110.男,40岁。体检发现肝大。肝肋下2cm,质地中等,表面光滑,边缘整齐无触痛,肝功能检查正常。最可能的诊断是

- A.肝硬化
B.肝包虫病
C.慢性肝炎
D.肝腺瘤
E.肝癌

111.女,40岁,刀刺伤右上腹1小时来诊,腹腔穿刺抽出不凝血,急诊手术探查,正确的腹腔探查顺序首先探查的是

- A.肝脏
B.膈肌
C.胃后壁及胰腺
D.右肾
E.胃十二指肠

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(112~113题共用备选答案)

- A.降结肠癌
B.溃疡性结肠炎
C.小肠肿瘤
D.克罗恩病

E.升结肠癌

112.男,25岁。腹痛、腹泻,便秘交替2年。便无脓血和黏液。近1年来消瘦、乏力、贫血。下午有时低热。首先考虑的诊断是

113.女,60岁。腹胀、右下腹部隐痛6个月。阵发性隐痛,乏力、消瘦,近3个月贫血,首先应考虑的诊断是

(114~116题共用备选答案)

- A.柯萨奇病毒
- B.带状疱疹病毒
- C.腺病毒
- D.呼吸道合胞病毒
- E.人类疱疹病毒6型

114.幼儿急疹的病原是

115.咽结合膜热的病原是

116.疱疹性咽峡炎的病原是

(117~118题共用备选答案)

- A.思维贫乏
- B.病理性赘述
- C.思维迟缓
- D.思维散漫
- E.思维破裂

117.病人在回答问题时需要医生反复提醒才能勉强回答,且语速慢,语量少,声音低微。该症状是

118.病人在叙述一件事时思路曲折,加入少许多不必要的细节,坚持一定要按他原来的方式讲究,最终才回到主题上来,该症状是

(119~121题共用备选答案)

- A.卡巴肿
- B.吐根碱
- C.氯喹
- D.甲硝唑
- E.磷酸伯氨喹

119.在高疟区成人预防疟疾常服用的药物是

120.杀灭红细胞内疟原虫配子体和迟发型子孢子的药物是

121.能够杀灭各型阿米巴原虫,适用于肠内、外急慢性阿米巴病的药物是

(122~123题共用备选答案)

- A.消化道传播
- B.血液传播
- C.呼吸道传播
- D.虫媒传播
- E.性接触传播

122.登革病毒的传播方式是

123.人乳头瘤病毒的传播方式是

(124~125题共用备选答案)

- A.尿量少,CVP 较低
- B.尿量少,CVP 很高
- C.尿量多,CVP 很低
- D.尿量多,CVP 偏高
- E.尿量多,CVP 正常

124.说明抗休克治疗时液体已补足的是

125.说明抗休克治疗时血容量仍不足的是

(126~128题共用备选答案)

- A.精确操作
- B.镇静从容
- C.全神贯注
- D.合理配伍
- E.争分夺秒

126.询问病史的道德要求是

127.药物治疗对医生的道德要求是

128.急救工作对医生的道德要求是

(129~130题共用备选答案)

- A.袪利尿剂
- B.呼吸兴奋剂
- C.镇静剂
- D.强心剂
- E.血管扩张剂

129. 容易引起 II 型呼吸衰竭加重的药物是

A3/A4 型题

130. 在肺源性心脏病治疗中可引起碱中毒的药物是

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(131~133 题共用题干)

女性,18 岁。低热,咳嗽、咽部不适 2 周,胸部 X 线片示双肺网状及按小叶分布的斑片状浸润阴影,血 WBC $10 \times 10^9/L$ 。

131. 患者最可能的诊断是

- A. 军团菌肺炎
- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 病毒性肺炎
- D. 支原体肺炎
- E. 浸润型肺结核

132. 检查以确定诊断首选的是

- A. 冷凝集试验
- B. 血清抗体测定
- C. 痰真菌培养
- D. 痰细菌培养
- E. 痰抗酸杆菌涂片

133. 治疗药物首选的是

- A. 红霉素
- B. 异烟肼+利福平
- C. 氟康唑
- D. 利巴韦林
- E. 青霉素

(134~137 题共用题干)

女性,22 岁。主诉心前区疼痛 2 小时,向左肩放射,吸气时疼痛加重,坐位时减轻,伴有畏寒、发热就诊,体检:血压 105/75 mmHg,

体温 38℃,心率 110 次/分,规则,心脏无杂音,两肺未见异常,有血吸虫病史。心电图示除 AVR 与 V 外各导联 ST 段抬高。

134. 其最可能的诊断是

- A. 肺梗死
- B. 心肌梗死
- C. 心肌炎
- D. 心肌梗死伴继发性心包炎
- E. 急性心包炎

135. 入院第 3 天,血压 90/75 mmHg,颈静脉怒张,气息不能平卧,病情变化应考虑为

- A. 心脏压塞
- B. 心肌梗死扩大范围
- C. 再次肺梗死
- D. 败血症
- E. 心脏腱索断裂

136. 此时做 X 线检查可能显示

A. 左肺野楔状实质性阴影,伴左胸腔积液

- B. 正常
- C. 两侧肺门影不大
- D. 左肺野多发炎症阴影
- E. 肺部无明显充血而心影显著增大

137. 本例正确治疗是

- A. 手术取出栓子

- B.心包穿刺
- C.冠脉造影伴紧急 PTCA
- D.大剂量抗生素静脉滴注
- E.应用升压药以及强心利尿剂

(138~139 题共用题干)

男,11 岁。发作性“发呆”1 年。发作时手中持物掉落。不伴跌倒,每次约数秒钟,清醒后对发作无记忆。足月顺产。既往无脑外伤史,智力发育正常。神经系统查体未见阳性体征。头颅 CT 检查未见异常。

- 138.最可能的诊断是
- A.短暂性脑缺血发作
 - B.假性痫性发作
 - C.癫痫失神发作
 - D.晕厥
 - E.癫痫单纯部分性发作
- 139.对诊断最有价值的检查是
- A.心电图
 - B.脑电图
 - C.头颅 MRI
 - D.经颅多普勒
 - E.头颅 CT

(140~141 题共用题干)

女,45 岁, G₂P₂。痛经进行性加重伴经量增多 6 年。妇科检查:宫体均匀增大如 3 个月妊娠大小,质硬,压痛(+),血 Hb 64 g/L。

- 140.该患者最可能的诊断是
- A.子宫肉瘤
 - B.子宫腺肌病
 - C.子宫内膜癌
 - D.子宫肌瘤
 - E.功能失调性子宫出血
- 141.该患者首选的辅助检查是
- A.B 超检查

- B.MRI 检查
- C.PET-CT 检查
- D.宫腔镜检查
- E.CT 检查

(142~143 题共用题干)

女,49 岁。右腹股沟下方包块 3 年。平卧后可变小,4 小时前搬重物后,包块突然增大,并出现胀痛,逐渐加重。1 小时前出现右下腹阵发性绞痛。查体:表情痛苦,肠鸣音亢进,可闻及气过水声。右腹股沟下方可及 3 cm×3 cm 包块,触痛明显,无搏动感,平卧手法还纳未成功。

142.如行外科治疗,传统术式中最常用的是

- A.McVay 法
- B.Ferguson 法
- C.Halsted 法
- D.Shouldice 法
- E.Bassini 法

143.处理疝囊后,一般将切断的腹股沟韧带修复缝合在

- A.精索后方与联合腱上
- B.精索前方下腹外,斜肌腱膜上
- C.耻骨肌筋膜上
- D.精索后方与腹外斜肌腱膜上
- E.精索前方与联合腱上

(144~145 题共用题干)

男性,30 岁,胃溃疡史 3 年,今突上腹剧痛,面色苍白,大汗。查体:全腹压痛,腹肌紧张,似穿孔。

- 144.胃溃疡穿孔多见的部位是
- A.胃体
 - B.胃大弯
 - C.胃小弯
 - D.胃窦

E.胃底部

145.急性穿孔诊断后治疗效果最好的手术时间是

- A.8 小时
- B.10 小时
- C.12 小时
- D.24 小时
- E.48 小时

(146~147 题共用题干)

7 个月,女婴,人工喂养。平时易惊、多汗、睡眠少,近 2 日来咳嗽、低热,今晨突然双眼凝视,手足抽动。查体:枕后有乒乓球感。

146.患儿最可能是

- A.血糖降低
- B.血清钠降低
- C.血清镁降低
- D.血清钙降低
- E.脑脊液细胞数增多

147.止抽后的处理是

- A.供给氧气
- B.静滴钙剂
- C.肌注吠塞米
- D.肌注维生素 B₂
- E.静滴葡萄糖溶液

(148~150 题共用题干)

女孩,2 岁。发热伴咳嗽、咳痰 4 天,查

体:T 38.8 ℃,P 132 次/分,R 42 次/分,轻度鼻翕,双肺闻及中细湿啰音,腹稍胀,肝肋下 2 cm。胸部 X 线片见双下肺模糊片状影。实验室检查,血 WBC 13.5×10⁹/L,N 0.72,L 0.28。

148.最可能的诊断是

- A.支气管炎
- B.支气管肺炎
- C.间质性肺炎
- D.毛细支气管炎
- E.大叶性肺炎

149.首选的治疗药物是

- A.阿奇霉素
- B.万古霉素
- C.苯唑西林钠
- D.阿莫西林
- E.利巴韦林

150.治疗中患儿呼吸困难加重,呕吐少许咖啡样物。查体:P 140 次/分,R 46 次/分,严重腹胀,听诊肠鸣音消失。考虑患儿最可能发生了

- A.中毒性肠麻痹
- B.感染性休克
- C.脑性低钠血症
- D.中毒性脑病
- E.心力衰竭

本单元试卷到此结束

参考答案

第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	D	E	D	E	C	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	E	D	E	B	C	B	E	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	A	A	B	E	C	A	E	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	A	A	C	D	E	E	E	E	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	A	D	B	B	E	E	B	B	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	E	B	C	B	C	E	A	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	B	B	E	D	C	E	E	E	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	C	C	B	B	E	B	E	A	A
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	A	E	E	A	D	B	D	B	D
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	A	A	E	A	C	C	E	C	D
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	A	B	C	A	D	D	D	B	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	D	E	E	C	A	A	B	C	E

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	D	E	E	A	C	D	E	C	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	B	A	E	A	E	B	C	B	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	A	C	C	A	D	B	B	C	A

50.【解析】破伤风痉挛发作时表现为肌肉持续性收缩,最初是咀嚼肌,以后依次为面部表情肌、颈、背、腹、四肢肌,最后为膈肌。

54.【解析】①判断肺结核传染源最主要的依据是痰涂片找到抗酸杆菌,说明结核杆菌可以随着痰液传播播散,具有传染性,故本题选 C;②血沉增快只是说明结核处于活动期;胸部 X 线片显示空洞型病变提示肺部结核病变较重,有肺组织破坏,但是不一定有传染性。PPD 试验阳性是诊断肺结核的一个重要实验室指标,但不能说明其是否具有传染性。故本题选 C。

72.【解析】烧伤面积=双大腿 21%+双小腿 13%+双足 6%=40%。请注意:成年女性双足及臀部面积各为 6%,成年男性双足为 1%,双臀为 5%。

90.【解析】乳房呈炎性改变,但无发热,左腋窝淋巴结转移,应考虑炎性乳腺癌。

97.【解析】哮喘表现为发作性喘息、胸闷、咳嗽,多数患者可自行缓解或经支气管舒张剂治疗后缓解,发作间隙期检查阴性。本例多次胸片检查无异常,常用抗生素治疗效果不明显,应考虑哮喘。为明确诊断,应首选支气管舒张试验或激发试验(选 C)。胸部 CT 为影像学检查,在哮喘者无异常发现。心脏超声对确诊哮喘无意义。动脉血气分析可用于了解哮喘病人的酸碱失调情况。纤支镜主要用于检查气管、大支气管病变。

100.【解析】持续性心房颤动 2 年,属于慢性房颤,此类患者有较高的血管栓塞发生率。尤其是合并有栓塞病史、心脏瓣膜病、高血压、糖尿病、老年患者、左心室扩大、冠心病等,发生栓塞的危险性更大,均应接受长期抗凝治疗。本例患者有脑血栓和糖尿病病史,故应选用华法林长期抗凝治疗(D)。

104.【解析】动脉瘤性骨囊肿为一种从骨内向骨外膨胀性生长的骨性血性囊肿。好发年龄为青少年,好发部位为长骨的干骺端如肱骨上段以及脊柱。内有骨性间隔将囊腔分成蜂窝状或泡沫状。

105.【解析】①老年男性,表现为咳嗽、咳痰,出现高热,考虑肺部感染。胸部 X 线提示多个气囊腔,故考虑小叶性肺炎导致的肺脓肿,小叶性肺炎致病菌是金黄色葡萄球菌(A);②肺炎链球菌肺炎多见于青壮年,咳痰特点为铁锈色痰,X 线显示肺大叶广泛渗出;③肺炎支原体肺炎刺激性咳嗽为其突出症状,常伴咽痛、头痛、肌肉痛,胸片呈肺部多种形态浸润影,节段分布,多见于肺下叶;④干酪性肺炎系结核杆菌引起,多有结核中毒症状,X 线显示为干酪样病灶,密度相对较高,且不均一。⑤铜绿假单胞菌肺炎的痰为翠绿色或黄脓性。故本题选 A。

107.【解析】慢阻肺患者出现神志改变(嗜睡、意识不清),首先应考虑合并肺性脑病(D)

对)。其余选项均未在题干中体现。

109.【解析】①桡骨下端骨折分为伸直型骨折(Colles 骨折)和屈曲型骨折(Smith 骨折)。Colles 骨折多为腕关节处于背伸位、手掌着地受伤所致。Smith 骨折多为腕关节处于屈曲位、手背着地受损所致。本例右手背着地,根据受伤机制首先应考虑 Smith 骨折(B)。

②尺神经损伤常表现为爪形手。桡神经损伤常表现为腕下垂,但一般为骨折的并发症,跌倒时单纯造成桡神经损伤罕见,故不答 D。腕关节脱位多发生于腕背屈时受重压、摔倒时手掌支撑着地所致,其受伤机制与题干所述不符。