

## 全国护士执业资格考试

## 内部模拟卷(一)

## 专业务实

## 一、A1/A2型选择题(1~90题)

## 答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 上消化道出血最常见的原因是( )
- A. 门脉高压症  
B. 出血性胃炎  
C. 消化道溃疡  
D. 胃癌  
E. 胆道出血
2. 慢性心力衰竭最常见的诱因是( )
- A. 妊娠  
B. 水电解质平衡紊乱  
C. 服用洋地黄药物  
D. 感染  
E. 过度劳累
3. 发生急性左心衰竭时,病人应采取的体位是( )
- A. 平卧位  
B. 头高脚低位  
C. 头低脚高位  
D. 侧卧位  
E. 坐位,两腿下垂
4. 对于急性肺水肿病人,护士应选择哪种给氧方式( )
- A. 持续低流量给氧  
B. 低流量间断给氧  
C. 高流量持续给氧  
D. 高流量持续酒精湿化给氧  
E. 低流量持续酒精湿化给氧
5. 左心功能不全最早和最常见症状是( )
- A. 劳力性呼吸困难  
B. 咳嗽  
C. 气短,伴咳粉红色泡沫痰  
D. 心悸  
E. 少尿
6. 下列关于心源性水肿的说法正确的是( )
- A. 是左心功能不全的表现  
B. 水肿时醛固酮减少  
C. 毛细血管内压降低  
D. 水肿先出现在身体下垂部位  
E. 有效循环血容量增多
7. 蜘蛛痣的形成与下列何种因素有关( )
- A. 血小板减少  
B. 血中雌激素增加  
C. 毛细血管脆性增加  
D. 凝血机制障碍  
E. 严重感染
8. 治疗军团菌肺炎的首选抗生素是( )
- A. 林可霉素

- B. 红霉素  
C. 庆大霉素  
D. 头孢氨苄  
E. 羟氨苄青霉素
9. 咯血患者的关键护理措施是( )  
A. 消除心理不良因素  
B. 保持呼吸道通畅  
C. 减少活动, 保持安静  
D. 准备好急救药品和器械  
E. 给予镇静、镇咳等对症处理
10. 关于胸腔闭式引流的护理, 下列哪项不正确( )  
A. 病人可采取半卧位  
B. 观察引流管是否通畅  
C. 注意无菌操作  
D. 引流管的位置必须低于胸腔  
E. 肺组织修复后立即拔管
11. 患者女, 34岁。今早主诉昨晚夜间多梦易醒, 下午医生开出医嘱: 地西洋 5mg, po, sos, 当晚患者睡眠良好, 该患者医嘱未执行。值班护士应在次日上午, 在该项目医嘱栏内( )  
A. 用红笔写上“作废”  
B. 用蓝笔写上“未用”  
C. 用红笔写上“未用”  
D. 用蓝笔写上“失效”  
E. 用红笔写上“失效”
12. 鼻饲液的温度为( )  
A. 28~30 °C  
B. 30~31 °C  
C. 32~34 °C  
D. 35~36 °C  
E. 38~40 °C
13. 判断患者临床死亡期的主要指标是( )  
A. 桡动脉搏动不可触及  
B. 肌张力减退  
C. 身体温度接近室温  
D. 脑干反射消失  
E. 瞳孔对光反射消失
14. 静脉输液时, 茂菲氏滴管内的液面自行下降, 原因是( )  
A. 输液速度过快  
B. 滴管或滴管以下导管有漏气  
C. 环境温度太低  
D. 输液瓶挂得太高  
E. 患者肢体摆放不当
15. 胆囊造影前一日晚餐应给予( )  
A. 高热量、高蛋白饮食  
B. 无脂肪、低蛋白饮食  
C. 高脂肪、高蛋白饮食  
D. 低蛋白、低糖饮食  
E. 高热量、低蛋白饮食
16. 无菌技术操作时, 正确的是( )  
A. 定期检查无菌物品保存情况, 有效期为 14 天  
B. 操作者要修剪指甲, 为方便操作, 应将手表尽量塞进衣袖  
C. 取出的用物没有用完应及时放回原无菌容器中  
D. 操作环境要清洁, 操作前半小时禁止清扫工作

- E. 操作者不得跨越无菌区, 手臂 始终保持在操作台面以上
17. 法洛四联症的四种病理变化中最重要的是( )
- A. 肺动脉狭窄  
B. 主动脉骑跨  
C. 室间隔缺损  
D. 房间隔缺损  
E. 动脉导管未闭
18. 室性心动过速最常见的病因是( )
- A. 心脏瓣膜病  
B. 感染性心内膜炎  
C. 冠心病  
D. 心肌炎  
E. 心肌病
19. 常见的青紫型先天性心脏病是( )
- A. 动脉瓣狭窄  
B. 房间隔缺损  
C. 室间隔缺损  
D. 法洛四联症  
E. 动脉导管未闭
20. 临床上最常见的心律失常为( )
- A. 窦性心律不齐  
B. 窦性心动过缓  
C. 窦性心动过速  
D. 心室颤动  
E. 期前收缩
21. 下列保持大便通畅措施中, 心力衰竭病人不适宜采用的是( )
- A. 摄入足够量的水分  
B. 养成定时大便的习惯  
C. 开塞露的应用  
D. 进食容易消化的食物  
E. 多吃含纤维素多的食物
22. 心脏瓣膜的功能是( )
- A. 防止感染  
B. 净化血液  
C. 起部分血液泵作用  
D. 调节心脏功能  
E. 防止血液反流
23. 二尖瓣膜位于什么部位( )
- A. 左心室与左心房之间  
B. 右心室与右心房之间  
C. 左心室与主动脉之间  
D. 右心室与主动脉之间  
E. 左右心室之间
24. 心脏传导系统中自律性最高的是( )
- A. 房室结  
B. 结间束  
C. 希氏束  
D. 窦房结  
E. 普肯耶细胞
25. 长期卧床的心力衰竭病人, 进行皮肤护理的重点部位是( )
- A. 胫前  
B. 踝部  
C. 腹部  
D. 双下肢  
E. 腰骶部
26. 由于心排血量突然下降出现的晕厥称( )

- A. 心脏骤停  
B. 阿-斯综合征  
C. 脑卒中  
D. 低血糖综合征  
E. 急性心肌梗死
27. 低血糖反应的急救有效措施是( )  
A. 减少胰岛素用量  
B. 就地休息  
C. 立即输入氯化钠  
D. 立即食糖果或含糖饮料  
E. 加大饭量
28. 关于丹毒病人的护理, 下列哪项是错误的( )  
A. 急性期局部做热敷  
B. 局部硫酸镁湿敷  
C. 患肢抬高, 制动  
D. 抗生素的应用  
E. 需床边隔离
29. 护理程序五个步骤中, 哪项是错误的( )  
A. 评估  
B. 诊断  
C. 治疗  
D. 实施  
E. 评价
30. 低钾血症时静脉输液补钾速度一般不超过( )  
A. 10 mmol / h  
B. 20 mmol / h  
C. 30 mmol / h  
D. 40 mmol / h  
E. 50 mmol / h
31. 高钾血症时, 静脉注射 10%葡萄糖酸钙的作用的是( )  
A. 改善微循环状况  
B. 纠正酸中毒  
C. 对抗钾离子抑制心肌的作用  
D. 增加神经肌肉应激性  
E. 增加心肌收缩力
32. 下列哪一项不是评价营养不良的指标( )  
A. 体重下降超过 20%  
B. 血浆白蛋白小于 30g/L  
C. 血浆转铁蛋白小于 200mmol/L  
D. 血糖高于 160mg/dL  
E. 握力明显减弱
33. 容易引起急性肾衰竭的损伤是( )  
A. 严重挤压伤  
B. 广泛擦伤  
C. 严重撕裂伤  
D. 多处刺伤  
E. 冻伤
34. 休克时病人的体位应取( )  
A. 半卧位  
B. 头低足高位  
C. 头与躯干抬高  $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ , 下肢抬高  $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$   
D. 头高足低位  
E. 侧卧位
35. 破伤风最早出现的症状是( )  
A. 角弓反张  
B. 张口不便

- C. 苦笑面容  
D. 牙关紧闭  
E. 四肢抽搐
36. 痈与疔的主要鉴别点是( )  
A. 常见于糖尿病患者  
B. 致病菌不同  
C. 全身中毒症状明显  
D. 发生的部位不一样  
E. 创面有多个脓肿
37. 手术区皮肤消毒范围应包括切口周围( )  
A. 5cm  
B. 10cm  
C. 15cm  
D. 20cm  
E. 25cm
38. 心跳、呼吸骤停患者, 初期复苏护理的首要措施是( )  
A. 开放呼吸道  
B. 胸外按压  
C. 迅速开放静脉输液通路  
D. 严密观察病情变化  
E. 准备好常用急救药物和器械物品
39. 防止术后肺不张, 下列哪项是错误的( )  
A. 术前一周卧床休息, 减少活动  
B. 术前控制呼吸道感染  
C. 嗜烟者术前戒烟 1~2 周  
D. 术中或术后防止呕吐物吸入  
E. 术前锻炼深呼吸
40. 烧伤的严重程度分类主要根据是( )  
A. 致伤因子  
B. 烧伤部位  
C. 病人年龄  
D. 烧伤面积和深度  
E. 病人体质
41. 护士的道德义务不包括( )  
A. 监督患者权利实现  
B. 保护患者隐私  
C. 减轻患者痛苦  
D. 告知病情  
E. 尊重患者决定
42. 以下可作为申请护士执业注册的学历证书是( )  
A. 高等教育自学考试护理学专业本科毕业证书  
B. 普通中等专业学校三年制全日制普通中专毕业证书  
C. 普通高等学校夜大护理学专业大专毕业证书  
D. 成人高等学校全日制非护理学专业专升本毕业证书  
E. 重点高等医学教育机构网络教育毕业证书
43. 护士申请延期注册的时间应为( )  
A. 有效期届满前 60 天  
B. 有效期届满后半年  
C. 有效期届满当天  
D. 有效期届满前 30 天  
E. 有效期届满后 30 天
44. 护士的面部表情应根据不同的环境和需要有所不同, 下列不妥的是( )

- A. 任何情况不气愤
- B. 面对病人时,应真诚友好
- C. 面对疾病缠身者,应给予关注和安慰
- D. 面对疼痛的患者,给予关注和安慰
- E. 面对危重病人,表情开心
45. 根据我国《献血法》规定,择期手术患者手术用血应( )
- A. 自行献血
- B. 自身储血
- C. 家属献血
- D. 同型输血
- E. 互助献血
46. 某癌症患者检查患有艾滋病,护士在对此患者的护理行为中违反护理伦理的是( )
- A. 对其一视同仁
- B. 尊重患者
- C. 认真观察病情变化
- D. 鼓励积极配合治疗
- E. 以患者为例大力宣传艾滋病
47. 患者,女性,65岁,因车祸脑部外伤入院手术。术后第4天患者可以唤醒,随后入睡,对所提问题能正确回答,但反应迟钝。护士根据患者的情况判断患者的意识状态属于( )
- A. 昏睡
- B. 嗜睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 意识模糊
48. 患者女,60岁,住院期间需要吸氧,错误的操作是( )
- A. 给氧期间不可随意调节氧流量
- B. 先调节好流量再插管
- C. 插管前检查导管是否通畅
- D. 插管前用湿棉签清洁鼻腔
- E. 停用氧气时先关流量开关
49. 患者,女性,60岁,因尿毒症行肾移植术,术后24h内护士应给予患者( )
- A. 一级护理
- B. 二级护理
- C. 三级护理
- D. 特级护理
- E. 24h监护护理
50. 患者,男性,90岁,因休克型肺炎死亡。临床死亡的诊断标准是( )
- A. 出现尸僵
- B. 各器官新陈代谢停止
- C. 血压测不到
- D. 神经反射消失
- E. 心跳、呼吸停止,各种反射消失
51. 下列哪项对促进乳汁分泌是有害的( )
- A. 授乳
- B. 精神受刺激
- C. 按摩乳房
- D. 充足睡眠
- E. 良好营养
52. 胎体最早进入骨盆的部分称( )
- A. 胎先露
- B. 胎产式
- C. 胎方位

- D. 衔接
- E. 入盆
53. 关于早产概念, 下列哪项正确( )
- A. 妊娠 20~36 周间终止者
- B. 妊娠 24~36 周间终止者
- C. 妊娠 28~36 周间终止者
- D. 妊娠 28~37 周间终止者
- E. 妊娠 36~38 周间终止者
54. 属于横产式的是( )
- A. 右枕横
- B. 肩左前
- C. 骶左后
- D. 骶左横
- E. 颊左前
55. 属于孕激素的生理作用是( )
- A. 使增生期子宫内膜转化为分泌期
- B. 促使子宫发育及肌层变厚
- C. 使乳腺腺管增生
- D. 使阴道上皮增生、角化
- E. 促使水钠潴留
56. 月经期是哪层子宫内膜剥脱( )
- A. 致密层
- B. 海绵层
- C. 基底层
- D. 功能层
- E. 以上都不是
57. 物理降温最有效的方法是( )
- A. 使用冰槽进行头部降温
- B. 冰袋头部冷敷
- C. 30%乙醇擦浴
- D. 40℃温水擦浴
- E. 冰囊冷敷大动脉处
58. 下列哪项与骨盆底作用无关( )
- A. 承载和支持盆腔脏器
- B. 控制排尿
- C. 保持盆腔脏器的正常位置
- D. 分娩时协助先露部旋转与下降
- E. 封闭骨盆出口
59. 下述哪项属于子宫附件( )
- A. 阴道口
- B. 大阴唇
- C. 小阴唇
- D. 阴唇系带
- E. 输卵管
60. 以下哪项不是儿科临床护理程序的内容( )
- A. 对患儿及家属进行评估
- B. 制订实施护理计划
- C. 作出护理诊断
- D. 进行护理评价
- E. 进行出院指导
61. 患者, 男性, 37 岁, 出差中感染了痢疾, 发作时明显寒战, 全身发抖, 面色苍白, 口唇发绀, 寒战持续约 10min, 体温骤升至 40℃, 面色潮红, 皮肤干热, 烦躁不安, 持续约 3h, 体温又骤降至正常。经过几天的间歇期后, 再次发作, 此患者发热的热型是( )
- A. 弛张热
- B. 稽留热
- C. 间歇热

D. 波浪热

E. 不规则热

62. 患者, 女性, 65 岁。因胸痛就诊, 既往有心绞痛八年。鉴别急性心肌梗死与心绞痛, 症状的主要区别是( )

A. 引起诱因不同

B. 疼痛部位不同

C. 疼痛性质不同

D. 疼痛表现不同

E. 疼痛持续时间不同

63. 患者, 女性, 66 岁, 大学教授, 因血压高住院治疗。适用于该患者的最佳护患关系模式是( )

A. 指导型

B. 指导-合作型

C. 共同参与型

D. 被动型

E. 主动-被动型

64. 患者, 女性, 54 岁, 有溃疡病史 10 年, 突然上腹部剧痛并波及右下腹。查体: 右上腹压痛、反跳痛、肌紧张。护士采取的措施中最重要的是( )

A. 观察生命体征的变化

B. 禁食、胃肠减压

C. 应用制酸药

D. 应用抗生素

E. 卧床休息

65. 患者, 女性, 62 岁。慢性阻塞性肺气肿病史十多年。今日傍晚进餐时一米粒呛入气管引起剧烈咳嗽, 突然呼吸困难, 右胸刺痛, 逐

渐加重。最可能是发生了( )

A. 自发性气胸

B. 支气管阻塞

C. 胸腔积液

D. 肺栓塞

E. 心肌梗死

66. 患者, 男性, 22 岁, 既往体健, 体检时发现肝功能正常, 抗-HBs 阳性, 反复查 HBV 其他血清标记物均为阴性。表示此患者为( )

A. 对乙型肝炎病毒有免疫力

B. 乙型肝炎病情稳定

C. 乙型肝炎有传染性

D. 乙型肝炎病毒携带者

E. 乙型肝炎恢复期

67. 30 岁初孕妇, 孕 38 周。自妊娠 37 周开始自觉头痛、眼花。护士查血压 165/105mmHg, 宫缩不规律, 胎心 141 次/分, 化验单示尿蛋白 3.0g/24h。此时该护士首先应采取哪项措施( )

A. 遵医嘱静脉滴注缩宫素

B. 遵医嘱静脉滴注硫酸镁

C. 门诊治疗并注意随访

D. 住院待产

E. 急诊剖宫产

68. 初产妇, 32 岁, 行会阴侧切术, 产后第 4 天, 会阴伤口水肿, 无分泌物和压痛。护士为其制订的护理措施中哪项应除外( )

A. 用 1:5000 高锰酸钾坐浴

B. 会阴擦洗 2 次/d

C. 用 95%乙醇湿敷



- D. 局部红外线照射
- E. 保持外阴清洁、干燥
69. 某产妇, 双胎妊娠, 产前合并有轻度妊娠期高血压疾病, 产后阴道持续出血, 胎儿娩出后 24h 出血量达 600ml, 检查子宫软, 按摩后子宫变硬, 阴道流血减少, 该产妇诊断为产后出血。造成该产妇产后出血的最可能原因是( )
- A. 胎膜残留
- B. 胎盘残留
- C. 凝血功能障碍
- D. 子宫收缩乏力
- E. 软产道裂伤
70. 早产儿, 出生后 3h 出现呼吸困难, 拒乳, 口唇青紫, 三凹征明显, 两肺闻及湿啰音, X 线胸片透亮度减低。护士制订的护理计划中最主要的护理诊断是( )
- A. 营养不足
- B. 活动无耐力
- C. 有感染的危险
- D. 气体交换受损
- E. 有皮肤受损的危险
71. 患者, 女性, 19 岁, 患 I 型糖尿病 2 年, 每日注射胰岛素, 平均 40U, 近 1 周因胰岛素用完, 而停用胰岛素治疗。乏力 3 天, 昏迷 4h, 入院。以下哪项检查是最重要的( )
- A. 立即行 CT 检查
- B. 立即做血气分析
- C. 立即行血常规检查
- D. 立即导尿查尿糖
- E. 立即抽血查血糖、血酮体
72. 休克患者经扩容治疗后, 测中心静脉 20cmH<sub>2</sub>O, 血压 80/50mmHg, 应考虑( )
- A. 血容量严重不足
- B. 心功能不全
- C. 容量血管过度收缩
- D. 容量血管过度扩张
- E. 心功能恢复
73. 一男性肺癌患者, 病理诊断为肺小细胞肺癌, 首选的治疗方法为( )
- A. 手术切除
- B. 放射治疗
- C. 化疗
- D. 单纯营养支持
- E. 免疫治疗
74. 男性, 30 岁, 电工, 操作不慎, 电流接触不良产生电弧热, 引起头面、颈部烧伤, 有水疱, 部分水疱破损, 创面基底苍白, 有疼痛, 对病人烧伤面积和深度的估计是( )
- A. 4% 深 II 度
- B. 4% 浅 II 度
- C. 9% 深 II 度
- D. 9% 浅 II 度
- E. 4% III 度
75. 患者背部大片明显红、肿、痛, 与正常皮肤之间的界限不清, 无波动感, 伴有寒战、发热、白细胞增加, 最可能的诊断是( )
- A. 疖
- B. 痈
- C. 蜂窝织炎

D. 浅表脓肿

E. 丹毒

76. 某 3 岁小儿接种乙脑疫苗, 5min 后突然出现烦躁不安, 面色苍白, 口周发青, 四肢湿冷呼吸困难的, 脉细弱, 应考虑( )

A. 接种后局部反应

B. 接种后全身反应

C. 接种后局部强反应

D. 接种后中等反应

E. 接种后过敏性休克

77. 某婴儿出生时体重为 3.5kg, 生后 5 个月体重应是( )

A. 5kg

B. 6kg

C. 7kg

D. 8kg

E. 11kg

78. 急、慢性胃炎患者有少量出血时, 为中和胃酸可给予( )

A. 米汤

B. 肉汤

C. 绿色蔬菜

D. 温开水

E. 凉开水

79. 某一外伤患者有休克、昏迷、脾破裂、开放性气胸、开放性胫腓骨骨折等危急情况, 抢救时首先应( )

A. 用升压药物

B. 处理休克

C. 手术止血

D. 骨折固定

E. 封闭胸壁伤口

80. 患者, 女性, 60 岁, 心率 120 次/分, 心音强弱不等, 心律不规则, 测脉搏时脉细弱, 62 次/分且极不规则, 为准确观察, 护士应( )

A. 3 人, 一人测心率, 一人测脉率, 一人计时

B. 2 人同时分别测心率和脉率

C. 1 人同时测心率和脉率

D. 先测脉率, 后测心率

E. 先测心率, 后测脉率

81. 患者, 男性, 20 岁。患血小板减少性紫癜, 检查口腔时发现口腔黏膜有散在斑点, 左侧下牙龈有瘀斑, 为此患者进行口腔护理, 应特别注意( )

A. 水不可过湿以防呛咳

B. 动作轻稳, 勿损伤黏膜

C. 擦拭时先擦拭瘀斑处

D. 擦拭时勿触及咽部以免恶心

E. 所有用品均应无菌

82. 患儿女, 9 个月。生后一直奶粉喂养, 未加辅食, 体检: 营养差, 皮肤黏膜苍白, 化验: 血红蛋白 60g/L, 红细胞  $2 \times 10^{12}/L$ , 此患儿确诊为营养性缺铁性贫血, 导致该患儿缺铁的主要原因是( )

A. 铁的丢失过多

B. 铁的储存不足

C. 生长发育快

D. 铁的摄入不足

E. 铁的吸收、利用障碍

83. 正常 8 个月婴儿, 体重大约为( )

- A. 6. 5kg  
B. 7. 5kg  
C. 8 kg  
D. 8. 5kg  
E. 9. 2kg
84. 患儿男, 生后2天, 已按时完成疫苗接种, 体格检查正常, 准备出院。家长询问第二次乙肝疫苗接种的时间, 护士回答正确的是( )
- A. 1月  
B. 2月  
C. 3月  
D. 4月  
E. 5月
85. 患儿, 4岁。低钙抽搐需用钙剂治疗, 护士凭经验从固定位置取出10%葡萄糖酸钙, 未查对。注射后患儿死亡, 经查实推注的竟是10%氯化钾。该护士的行为属于( )
- A. 医疗差错  
B. 故意犯罪  
C. 意外事故  
D. 过失犯罪  
E. 侵权行为
86. 患者, 男性, 25岁。腹泻静脉输注氯化钾, 患者主诉局部疼痛, 护士检查回血良好, 局部无红肿, 正确的是( )
- A. 局部止痛  
B. 提高输液袋  
C. 减慢输液速度  
D. 将针头再进入少许  
E. 拔针后另外穿刺
87. 患儿女, 因早产住院治疗, 现4个月, 需补种卡介苗, 正确的是( )
- A. 立即接种  
B. 4个月后接种  
C. PPD阳性接种  
D. PPD阴性接种  
E. 与百白破疫苗同时接种
88. 患者, 女性, 45岁, 因卵巢癌住院, 一直哭泣、焦虑, 首选的护理措施是( )
- A. 给予镇静药  
B. 让家属探视  
C. 同意家属陪护  
D. 倾听患者倾诉并给予安抚  
E. 通知主管医生
89. 患者, 男性, 38岁, 车祸急诊入院, 失血性休克, 血压70/50mmHg, 合适体位是( )
- A. 去枕仰卧位  
B. 头低足高位  
C. 头高足低位  
D. 中凹卧位  
E. 侧卧位
90. 患者, 女性, 32岁。因晚期产后出血入院, 保守治疗不正确的是( )
- A. 止血  
B. 平卧位  
C. 控制感染  
D. 取半坐卧位  
E. 防止休克

二、A3/A4 型选择题(91-120 题)

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例有若干个考题。请根据提供的信息,在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(91~92 题共用题干)

男,45 岁,吸烟史 20 年,慢性支气管炎史 5 年,近 1 年咳嗽咳痰,发作频繁。

91. 护士为病人进行健康教育,下列哪项不妥( )

- A. 增强营养
- B. 注意保暖
- C. 戒烟和体育锻炼
- D. 需经常使用抗生素
- E. 镇咳祛痰药

92. 缓解期宜采用的治疗是( )

- A. 扶正固本、免疫治疗
- B. 预防性应用抗生素
- C. 祛痰止咳剂
- D. 小剂量皮质激素
- E. 支气管扩张剂

(93~95 题共用题干)

男性,40 岁,体重 60kg,因食管癌进食困难 1 月余。主诉:乏力,极度口渴,尿少而色深。检查:血压、体温均正常,眼窝凹陷,唇、舌干燥,皮肤弹性差。

93. 该病人的水、电解质失衡诊断为( )

- A. 轻度高渗性缺水
- B. 中度高渗性缺水

C. 重度高渗性缺水

D. 等渗性缺水

E. 低渗性缺水

94. 根据上面水电解质失衡的诊断此病人应补充哪种液体( )

- A. 林格氏液
- B. 3%~5% 盐水
- C. 葡萄糖溶液+盐水
- D. 2%碳酸氢钠
- E. 乳酸钠

95. 补液后口渴减轻,尿量增多,测血清钾浓度为 3.1mmol/L。应在尿量达下列哪项指标时补给钾盐( )

- A. >20ml/h
- B. >25ml/h
- C. >30ml/h
- D. >35ml/h
- E. >40ml/h

(96~98 题共用题干)

某新生儿出生体重 2800g,身长 50cm,面色红润,哭声响亮,一般情况好,现母乳喂养。

96. 该新生儿开乳时间是( )

- A. 生后 0.5h 内喂母乳
- B. 生后 6h 喂母乳

- C. 产后 12h 喂母乳
- D. 产后 18h 喂母乳
- E. 产后 24h 喂母乳

97. 母亲授乳时最好的体位是( )

- A. 平卧位
- B. 坐位
- C. 右侧卧位
- D. 左侧卧位
- E. 立位

98. 授乳后婴儿应取的体位是( )

- A. 左侧卧位
- B. 右侧卧位
- C. 平卧位
- D. 头侧位
- E. 坐位

(99~100 题共用题干)

患者, 男性, 45 岁, 车祸。患者尺骨、桡骨骨折, 伴有开放性伤口, 行上臂管型石膏固定。

99. 护士为患者采取的正确处理措施是( )

- A. 石膏绷带未凝结前, 肢体可以随意活动
- B. 为不影响远端血供, 石膏固定应该宽松
- C. 石膏固定过程中患肢制动, 抬高
- D. 包裹石膏的患肢疼痛时, 患者可自行服用镇痛药

E. 严密观察被固定肢体的血供

100. 护士采取的措施中下列哪项可预防患肢发生失用性骨质疏松( )

- A. 加强营养支持
- B. 石膏固定不能太紧

C. 未固定的肢体抬高

D. 患肢做肌肉舒缩活动

E. 寒冷季节时肢体远端应注意保暖

(101~102 题共用题干)

患者, 男性, 26 岁, 自感低热、乏力、食欲缺乏, 有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等, 就医诊断为浸润型肺结核, 收入院抗结核治疗。

101. 此患者需要隔离, 护士应采取以下哪种隔离措施( )

- A. 接触性隔离
- B. 一般隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 严密隔离
- E. 昆虫隔离

102. 关于疾病防治, 护士的正确操作应除外( )

- A. 病室每日用紫外线进行空气消毒
- B. 护士在病房里不密切接触患者时, 可不戴口罩
- C. 给予异烟肼、链霉素治疗
- D. 需密切观察患者用药后有无副作用
- E. 患者痰液用消毒液搅拌静置 2h 后倒掉

(103~104 题共用题干)

孕妇, 27 岁。妊娠 39 周, 规律宫缩 5h, 入院待产。枕左前位, 估计胎儿体重 2800g, 胎心 135 次/分。阴道检查: 宫口开大 3cm, 未破膜, S<sup>+1</sup>, 骨盆外侧量未见异常。

103. 若宫缩逐渐减弱, 总产程已 11h, 胎膜已破, 宫口开大 8cm, 则恰当的处理是( )

- A. 肌内注射缩宫素
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 补充营养, 适当休息
- D. 肌内注射西地兰
- E. 肌内注射派替啶

104. 此时选择的恰当分娩方式是( )

- A. 会阴切开辅助阴道分娩
- B. 胎头吸引器辅助阴道分娩
- C. 择期剖宫产
- D. 自然阴道分娩
- E. 急诊剖宫产术

(105~107 题共用题干)

患儿, 女, 10 月, 呕吐、腹泻 4 天住院。大便 10~15 次/天, 蛋花汤样, 伴呕吐 3~4 次, 4 h 无尿, 皮肤弹性差, 肢端凉, 大便镜检偶见白细胞。

105. 护士考虑该患儿腹泻的病原体最可能的是( )

- A. 轮状病毒
- B. 侵袭性大肠杆菌
- C. 产毒性大肠杆菌
- D. 白色假丝酵母菌
- E. 痢疾杆菌

106. 护士判断该患儿腹泻的脱水程度是( )

- A. 轻度脱水
- B. 轻-中度脱水
- C. 中度脱水

D. 中-重度脱水

E. 重度脱水

107. 经治疗后患儿脱水、酸中毒明显好转, 突然发生惊厥, 最可能的原因是( )

- A. 低血糖
- B. 低钙血症
- C. 低钠血症
- D. 低镁血症
- E. 低钾血症

(108~110 题共用题干)

患者, 女性, 55 岁。有糖尿病史, 患者自述外阴瘙痒, 白带呈豆腐渣样, 妇科检查: 外阴有抓痕, 黏膜有白色膜状物。

108. 该患者为( )

- A. 细菌性阴道病
- B. 滴虫阴道炎
- C. 宫颈糜烂
- D. 老年性阴道炎
- E. 外阴阴道假丝酵母菌病

109. 局部用冲洗液的浓度是( )

- A. 0.1%~0.5%碳酸氢钠溶液
- B. 0.3%~0.5%碳酸氢钠溶液
- C. 2%~4%碳酸氢钠溶液
- D. 4%~5%碳酸氢钠溶液
- E. 5%~6%碳酸氢钠溶液

110. 局部冲洗后阴道应放置( )

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 链霉素

- D. 甲硝唑泡腾片  
E. 制霉菌素片

(111~112 题共用题干)

患者, 男性, 62 岁, 因足底刺伤后出现全身肌肉紧张性收缩, 阵发性痉挛, 诊断为破伤风。

111. 导致患者死亡的常见原因是( )

- A. 窒息  
B. 骨折  
C. 肺不张  
D. 尿潴留  
E. 脱水、酸中毒

112. 护士为其制订护理措施以控制痉挛, 这些护理措施应除外( )

- A. 置于隔离暗室  
B. 鼻饲流食饮食  
C. 保持病室安静  
D. 避免寒冷、声音及精神刺激  
E. 护理措施要集中进行

(113~115 题共用题干)

患者, 男性, 36 岁, 因与家人吵架服毒。询问家属不能准确说出毒物的名称。查体: 神志不清, 双侧瞳孔缩小。

113. 护士判断可能的中毒毒物是( )

- A. 有机磷或吗啡类中毒  
B. 碱性物中毒  
C. 氰化物中毒  
D. 颠茄类中毒  
E. 乙醇中毒

114. 为患者洗胃时, 胃管插入的长度是( )

- A. 30~45cm  
B. 45~50cm  
C. 52~60cm  
D. 60~65cm  
E. 45~55cm

115. 在毒物不明确的情况下, 护士的正确处理方法是( )

- A. 用生理盐水清洁灌肠, 减少毒物吸收  
B. 抽出胃内容物送检, 再用温水洗胃  
C. 抽取胃内容物送检  
D. 用高锰酸钾洗胃  
E. 用牛奶洗胃

(116~117 题共用题干)

急诊要配备完好的急救物品及药品, 完整无缺处于备用状态。做到及时检查维修和维护, 以确保病人的及时使用和护理安全。

116. 急救物品和药品保管使用中错误的环节是( )

- A. 定人保管  
B. 定人使用  
C. 定点放置  
D. 定时检查  
E. 定期消毒

117. 急救物品的合格率应保持在( )

- A. 100%  
B. 99%以上  
C. 98%以上  
D. 95%以上

E. 90%以上

(118~120 题共用题干)

患者, 女性, 35 岁, 发热 2 天。前日淋雨后突发寒战、高热、咳嗽、胸痛、气急, 咳铁锈色痰。体检左下肺有实变, 闻及湿啰音, 诊断为肺炎球菌肺炎。

118. 首选治疗用药是( )

- A. 氨茶碱
- B. 地塞米松
- C. 头孢拉定
- D. 青霉素
- E. 红霉素

119. 患者经抗炎及对症治疗后, 病情未有明

显好转。为防止病情恶化, 护士应重点注意观察( )

- A. 痰的性状变化
- B. 血压变化
- C. 体温变化
- D. 呼吸节律的变化
- E. 心率变化

120. 若发生感染性休克, 则休克治疗的必需药物应除外( )

- A. 抗生素
- B. 硝酸甘油
- C. 5%碳酸氢钠
- D. 糖皮质激素
- E. 低分子右旋糖酐



## 实践能力

## 一、A1/A2 型选择题(1~82 题)

## 答题说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 呼吸衰竭发生时, 最早因缺氧发生损害的组织器官是( )
- A. 大脑  
B. 心脏  
C. 肝脏  
D. 脾脏  
E. 肺脏
2. 二尖瓣面容的特点是( )
- A. 两颊部蝶形红斑  
B. 两颊部紫红, 口唇轻度发绀  
C. 两颊黄褐斑  
D. 午后两颊潮红, 面色红润  
E. 面部毛细血管扩张
3. 不属于新生儿常见的正常生理状态的是( )
- A. 乳腺增大  
B. 生理性黄疸  
C. 臀红  
D. 假月经  
E. 螳螂嘴
4. 急性黄疸型肝炎黄疸前期最突出的表现是( )
- A. 消化道症状  
B. 呼吸道症状  
C. 泌尿道症状  
D. 呼吸系统症状  
E. 血液系统症状
5. 对血液疾病患者进行长期用药指导的内容不包括( )
- A. 药物的名称、剂量、用药方法  
B. 教会病人或家属观察药物的不良反应监测  
C. 教会病人或家属观察药物的疗效  
D. 根据药物疗效调整药物剂量  
E. 指导患者时间药效的观点
6. 新生儿硬肿症最先受累的部位是( )
- A. 上肢  
B. 面颊  
C. 下肢  
D. 后背  
E. 臀部
7. 肝硬化患者出现全血细胞减少的原因主要是( )
- A. 血液稀释  
B. 脾功能亢进  
C. 肝衰竭  
D. 营养不良  
E. 隐性失血过多
8. 强迫症的发病高峰的年龄阶段是( )
- A. 婴儿期

- B. 幼儿期  
C. 青少年期  
D. 性成熟期  
E. 老年期
9. 典型心绞痛发作的部位常位于( )  
A. 心前区且向左上肢前内侧反射  
B. 胸骨体中段或上段后且向左上肢前内侧放射  
C. 胸骨下段且向左肩背部放射  
D. 心尖区且向左肩背部放射  
E. 右肋缘且向右上肢前外侧放射
10. 急性心肌梗死的处理中不正确的是( )  
A. 控制休克  
B. 消除心律失常  
C. 使用止痛药物  
D. 再灌注心肌  
E. 保护肾功能
11. 下列哪项检查结果提示可能是慢性肝炎与肝硬化( )  
A. 血清转氨酶升高  
B. 血清碱性碳酸酶升高  
C. 血清直接胆红素升高  
D. 白蛋白与球蛋白比例倒置  
E. 凝血酶原时间延长
12. 成年男性正常的血红蛋白参考值为( )  
A. 100~140g/L  
B. 110~150g/L  
C. 120~160g/L  
D. 140~170g/L  
E. 170~200g/L
13. 镜下脓尿是指离心沉淀后的尿沉渣在每高倍镜视野中见到的白细胞为( )  
A. 1个  
B. 2个  
C. 3个  
D. 4个  
E. 5个
14. 网织红细胞减少, 主要见于( )  
A. 缺铁性贫血  
B. 出血性贫血  
C. 再生障碍性贫血  
D. 溶血性贫血  
E. 营养性巨幼细胞贫血
15. 尿蛋白定量标本瓶内应加防腐剂( )  
A. 甲苯 5ml  
B. 甲醛 5ml  
C. 浓盐酸 5ml  
D. 稀盐酸 5ml  
E. 石碳酸 5ml
16. 下列哪项检查, 主要反映肾小球滤过功能( )  
A. 酚红排泄试验  
B. 尿液常规检查  
C. 尿浓缩稀释试验  
D. 内生肌酐清除率检查  
E. 一小时尿细胞排泄率检查
17. 上消化道出血病人的粪便可呈( )  
A. 脓血样  
B. 果酱样  
C. 米泔水样

- D. 柏油样  
E. 白陶土样
18. 下列哪项化验结果是冠心病的危险因素( )
- A. 血清总胆固醇下降  
B. 血清甘油三脂下降  
C. 血清高密度脂蛋白-胆固醇增高  
D. 血清低密度脂蛋白-胆固醇增高  
E. 血清肌酸磷酸激酶降低
19. 在体液平衡中下列哪项不对( )
- A. 细胞内液约为体重的 40%  
B. 细胞外液约为体重的 20%  
C. 组织间液约为体重的 15%  
D. 血浆约为体重的 5%  
E. 它们之间是非动态平衡
20. 脑复苏中首选的脱水剂为( )
- A. 25%葡萄糖液  
B. 50%葡萄糖液  
C. 20%甘露醇  
D. 速尿  
E. 尿素
21. 尿路结石的主要症状是( )
- A. 发热寒战  
B. 排尿困难  
C. 尿频、尿急、尿不尽  
D. 与活动有关的疼痛  
E. 无痛性血尿
22. 右心衰竭病人查体时可出现( )
- A. 细脉  
B. 颈静脉怒张  
C. 阵发性夜间呼吸困难  
D. 心尖区收缩期奔马律  
E. 双肺底湿啰音
23. 慢性支气管炎最常见的并发症为( )
- A. 肺脓肿  
B. 呼吸道感染  
C. 阻塞性肺气肿  
D. 支气管扩张  
E. 哮喘
24. 绒毛癌最常见的死亡原因是( )
- A. 阴道转移  
B. 淋巴转移  
C. 脑转移  
D. 肾转移  
E. 骨转移
25. 肝性脑病最早出现的临床表现是( )
- A. 角弓反张  
B. 锥体束征阳性  
C. 视物模糊  
D. 昏迷不醒, 呼之不应  
E. 性格和行为改变
26. 支气管扩张患者一天中咳嗽、咳痰最重的时间是( )
- A. 晨起  
B. 白天  
C. 睡醒  
D. 凌晨  
E. 傍晚
27. 腹外疝内容物最多见的是( )
- A. 小肠

B. 大网膜

C. 大肠

D. 盲肠

E. 膀胱

28. 急性胆囊炎在非手术治疗期间若出现胆囊穿孔, 最主要的护理措施是( )

A. 做好紧急手术的准备

B. 药物止痛

C. 镇静、心理安慰

D. 物理降温

E. 禁食、胃肠减压

29. 支气管扩张大咯血患者最危险且最常见的并发症是( )

A. 严重失血

B. 休克

C. 窒息

D. 继发感染

E. 高热

30. 产后出血为胎儿娩出后 24h 内阴道出血量超过( )

A. 250ml

B. 350ml

C. 500ml

D. 800ml

E. 1000ml

31. 有关B超检查胆道疾病的优点中, 哪项不正确( )

A. 确诊率高

B. 安全, 无痛苦

C. 术前不需禁食、禁水

D. 无任何禁忌证

E. 是无损伤检查法

32. 胆总管结石与胰头癌的主要鉴别点是( )

A. 有无皮肤瘙痒

B. 有无胆囊肿大

C. 有无进行性加重黄疸

D. 有无肝功能改变

E. 有无淀粉酶改变

33. 王先生, 35 岁, 长期吸烟, 右下肢反复发作静脉炎, 并有间歇性跛行, 最可能的诊断是( )

A. 雷诺病

B. 动脉栓塞

C. 大动脉炎

D. 血栓闭塞性脉管炎

E. 动脉硬化性闭塞症

34. 泌尿外科患者的护理中, 尤为重要的是( )

A. 记出入量

B. 保持床单位整洁

C. 鼓励多饮水

D. 保持尿液引流通畅

E. 及时更换被浸湿的敷料

35. 下列哪项不是膀胱镜检查的禁忌证( )

A. 膀胱容量小于 50ml

B. 膀胱肿瘤早期

C. 全身感染严重

D. 尿路急性炎症

E. 尿道狭窄

36. 骨折、脱位共有的特殊体征是( )

- A. 弹性固定  
B. 异常活动  
C. 骨擦音  
D. 畸形  
E. 关节部位空虚
37. 开放性骨折最重要的治疗措施是( )  
A. 早期彻底清创  
B. 早期使用抗生素  
C. 及时使用 TAT  
D. 及时复位固定  
E. 镇静止痛
38. 下列哪项不是骨折的专有体征( )  
A. 功能障碍  
B. 创伤处畸形  
C. 假关节活动  
D. 骨擦音  
E. 骨擦感
39. 妊娠后心血管系统发生变化不会出现的是( )  
A. 心搏出量增加  
B. 心率加快  
C. 大血管扭曲  
D. 心尖部可闻舒张期杂音  
E. 膈肌上抬, 心脏变位
40. 新生儿出生时呼吸频率约为( )  
A. 10~20 次/分  
B. 20~30 次/分  
C. 30~40 次/分  
D. 40~60 次/分  
E. 60~70 次/分
41. 患者, 女性, 34 岁, 停经 3 个月, 腹痛, 阴道规则出血 2 周, 今日阴道流出水泡状物。查体: 子宫如孕 4 个月大, 正确的诊断是( )  
A. 异位妊娠  
B. 不全流产  
C. 葡萄胎  
D. 侵蚀性葡萄胎  
E. 子宫肌瘤
42. 患者, 男性, 35 岁, 患有风湿热 8 年, 常有扁桃体炎发生, 经医生诊断为慢性风湿性瓣膜病、二尖瓣狭窄, 二尖瓣狭窄最早出现的症状是( )  
A. 消化道症状  
B. 咯血  
C. 劳力性呼吸困难  
D. 肝区疼痛  
E. 全身水肿
43. 患者, 女性, 46 岁, 诊断为“上消化道出血”收住院, 为明确出血病因, 首选的检查方法是( )  
A. 大便隐血试验  
B. X 线检查  
C. 内镜检查  
D. 血常规检查  
E. B 超检查
44. 患者, 女性, 足月产后 4 天, 出现下腹痛, 体温不高, 恶露多, 有臭味, 子宫底脐上一指, 子宫体软。考虑其最可能的病理是( )  
A. 腹膜炎  
B. 阴道炎

C. 盆腔结缔组织炎

D. 急性输卵管炎

E. 子宫内膜炎

45. 患儿女, 6 个月, 被医生诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病初期, 此患儿主要症状是( )

A. 颅骨软化

B. 肋骨串珠

C. 肌肉松弛

D. 佝偻病

E. 神经精神症状

46. 患者, 男性, 34 岁, 既往体健, 2h 前在提重物后突然剧烈头痛, 伴喷射状呕吐, 呼吸减慢, 心率减慢, 血压升高, 这种现象是( )

A. 急性颅脑感染

B. 脑神经受刺激

C. 牵涉性头痛

D. 颅内压增高

E. 神经官能症

47. 患者, 女性, 70 岁, 慢性支气管炎, 有长期吸烟史, 2 周前因感冒导致急性加重, 护士对其进行健康指导, 正确的是( )

A. 绝对卧床休息

B. 制订戒烟目标和计划

C. 预防性服用少量抗生素

D. 控制液体入量

E. 尽量控制咳嗽

48. 患儿, 2 岁, 消瘦, 哭闹时青紫, 平静后青紫消失, 查体: 胸骨左缘 2~3 肋间可闻及收缩期杂音, 肺动脉瓣区第二心音亢进, 并固定分裂。该患儿最可能的诊断是( )

A. 室间隔缺损

B. 房间隔缺损

C. 动脉导管未闭

D. 法洛四联症

E. 主动脉狭窄

49. 患者, 女性, 70 岁, 突感胸骨后疼痛, 窒息濒死感, 伴恶心、呕吐及出冷汗, 含服硝酸甘油疼痛不缓解。最可能的诊断为( )

A. 急性胰腺炎

B. 心绞痛

C. 主动脉狭窄

D. 急性心肌梗死

E. 心肌炎

50. 新生儿, 日龄 7d, 孕 30 周出生。出生体重 1500g, 转入 NICU 监护。今日无明显诱因出现颜面及全身皮肤发绀, SpO<sub>2</sub> 由 95% 降至 82%, 心率 96 次/分, 呼吸不规则, 两次呼吸间隙停止时间为 22s。护士考虑患儿可能出现的情况是( )

A. 呼吸暂停

B. 新生儿呼吸窘迫综合征

C. 缺血缺氧性脑病

D. 吸入性肺炎

E. 急性肺炎

51. 婴儿佝偻病的主要病因是( )

A. 饮食中缺钙

B. 甲状旁腺激素缺乏

C. 缺乏维生素 D

D. 缺乏维生素 A

E. 食物中钙、磷比例不当

52. 新生儿排出胎便的正常时间是( )
- A. 12h 内  
B. 18h 内  
C. 24h 内  
D. 36h 内  
E. 48h 内
53. 新生儿期是指( )
- A. 自出生脐带结扎开始至生后 28 天内  
B. 自受孕至生后脐带结扎  
C. 自受孕 28 周开始至生后 28 天  
D. 自出生脐带结扎开始至生后 7 天  
E. 自出生脐带结扎开始至生后满 1 个月
54. 孙先生, 40 岁, 因寒战高热, 咳嗽, 胸痛, 来院急诊, 胸透右上肺有云絮状阴影, 查痰肺炎球菌(+), 该病人血象如何( )
- A. 嗜酸性粒细胞增加  
B. 淋巴细胞增加  
C. 中性粒细胞增加  
D. 大单核细胞增加  
E. 嗜碱性粒细胞增加
55. 郑女士, 38 岁, 已确诊糖尿病, 昨天下午突然昏睡, 送医院经尿化验认为是糖尿病酮症酸中毒, 请问尿验应有何显示( )
- A. 尿蛋白(+)  
B. 尿白细胞增加  
C. 尿糖(+)  
D. 尿酮体(+++)  
E. 尿红细胞增多
56. 病人腹壁静脉曲张, 脐以上的腹壁静脉血流方向由下向上, 脐以下亦由下向上。可能性最大的原因是( )
- A. 门静脉高压  
B. 上腔静脉回流受阻  
C. 下腔静脉回流受阻  
D. 大量腹水  
E. 脾肿大
57. 某病人心前区较饱满。体查: 有奇脉, 颈静脉怒张, 肝颈静脉回流征阳性。应考患为( )
- A. 先天性心脏病  
B. 右心功能不全  
C. 左心功能不全  
D. 心包积液  
E. 纵隔肿瘤
58. 根据患者的心电图结果, 患者出现了下图哪种心率失常( )
- A. 窦性心动过速  
B. 窦性心率不齐  
C. 期前收缩  
D. 心房颤动  
E. 心室颤动
59. 王女士, 25 岁, 因被车撞伤, 病人烦躁不安, 脉快, 收缩压正常、脉压小, 面色苍白, 出冷汗考虑是( )
- A. 疼痛引起  
B. 休克早期  
C. 休克期

D. 休克晚期

E. 精神紧张引起

60. 患者, 女性, 33 岁。2 个月来出现外阴瘙痒, 检查见外阴充血、肿胀, 阴道分泌物无异常。评估诱因时, 应重点询问( )

A. 饮食习惯

B. 卫生习惯

C. 睡眠习惯

D. 活动习惯

E. 教育情况

61. 一婴儿扶腋下能站立, 两手能各握一玩具, 能喃喃地发出单音节, 能伸手取物。根据这些表现, 该婴儿的最可能的月龄为( )

A. 4 个月

B. 5 个月

C. 7 个月

D. 9 个月

E. 10 个月

62. 患者, 女性, 66 岁。因颅内压增高, 头痛逐渐加重, 行腰椎穿刺脑脊液检查。术后突然停止呼吸, 血压下降。该患者最可能发生了( )

A. 小脑幕切迹疝

B. 枕骨大孔疝

C. 脑栓塞

D. 脑干缺血

E. 心肌梗死

63. 经产妇, 4 天前顺产一健康新生儿, 该产妇出现下述哪项临床表现时, 护士应立即报告医生( )

A. 口腔温度为 36.5℃

B. 脉率为 109 次/分

C. 汗液分泌增多

D. 排尿次数频繁

E. 呼吸为 22 次/分

64. 肺结核的化疗原则不包括( )

A. 早期

B. 规律

C. 全程

D. 足量

E. 联合

65. 患者, 男性, 70 岁。诊断为肝性脑病入院。患者目前处于昏迷状态, 下列护理措施错误的是( )

A. 给予舒适体位

B. 使用床挡防止坠床

C. 口腔护理预防口腔感染

D. 大量利尿

E. 定时翻身防止压疮

66. 患者, 女性, 45 岁, 确诊为胃溃疡活动期, 其最可能的腹痛特点是( )

A. 夜间腹痛明显

B. 空腹时腹痛明显

C. 餐后 0.5~1h 腹痛明显

D. 餐后即刻腹痛明显

E. 进餐时腹痛明显

67. 患者, 男性, 35 岁, 从事园林工作, 不慎造成中毒来院就诊, 护士应提醒患者在喷洒农药时特别要注意的防护措施是( )

A. 戴好防护用具



- B. 穿长腿裤, 戴护目镜
- C. 穿长袖上衣
- D. 穿质厚的长袖上衣及长裤
- E. 戴好口罩、手套
68. 患儿男, 5 岁, 出生后 2 个月发现心脏杂音, 确诊室间隔缺损, 近日来, 患儿无诱因出现青紫、不喜动、乏力、呼吸急促, 考虑该患儿可能出现( )
- A. 艾森门格综合征
- B. 法洛三联症
- C. 呼吸衰竭
- D. 差异性青紫
- E. 心力衰竭
69. 患者, 女性, 24 岁, 因重度甲状腺功能亢进入院, 准备择期手术治疗, 术前准备期间, 病人因害怕手术而焦虑不安, 该病人目前主要的护理问题是( )
- A. 不舒适
- B. 焦虑
- C. 自我形象紊乱
- D. 有皮肤完整性受损的危险
- E. 营养失调: 低于机体需要量
70. 患者, 男性, 30 岁。诊断再生障碍性贫血。血常规显示红细胞  $3.0 \times 10^{12}/L$ , 血红蛋白  $60g/L$ , 白细胞  $2.8 \times 10^9/L$ , 血小板  $80 \times 10^9/L$ , 该病人最大的危险是( )
- A. 心力衰竭
- B. 失血过多
- C. 继发感染
- D. 牙龈出血
- E. 颅内出血
71. 患者, 男性, 50 岁。患“幽门管溃疡”2 个月, 现原有疼痛节律消失, 出现餐后上腹部饱胀, 频繁呕吐宿食, 最可能的并发症为( )
- A. 穿孔
- B. 癌变
- C. 出血
- D. 幽门梗阻
- E. 慢性胃肠炎.
72. 根据患者的心电图结果, 患者出现了哪种心率失常( )
- A. 窦性心动过速
- B. 窦性心率不齐
- C. 期前收缩
- D. 心房颤动
- E. 心室颤动
73. 患者, 女性, 65 岁, 反复发作呼气性呼吸困难 5 年, 引起呼气性呼吸困难最常见的病因是( )
- A. 支气管异物
- B. 肺栓塞
- C. 肺动脉高压
- D. 哮喘
- E. 小支气管痉挛
74. 患者, 男性, 50 岁, 突然剧烈头痛伴呕吐, 迅即昏迷, 检查为血性脑脊液, 首先考虑( )
- A. 脑血栓形成

B. 脑出血

C. 高血压脑病

D. 脑栓塞

E. 蛛网膜下腔出血

75. 患儿女, 9 岁, 因风湿热入院, 目前使用青霉素和阿司匹林治疗。近日该患儿出现食欲下降、恶心等胃肠道不适, 护士可以给予的正确指导是( )

A. 饭后服用阿司匹林

B. 暂时停用阿司匹林

C. 暂时停用青霉素

D. 两餐间注射青霉素

E. 阿司匹林与维生素 C 同服

76. 患者, 女性, 43 岁。饱餐饮酒后出现上腹部持续性剧痛并向左肩、腰背部放射, 伴恶心、呕吐 7h, 拟诊为急性胰腺炎, 为明确诊断最重要的检查是( )

A. 血沉

B. 腹腔穿刺

C. 胰腺 B 超

D. 血清淀粉酶

E. X 线胸腹联合透视

77. 某产妇, 27 岁, 产后 4 个月, 母乳喂养, 产妇要求对避孕方式进行指导, 最适宜的避孕方法是( )

A. 长效口服避孕药

B. 短效口服避孕药

C. 安全期避孕

D. 避孕套

E. 探亲避孕药

78. 患者, 女性, 45 岁。患急性胰腺炎入院。经非手术治疗病情好转准备出院。下列患者的陈述中, 提示患者对自身保健原则理解有误的是( )

A. “我每天饭量要减少, 分四五次吃”

B. “我要少吃油腻的食物”

C. “每天一杯红酒有助于我康复”

D. “我的饮食节律必须规律, 食物以蔬菜为主”

E. “我应当检查一下, 有胆道的疾病要尽早治疗”

79. 图示肌内注射定位法不适合的人群是( )

A. 青少年

B. 孕妇

C. 老年人

D. 慢性肾衰竭成年男性

E. 8 个月大婴儿

80. 患者, 女性, 70 岁。身体虚弱, 中暑后入院治疗, 以下何种措施对患者预后决定作用( )

A. 脱离高温环境

B. 补充水、电解质

C. 快速降温

D. 平卧位

E. 保持呼吸道通畅

81. 患者, 男性, 65 岁, 因回肠瘘需行腹腔灌

洗及负压引流。病人在一次灌洗(等渗盐水)过程中突发心悸、畏寒、面色苍白,此时护理人员应( )

- A. 立即停止灌洗
- B. 改等渗盐水为高渗盐水
- C. 减慢灌洗速度
- D. 尽量将灌洗液抽出
- E. 快速将灌洗液注入完后嘱病人平卧

## 二、A3/A4 型选择题(83~120 题)

### 答题说明

以下提供若干个案例,每个案例有若干个考题。请根据提供的信息,在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(83~85 题共用题干)

母亲带 1 岁男孩来院体检,经检查该小儿体格发育正常。

83. 测得头围应约是( )

- A. 38cm
- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 50cm

84. 身高应约为( )

- A. 46cm
- B. 49cm
- C. 55cm
- D. 60cm
- E. 75cm

85. 其体重约可达( )

82. 患者,女性,30 岁。右胸外伤后发生肋骨骨折入院,患者极度呼吸困难,发绀,右胸壁可见反常呼吸运动,首要的急救措施是( )

- A. 加压给氧
- B. 气管插管
- C. 剖胸探查
- D. 固定胸壁
- E. 气管切开

A. 6~7kg

B. 7~8kg

C. 9~10kg

D. 13~14kg

E. 15~16kg

(86~90 题共用题干)

一男性,24 岁,劳动中突然发生剧烈头痛,呕吐和意识不清。体检:浅昏迷,血压 120/80mmHg,体温 37℃,颈抵抗,颈胸距 4 横指,克尼格(Kernig)征阳性。右上眼睑轻度下垂,右眼球外展位,右侧瞳孔 4mm、光反应迟钝,左侧瞳孔 2mm、光反应灵敏。左肢体活动差,左侧巴宾斯基征阳性。诊断为蛛网膜下腔出血。

86. 深昏迷区别于浅昏迷的最有价值的特点

是( )

- A. 无任何自主运动
- B. 全身反射消失
- C. 不能被唤醒
- D. 大小便失禁
- E. 肌肉松弛

87. 病人有颈抵抗, 表示病人存在( )

- A. 浅反射异常
- B. 深反射异常
- C. 病理反射
- D. 颈项强直
- E. 以上都不是

88. 克尼格征阳性, 表示病人存在( )

- A. 浅反射异常
- B. 深反射异常
- C. 病理反射
- D. 脑膜刺激征
- E. 以上都不是

89. 双侧瞳孔不等大提示( )

- A. 视神经病
- B. 阿托品中毒
- C. 昏睡
- D. 颅内出血
- E. 青光眼

90. 巴宾斯基征阳性的表现是( )

- A. 腹壁肌立即收缩
- B. 股四头肌收缩, 小腿伸展角以内出现抵抗或疼痛
- C. 病人仰卧位, 一侧髋关节屈成直角, 小腿抬高

D. 足部拇指背伸, 其余趾呈扇形展开

E. 病人俯卧位, 下肢自然伸直, 托起病人头部前屈时, 病人两下肢发生不自主的屈曲

(91~94 题共用题干)

一位 45 岁已婚妇女, 有糖尿病史, 近日发现外阴痒, 白带多, 检查: 白带黏稠, 典型豆腐渣样, 阴道壁充血, 宫颈光滑。

91. 可能诊断为( )

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 霉菌性阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 宫颈糜烂
- E. 非特异性阴道炎

92. 为确定诊断, 进一步应检查( )

- A. 双合诊
- B. 尿常规
- C. 阴道窥器检查
- D. 阴道分泌物悬滴检查
- E. 宫颈黏液检查

93. 如镜检有假菌丝, 首选药物( )

- A. 广谱抗生素
- B. 制霉菌素
- C. 灭滴灵
- D. 曲古霉
- E. 乙烯雌酚

94. 局部用哪种溶液冲洗最好( )

- A. 1%乳酸
- B. 2%~4%碳酸氢钠
- C. 0.2%新洁尔灭

D. 1:5000 高锰酸钾

E. 生理盐水

(95~97 共用题干)

患者, 男性, 60 岁, 散步时突然头痛、眩晕, 伴呕吐、步态不稳。查体: 血压 180/105mmHg (24/14kPa), 心率 62 次/分, 双眼向右眼震, 右侧指鼻欠稳准, 右侧巴氏征阳性。

95. 患者最可能患有的疾病是( )

- A. 脑桥出血
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 小脑出血
- D. 大脑中动脉出血
- E. 脑血栓形成

96. 为明确诊断, 应给予的进一步检查是( )

- A. 脑血管造影
- B. 脑电图
- C. 头颅 CT
- D. 脑脊液检查
- E. 肝功能、肾功能检查

97. 处理措施不正确的是( )

- A. 使用利血平降血压
- B. 必要时行气管切开, 保持气道通畅
- C. 20%甘露醇 250ml 快速静脉滴注, 每 6~8h 一次
- D. 立即卧床休息
- E. 持续心电监测, 密切观察意识状态的变化

(98~99 题共用题干)

患者, 女性, 25 岁, 学生。晨运后感左侧胸闷、胀痛, 气促出冷汗。查体: 神清, 面色苍白, 唇发绀, 呼吸 30 次/分, 左上肺扣诊呈鼓音, 呼吸音消失, 心率 110 次/分, 律齐。

98. 该患者最可能的诊断是( )

- A. 心绞痛
- B. 自发性气胸
- C. 肺炎
- D. 肋骨骨折
- E. 肋间神经痛

99. 为明确诊断, 最佳辅助检查是( )

- A. 血常规
- B. 胸部 CT
- C. 胸部 X 线
- D. ECG
- E. 血气分析

(100~101 共用题干)

患者, 女性, 60 岁, 主诉反复上腹疼痛, 空腹时疼痛明显, 进餐后可缓解, 夜间上腹痛明显, 排黑便 3 天, 急诊入院。

100. 分诊护士判断患者最有可能是发生了( )

- A. 胃溃疡出血
- B. 十二指肠溃疡病出血
- C. 消化道出血
- D. 胃炎出血
- E. 肝硬化出血

101. 分诊护士认为患者的出血量最少为( )

- A. 20 ml

- B. 60 ml
- C. 120 ml
- D. 150 ml
- E. 250 ml

(102~103 共用题干)

患者,女性,24岁,患唇痈10天,红肿明显。一天前出血昏迷、高热,眼结膜充血、水肿,眼球突出。

102. 患者感染的致病菌可能是( )

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 结核杆菌
- D. 白色假丝酵母菌
- E. 拟杆菌

103. 患者唇痈的并发症是( )

- A. 脓毒症
- B. 高热昏迷
- C. 海绵状静脉窦炎
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑膜炎

(104~108 题共用题干)

某产妇,妊娠38周,产前合并有轻度妊娠高血压疾病,产后阴道持续出血,胎儿娩出后24h出血量达550ml时,检查子宫软,按摩后子宫变硬,阴道流血减少,该产妇诊断为产后出血。

104. 造成该产妇产后出血的最可能原因是( )

- A. 子宫收缩乏力
- B. 胎盘残留
- C. 软产道裂伤
- D. 凝血功能障碍
- E. 胎膜残留

105. 该产妇给药首选( )

- A. 麦角新碱
- B. 硫酸镁
- C. 酚磺乙胺
- D. 维生素K
- E. 缩宫素

106. 用药时注意观察的是( )

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 尿量
- D. 膝腱反射
- E. 宫底高度

107. 若产妇次日又出血约200ml时,下列措施中不是必须实施的是( )

- A. 按摩子宫
- B. 应用宫缩剂
- C. 输血
- D. 刮宫
- E. 应用抗生素

108. 该产妇最不可能出现的护理问题是( )

- A. 有组织灌注量改变的危险
- B. 有感染的危险
- C. 有受伤的危险
- D. 皮肤完整性受损
- E. 疲乏

(109~111 题共用题干)

患者,女性,40岁,外伤后出现呼吸困难、发绀、冷汗。体检:心率120次/分,血压70/45mmHg,气管向左偏移,颈部广泛皮下气肿,右侧胸廓饱满,扣诊鼓音,右肺呼吸音消失。

109. 最可能的诊断是( )

- A. 血气胸
- B. 肺挫裂伤
- C. 肋骨骨折
- D. 张力性气胸
- E. 创伤性窒息

110. 此时,首选的治疗措施是( )

- A. 气管切开
- B. 剖胸探查
- C. 胸腔穿刺抽气减压
- D. 补液、输血抗休克
- E. 镇静、止痛

111. 若对该病人实施胸腔闭式引流,以排气为主要目的的胸腔引流管安放的位置是( )

- A. 锁骨中线第2肋间
- B. 锁骨中线第3肋间
- C. 锁骨中线第4肋间
- D. 腋中线第5、6肋间
- E. 腋中线第7、8肋间

(112~114 题共用题干)

患儿,8个月,母乳喂养,未加辅食。近1个月来,面色苍白,烦躁易怒,舌面光滑,有轻微

震颤,肝肋下3.6cm。血常规:Hb90g/L, RBC

1.9\*10<sup>12</sup>/L,血清维生素B<sub>12</sub>降低。

112. 该患儿可能的诊断是( )

- A. 营养性巨幼细胞贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 溶血性贫血

113. 该患儿最适宜的治疗是给予( )

- A. 输红细胞
- B. 铁剂和维生素C
- C. 维生素B<sub>12</sub>和叶酸
- D. 补叶酸
- E. 补铁剂

114. 护士向患儿家长介绍预防本病的重点是( )

- A. 按时补充维生素D和补钙
- B. 多晒太阳
- C. 按时添加辅食
- D. 纠正不良饮食习惯
- E. 注意休息

(115~117 题共用题干)

患者,女性,49岁,右上腹胀痛2个月伴黄疸4周。体检:肝肋下3cm,剑突下4cm,质硬,移动性浊音(+).B超:肝内有一占位性病变。

115. 最可能的诊断为( )

- A. 慢性肝炎
- B. 肝癌
- C. 肝硬化

D. 胆总管结石

E. 细菌性肝脓肿

116. 最有助于诊断的检查是( )

A. CT 检查

B. 肝功能检查

C. 乙肝五项检查

D. 腹部 X 线检查

E. 甲胎蛋白和 B 超检查

117. 病人接受介入治疗前, 以下护理措施错误的是( )

A. 纠正低蛋白血症

B. 穿刺处皮肤准备

C. 术前禁食 12h

D. 备好所需物品及药品

E. 了解出凝血时间、血象、肝肾功能、心电图等检查结果

(118~120 题共用题干)

患儿女, 9 岁, 水肿, 尿少, 肉眼血尿 4 天。

BP134/98mmHg, 眼睑及下肢水肿。尿常规: 尿蛋白(++), 红细胞满视野/高倍镜。

118. 考虑此患儿是( )

A. 急性肾小球肾炎

B. 慢性肾小球肾炎

C. 肾盂性肾病

D. 单纯性肾病

E. 肾病综合征

119. 经治疗病情好转, 能恢复上学但需避免上体育课的指标是( )

A. 无水肿

B. 尿常规

C. Addis 计数

D. 血沉正常

E. 血压正常

120. 经治疗病情好转, 能恢复正常生活的指标是( )

A. 血沉

B. 无水肿

C. 尿常规

D. 血压正常

E. Addis 计数



# 全国护士执业资格考试

## 内部模拟卷（一）

### 参考答案及解析

#### 专业实务

1. C 【解析】上消化道疾病、全身性疾病均可引起上消化道出血,临床上最常见的病因是消化道溃疡。(C对)
2. D 【解析】诱发和加重心力衰竭的因素;①感染,是最常见和最主要的诱因,特别是呼吸道感染。②生理或心理压力过大。③循环血量增加或锐减。④心率失常。⑤治疗不当。⑥妊娠或分娩。(D对)
3. E 【解析】发生急性左心衰竭时给予患者坐位,两腿下垂,减少回心血量,减轻心脏负担。(E对)
4. D 【解析】急性肺水肿时给予患者高流量酒精湿化持续给氧,可降低肺泡内泡沫的表面张力,缓解患者肺通气换气障碍。(D对)
5. A 【解析】左心功能不全即左心衰竭主要表现为肺循环淤血,最早出现的劳力性呼吸困难,经休息后缓解,最典型的是阵发性夜间呼吸困难。(A对)
6. D 【解析】心源性水肿是右心衰竭的体征,心源性水肿早期在身体的下垂部位和组织疏松部位,出现凹陷性水肿。重者可出现全身水肿,并伴有胸腔积液、腹水和阴囊水肿。(D对)
7. B 【解析】肝失代偿期对雌激素的灭活减少。可导致血中雌激素增加,出现蜘蛛痣。(B对)
8. B 【解析】治疗军团菌肺炎首选大环内酯类或氯喹诺酮类,四环素类、利福平等也有效。氨基糖苷类及青霉素、头孢菌素类抗生素对本病无效。红霉素属于大环内酯类抗生素,庆大霉素是一种氨基糖苷类抗生素,林可霉素属抑菌剂。(B对)
9. B 【解析】咯血患者呕出的血误入气管易导致窒息,所以咯血患者的关键护理措施是保持呼吸道通畅,预防窒息。(B对)
10. E 【解析】胸腔闭式引流护理要点:①保持管道的密闭和无菌,使用前注意引流装置是否密封;胸壁伤口引流管周围,用油纱布包盖严密;更换引流瓶时,必须先双重夹闭引流管,以防空气进入胸膜腔。严格执行无菌操作规程,防止感染。②体位:胸腔闭式引流术后,常置病人于半卧位,以利呼吸和引流。鼓励病人进行有效咳嗽和深呼吸运动,利于积液排出,恢复胸膜腔负压,使肺扩张。③维持引流通畅,闭式引流主要靠重力引流,水封瓶液面应低于引流管胸

腔出口平面 60cm。任何情况下引流瓶不应高于病人胸腔,以免引流液逆流入胸膜腔造成感染。定时挤压引流管,30~60min 一次,以免管口被血凝块堵塞。拔管指征:48~72h 后,引流量明显减少且颜色变淡,24h 引流液小于 50ml,脓液小于 10ml,X 线胸片示肺膨胀良好、无漏气,病人无呼吸困难即可拔管。(E 错,本题选 E)

11. C 【解析】上午 7 时至下午 7 时用蓝墨水笔记录,下午 7 时至次晨 7 时用红色水笔记录。sos 是需要时(限用一次,12h 内有效),po 的意思是口服,患者昨天晚上睡眠良好,所以不需要用。(C 对)

12. E 【解析】鼻饲液的温度为 38~40℃。(E 对)

13. D 【解析】脑死亡的标准是:①不可逆的深度昏迷。②自主呼吸停止。③脑干反射消失。④脑电波消失。(D 对)

14. B 【解析】静脉输液时,茂菲氏滴管内的液面自行下降,应检查滴管各接头部位是否松动,上端输液管和滴管内有无漏气或裂隙,必要时更换输液器。(B 对)

15. B 【解析】胆囊造影饮食方法:检查前一天晚餐进高脂肪饮食,可刺激胆囊收缩和排空,有助于造影剂进入胆囊。晚餐进食无脂肪、低蛋白、高碳水化合物的清淡饮食,晚餐后口服造影剂,禁食、戒烟至次日上午摄 X 线片。检查当日早餐禁食,第一次摄片后如胆囊显影良好,可进食脂肪餐,30min 后再次摄片观察。(B 对)

16. D 【解析】无菌技术操作原则:定期检查无菌物品的保存情况,在未被污染的情况下,有效期为 7 天,一旦过期或受潮应重新灭菌:为方便操作,操作者应在操作前将手表等用物摘下来:无菌物品一经取出,不可放回无菌容器内;操作者不得跨越无菌区,手臂始终保持在腰部以上。(D 对)

17. A 【解析】法洛四联症由四种畸形组成:肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥厚,其中以肺动脉狭窄为重要畸形。(A 对)

18. C 【解析】室性心动过速这最常见于器质性心脏病病人,如冠心病。(C 对)

19. D 【解析】青紫型为先天性心脏病最严重的一组,因心脏结构的异常,静脉血流入右心后不能全部流入肺循环达到氧合,直接进入体循环,出现持续性青紫。常见于法洛四联症。(D 对)

20. E 【解析】期前收缩是指由于窦房结以外的异位起搏点兴奋性增高,过早发出冲动引起的心脏搏动,也称早搏,是临床上最常见的心律失常。(E 对)

21. A 【解析】心力衰竭是指心脏当时不能博出同静脉回流及身体组织代谢所需相称的血液供应,所以心力衰竭病人不能摄入太多水,以免加重心脏负担。(A 对)

22. E 【解析】心脏瓣膜相当于门卫,阻止血液回流于刚刚离开的心室。在心房与心室之间,在心室与离开心室的血管之间,都有瓣膜。血液流过后,瓣膜就会合上。(E对)
23. A 【解析】房室瓣包括二尖瓣(位于左心室和左心房之间)、三尖瓣(位于右心室和右心房之间)。半月瓣:包括肺动脉瓣(位于右心室出口)、主动脉瓣(位于左心室出口)。(A对)
24. D 【解析】心脏传导系统包括窦房结、结间束、房室结、希氏束、左右束支及其分支和普肯耶纤维。主要电生理功能有自律性、兴奋性、传导性和不应性,保持心脏正常节律的跳动和心房收缩与心室收缩的协调性。传导系统由特化的心肌纤维(自律心肌纤维)组成,窦房结和房室结由短而细的特化心肌纤维组成,小于一般心肌。房室束和束支系统由粗大的普肯耶纤维并列而成。总的来说,纤维从窦房结向下至普肯耶纤维在逐渐变粗,而核与浆的比例变小。自律性逐渐变低,传导性逐渐增快。心脏的传导性是从窦房结发起,所以窦房结的自律性最高。(D对)
25. E 【解析】心力衰竭的病人常有水肿,水肿主要积集身体低垂部位,而患者又长期卧床,最容易发生压疮的部位为腰骶部,所以进行皮肤护理的重点部位是腰骶部。(E对)
26. B 【解析】阿-斯综合征最突出的表现为突然晕厥,轻者只有眩晕、意识障碍,重者意识完全丧失,常伴有抽搐及大小便失禁、面色苍白,进而青紫,可有鼾声及喘息性呼吸,有时可见陈施呼吸。(B对)
27. D 【解析】发生低血糖时应立即进食,可立即进食糖果或含糖饮料、含糖高的饼干等。(D对)
28. A 【解析】丹毒是一种累及真皮浅层淋巴管的感染,主要致病菌为A组β溶血性链球菌。丹毒常以寒战、发热起病,可有全身不适、恶心及呕吐等症状,继而局部出现与正常皮肤分界清楚的水肿性红斑,表面紧张发亮,并向周围迅速扩展,触之有热感,压痛明显,有时皮损表面可出现大小不一的水疱,急性期局部禁做热敷,热敷导致血流加快,加速病菌扩散,丹毒患者应注意休息,避免过度劳累,并适当隔离。如病在下肢,则应卧床,抬高患肢。药物治疗以青霉素为首选,口服或静脉滴注。对青霉素过敏者可口服红霉素或磺胺类药物。局部可外涂20%~30%鱼石脂软膏,或用50%硫酸镁湿敷。(A错,本题选A)
29. C 【解析】护理程序分为五个步骤,即护理评估、护理诊断、护理计划、实施、评价。(C错,本题选C)
30. B 【解析】浓度过高、滴速过快均可致使患者的血钾过高,抑制心脏甚至使心脏停搏而死亡,护理人员在应用钾盐滴注时,必须掌握氯化钾药的用法及浓度。静脉滴注的液体中,钾的浓度不可超过0.3%,如5%葡萄糖溶液500ml中最多只能加入10%的KCl 15ml。禁止直接静

脉注射。24h补钾总量成人一般为6g。要严格控制输液速度,成人静脉滴速不要超过60滴/min,不可过快,滴注速度以每小时滴入氯化钾不超过1g为宜,最快也必须控制在1.5g以内,及20mmol/h否则可能引起心脏停搏。(B对)

31. C 【解析】高钾时会抑制心肌,静脉注射10%葡萄糖酸钙,钙离子会与钾离子竞争心肌上受体,解除高钾对心肌的抑制。(C对)

32. D 【解析】常见的营养不良包括蛋白质能量营养不良及微量养分营养不良。营养不良可阻碍成长,导致智力和各种认知能力降低、交际能力降低、领导和果断能力降低、活力和能量降低、肌肉成长和力量的降低,以及更加恶劣的健康问题等。营养不良I度体重减低15%~25%,腹部皮褶厚度为0.8~0.4cm;II度体重减低25%~40%,腹部皮褶厚度<0.4cm;III度体重减低>40%,腹部皮褶消失。血浆白蛋白小于30g/L和血浆转铁蛋白小于200mmol/L都属于蛋白质能量营养不良,只有D不属于。(D错,本题选D)

33. A 【解析】严重的挤压伤是土方、石块的压埋伤,常引起身体一系列的病理改变,甚至引起肾功能衰竭,称为“挤压综合征”,挤压综合征临床上主要表现为以肢体肿胀、肌红蛋白尿、高血钾为特点的急性肾功能衰竭。(A对)

34. C 【解析】休克病人应采用中凹卧位,头与躯干抬高10~15°,下肢抬高20~30°,头胸部抬高,利于保持呼吸道通畅,改善缺氧,下肢抬高,利于静脉回流,增加心排血量,缓解休克症状。(C对)

35. B 【解析】破伤风肌肉持续性收缩,最初是咀嚼肌,以后顺序是脸面、颈项、背、腹、四肢、最后是膈肌、肋间肌。起初表现为咀嚼不便、张口困难,随后牙关紧闭,面肌痉挛可出现蹙眉、口角下缩、咧嘴苦笑,多数病人常因肌痉挛发作或强直性抽搐而呈现角弓反张、喉头痉挛、呼吸困难,甚至因此而窒息死亡。(B对)

36. E 【解析】疔是单个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染。致病菌多为金黄色葡萄球菌。易感因素包括长期携带金黄色葡萄球菌、糖尿病、肥胖、不良的卫生习惯以及免疫缺陷状态等。痈由金黄色葡萄球菌感染引起的多个临近毛囊及其周围组织的急性化脓性感染。常发生于抵抗力低下者,如糖尿病、肥胖、不良卫生习惯以及免疫缺陷状态等。好发颈部、背部、肩部,临床表现为大片浸润性紫红斑,可见化脓、组织坏死。本病伴有发热、畏寒、头痛、食欲不振等全身症状,严重者可继发毒血症、败血症导致死亡。疔是单个毛囊的感染形成的脓肿,痈是多个相近毛囊的感染形成的脓肿,所以痈与疔的主要鉴别点是创面有无多个脓肿。(E对)

37. C 【解析】外科手术消毒范围一般以中心向四周扩散,周围至少15cm以内的皮肤消毒,

目的是杀灭切口及周围皮肤上的病原微生物,建立相对足够大的无菌区,以利于手术的安全性。(C对)

38. B 【解析】心肺复苏的顺序:胸外按压-开放气道-人工呼吸。(B对)

39. A 【解析】防止术后肺部不张:①术前锻炼深呼吸和适当活动:②有吸烟嗜好者,术前2周停止吸烟,以减少气道内分泌物:③术前积极治疗原有的支气管炎或慢性肺部感染:④全麻手术拔管前吸净支气管内分泌物,术后取头侧位平卧,防止窒息:⑤鼓励患者深呼吸咳嗽、体位排痰或给予药物化痰。本题A项错,术前应适当运动。(A错、本题选A)

40. D 【解析】烧伤的严重程度取决于受伤组织的范围和深度,烧伤深度可分为I度、II度和III度。(D对)

41. A 【解析】护理道德中的义务,是指护士自觉自愿地履行防病治病、救死扶伤,维护人们健康的道德责任,并不需要去监督患者权利实现。(A错,本题选A)

42. B 【解析】申请护士执业注册的学历证书应具备的条件是:在中等职业学校、高等学校完成国务院教育主管部门和国务院卫生主管部门规定的普通全日制3年以上的护理、助产专业课程学习,包括在教学、综合医院完成8个月以上护理临床实习,并取得相应学历证书。(B对)

43. D 【解析】护士申请延期注册的时间应为有效期届满前30天。(D对)

44. E 【解析】危重患者,护士面对时不应开心。(D错,本题选D)

45. B 【解析】《献血法》第十五条规定:为保障公民临床急救用血的需要,国家提倡并指导择期手术的患者自身储血,动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血。为保证应急用血,医疗机构可临时采集血液,但应当依照本法规定,确保采血用血安全。(B对)

46. E 【解析】护士要保护患者的隐私。(E错,本题选E)

47. B 【解析】昏睡:意识清晰度水平较高识模糊更低,环境意识及自我意识均丧失,患者处于熟睡状态,不易唤醒,刺激可被唤醒,醒后答非所问,停止刺激后即进入熟睡状态,昏睡不等于昏迷。嗜睡:最轻度的意识障碍。病人处于持续的睡眠状态,但能被言语和轻受刺激唤醒。醒后能正确、简单而缓慢的回答问题,但反应迟纯,刺激去除后又很快入睡。意识模糊:程度较嗜睡深,表现为思维和语言不连贯,对时间、地点、人物的定向力完全或部分发生障碍,可有错觉和幻觉,躁动不安、言语或精神错乱,所以该患者为嗜睡。(B对)

48. E 【解析】使用氧时,应先调节氧流量,再插管应用:停用氧时,应先拔管,再关氧气开关:中途改变氧流量时,应先将氧气管与吸氧管分开,调节好氧流量后再接上。(E对)

49. D 【解析】该患者肾移植术后,为大手术术后,并且有尿毒症,需要严密监护生命体征,所

以应为特级护理。(D对)

要点	内容
特级护理	①病情危重,随时可能发生病情变化需 要进行抢救的患者 ②重症监护患者 ③各种复杂或者大手术后的患者 ④严重创伤或大面积烧伤的患者 ⑤使用呼吸机辅助呼吸,并需要严密监 护病情的患者 ⑥实施连续性肾脏替代治疗(CRRT),并需要严密监护生命体征的患者 ⑦其他有生命危险,需要严密监护生命体征的患者
一级护理	①病情趋向稳定的重症患者 ②手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者 ③生活完全不能自理且病情不稳定的患者 ④生活部分自理,病情随时可能发生变化的患者
二级护理	①病情稳定,仍需卧床的患者 ②生活部分自理的患者
三级护理	①生活完全自理且病情稳定的患者 ②生活完全自理且处于康复期的患者

50. E 【解析】临床死亡期以脑死亡作为判断死亡的标准,脑死亡的判断标准:①不可逆的深度昏迷。②自发呼吸停止。③脑干反射消失。④脑电波平直。(E对)

51. B 【解析】促进乳汁分泌的方法:①乳房刺激:婴儿吸吮;早开奶,乳房按摩等;②哺乳期妈妈营养要合理,哺乳期妈妈的膳食营养除满足自身需要外,还应满足的泌乳的营养素消耗的需要:③避免不良情绪对乳汁的影响:哺乳期妈妈惊恐、愤怒、悲伤、忧虑、焦急和疲劳等精神因素都能使乳汁分泌大受影响,甚至可引起宝宝消化不良。乳母心情愉快、生活平和、轻松自如,有充足所休息和适量的运动,有利乳汁分泌。(B错,本题选B)

52. A 【解析】①最先进入骨盆入口的胎儿部分称为胎先露。②胎产式是胎体纵轴与母体纵轴的关系,两纵轴平行者为纵产式,两纵轴垂直者为横产式,两纵轴交叉呈角度为斜产式。③

胎方位是观察胎儿先露的指示点在骨盆前后左右的位置。胎方位有两种产式,两长轴相平行的,是直产式;两长轴相垂直的,称为横产式。④衔接是指胎头双顶径进入骨盆入口平面,胎头颅骨最低点接近或者达到坐骨棘水平。⑤入盆是指在妊娠晚期,胎儿以头朝下、臀朝上、全身蜷缩的姿势,使其头部通过母体的骨盆入口进入骨盆腔(A对)。

53. D 【解析】早产是指妊娠满 28 周至不满 37 周之间的分娩者。过期妊娠是指妊娠达到或超过 42 周尚未分娩者。(D 对)

54. B 【解析】胎产式是胎体纵轴与母体纵轴的关系,两纵轴平行者为纵产式,两纵轴垂直者为横产式,两纵轴交叉呈角度为斜产式,肩左前为肩先露,是常见的横产式。(B 对)

55. A 【解析】孕激素的生理作用:①使子宫平滑肌松弛,活动能力降低,降低妊娠子宫对催产素的敏感性,有利于受精卵在宫腔内生长发育;②使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜,为受精卵着床作好准备;③使宫颈口闭合,黏液减少、变稠,拉丝度减少;④促进输卵管节律性收缩;⑤使阴道上皮细胞脱落加快;⑥在已有雌激素影响的基础上,促进乳腺腺泡发育;⑦孕激素通过对下丘脑的负反馈作用,影响脑垂体促性腺激素的分泌;⑧孕激素通过中枢神经系统有升温作用,正常妇女在排卵后基础体温可升高  $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ,这种基础体温的改变,可作为排卵的重要指标,即排卵前基础体温低,排卵后由于孕激素作用基础体温升高;⑨孕激素能促进水与钠的排泄。B、C、D、E 项是雌激素的生理功能。(A 对)

56. D 【解析】月经是月经周期第 1~4 天。在内膜功能层即在基底层以上的部分,厚  $5\sim 6\text{mm}$  形成的散在小血肿,将使坏死的内膜剥脱,随血液排出,称之为月经。内膜的基底层随即开始增生,形成新的内膜。故月经期实际上是一个周期的结束,也是下一周期的开始。(D 对)

57. C 【解析】冷疗法中湿冷法效果比干冷法好,乙醇擦浴是一种全身冷疗法,乙醇可使血管扩张,促进散热,是最有效的物理降温方式。(C 对)

58. B 【解析】控制排尿的是膀胱逼尿肌,与骨盆底无关,其他选项均与骨盆底有关。(B 对)

59. E 【解析】在女性子宫左右两侧的输卵管和卵巢统称为“子宫附件”,简称“附件”。而其中输卵管又分为输卵管狭部、输卵管壶腹部、输卵管伞部。(E 对)

60. E 【解析】护理程序包括护理评估、护理计划、护理诊断、护理措施、护理评价。(E 错,本题选 E)

61. C 【解析】①弛张热:体温持续在  $39^{\circ}\text{C}$  以上,波动幅度大,24h 内体温波动范围超过  $2^{\circ}\text{C}$ ,但都在正常水平以上。②稽留热:体温持续在  $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ ,达数天或数周,24h 波动范围不超过  $1^{\circ}\text{C}$ 。③间歇热:体温骤升可达  $39^{\circ}\text{C}$  以上,持续数小时,又迅速降至正常水平或正常以下,间隔数小时至数天又如此反复发作④不规则热:发热时体温波动的范围极不规则,持续时

间也不一定,体温曲线毫无规律。体温常在 38℃左右或波动于 37~40℃之间。(C 对)

62. E 【解析】心前区剧烈疼痛是心肌梗死最早出现和最突出的症状,其性质和部位与心绞痛相似,但程度更为剧烈,疼痛可持续数小时或数天,经休息和含服硝酸甘油无效。(E 对)

63. C 【解析】护患关系模式有三种:①共同参与型:护患关系中的共同参与型多用于具有一定文化知识水平的慢性疾病病人,对自身疾病有所了解,知道诊断、治疗的意义,能参与治疗护理措施的讨论,共同作出决定。②主动-被动型:这种护理模式,病人无法表达意见,不能表达自己的愿望,病人的积极性调动不出来。所以,对于这类全依赖型的病人,护士要加强责任心,勤巡视。但目前一般来说,不提倡采用这种模式。③指导-合作型:护患双方在护理活动中都应当是主动的,其中以执行护士的意志为基础,但病人可以向护士提供有关自己疾病的信息,同时也可提出要求和意见。目前,提倡采用这种模式,适用于清醒的、病情较严重的病人。(C 对)

64. B 【解析】该患者疑似胃溃疡并发急性穿孔,最重要的护理措施是禁食、胃肠减压,胃肠减压可吸出胃肠道内容物和气体,减少胃肠内积气及减少胃酸及胰液等消化液分泌。(B 对)

65. A 【解析】患者既往有慢性阻塞性肺气肿疾病史,因剧烈咳嗽使得肺组织及脏层胸膜突然自发破裂,或因靠近肺表面的肺大泡,细小气泡自发破裂,肺以及支气管内气体进入胸膜腔导致自发性气胸。(A 对)

66. A 【解析】抗-HBs 为保护性抗体,阳性表示对乙肝病毒有免疫力。(A 对)

乙肝五项对照表:

中文名字	英文名字	单项阳性的意义
乙肝表面抗原	HBsAg	阳性表示感染了乙肝病毒。并不反映病毒有无复制、复制程度、传染性强弱
乙肝表面抗体	HBsAb (抗-HBs)	阳性表示对乙肝病毒的感染具有保护性免疫作用 乙肝疫苗接种者,若仅此项阳性,应视为乙肝疫苗接种后正常现象
乙肝 e 抗原	HBeAg	阳性说明传染性极强,持续阳性 3 个月以上则有慢性化倾



		向
乙肝 e 抗体	HBeAb (抗-HBe)	阳性说明病毒复制减少, 传染性弱, 但并非没有传染性
乙肝核心抗体	HBeAb (抗-HBc)	阳性说明既往感染过乙肝病毒

67. B 【解析】①妊娠期高血压: 孕妇在未孕前或妊娠 20 周前, 血压(即基础血压)不高, 而至妊娠 20 周后血压开始升高至 140/90mmHg, 或收缩压超过原基础血压 30mmHg, 舒张压超过原基础血压 15mmHg。②中度妊高征: 血压 >150/100mmHg, 但不超过 160/110mmHg; 尿蛋白(+) 表明 24h 尿液中蛋白量 >0.5g; 无自觉症状或有轻度头晕。③重度妊高征: 为病情进一步发展。血压高达 160/110mmHg 或更高; 24h 尿液中蛋白量 >0.5g; 可有不同程度的水肿; 并有一系列自觉症状出现。此阶段可分为先兆子痫和子痫。该患者为重度妊高症, 应使用 25% 硫酸镁预防和控制子痫发作。(B 对)

68. A 【解析】会阴侧切后外阴水肿患者应保持外阴清洁、干燥, 不适合坐浴。(A 错, 本题选 A)

69. D 【解析】该产妇产后出血较多, 子宫软, 按摩后子宫变硬, 出血减少, 应考虑子宫收缩乏力。(D 对)

70. D 【解析】护理计划应优先解决直接危及生命的问题: 气体交换受损。(D 对)

71. E 【解析】该患者近 1 周停用胰岛素治疗, 出现乏力 3 天, 昏迷 4h, 有可能发生了糖尿病酮症酸中毒, 所以应立即抽血查血糖、血酮体。(E 对)

72. B 【解析】中心静脉压过高可反映心功能不全或回流量过多(如输液过快)超过心脏负担能力。中心静脉压过低则反映血容量不足或回流障碍。中心静脉压高, 血压低: 心功能不全或血容量相对过多; 中心静脉压高, 血压正常: 容量血管过度收缩; 中心静脉压正常, 血压低: 心功能不全或血容量不足; 中心静脉压低, 血压正常: 血容量不足; 中心静脉压低, 血压低: 血容量严重不足。中心静脉压正常值为 6~12cmH<sub>2</sub>O, 该患者中心静脉压 20cmH<sub>2</sub>O, 血压 80/50mmHg, 为中心静脉压高, 血压低, 说明心功能不全或血容量相对过多。(B 对)

73. C 【解析】肺小细胞肺癌的治疗以化疗为主, 可以联合或序贯以放疗, 对于不到 5% 的仅限于肺实质内的早期患者考虑手术治疗。局限期以同步放化疗或化疗、放疗序贯治疗为主, 同步放化疗优于序贯治疗。(C 对)

74. C 【解析】中国九分法对成人体表面积的估计,头颈为 9%(1 个 9%)、双上肢为 18%(2 个 9%)、躯干(含会阴 1%)为 27%(3 个 9%)、双下肢(含臀)为 46%(5 个 9%+1%), 共为 11 个 9%+1%。广烧伤四度五分法 I 度烧伤:局部干燥、疼痛、微肿而红,无水泡。II 度烧伤:①浅 I 度烧伤:局部红肿明显,有大小不一的水疱形成,内含淡黄色澄清液体或含有蛋白凝固的胶状物。将水痘剪破并掀开后,可见红润而潮湿的创面,质地较软,疼痛敏感。②深 II 度烧伤:局部肿胀,有水疱,将坏死表皮去除后,创面微湿、微红或白中透红、红白相间,质较韧,痛觉迟钝,温度降低,并可见粟粒大小的红色小点,或细小血管网,伤后 1-2 天更明显。III 度烧伤:又称焦痂性烧伤。局部苍白、无水疱,痛觉消失、发凉。质韧似皮革。该患者头面、颈部烧伤,为 9%,有水疱,部分水疱破损,创面基底苍白,有疼痛为深 II 度烧伤,所以该患者为 9%深 II 度。(C 对)
75. B 【解析】疖是单个毛囊的急性化脓性感染。疔是多个相邻的毛囊及其周围组织的急性化脓性感染,或由多个疖融合而成,疔是一片稍隆起的紫红色浸润区,界限不清,病人多伴有全身症状,包括寒战、发热、食欲不佳等,周围血白细胞比例增高,蜂窝织炎界限分明。(B 对)
76. E 【解析】疫苗接种的异常反应:晕针、瘙痒:皮疹、血管神经性水肿、过敏性休克等。过敏性休克:于注射免疫制剂后数秒钟或数分钟内发生。表现为烦躁不安、面色苍白、口周青紫、四肢湿冷、呼吸困难、脉细速、恶心呕吐、惊厥、大小便失禁以至昏迷。(E 对)
77. C 【解析】正常新生儿初生体重平均为 3kg。由于哺乳量的不足、不显性失水、排尿及排出胎便,出生后 3-4 天内有生理性体重下降,下降原有体重 3%~9%,至 7~10 天体重逐渐恢复至出生时的体重。出生后前 3 个月每月增长 700~800g,4~6 个月每月增长 500~600g,后半年(7~12 个月)每月增长 300~400g。一般在 3 个月时体重可达出生时的 2 倍(约 6kg),1 岁时达 3 倍(约 9kg),2 岁时达 4 倍(约 12kg),2 岁后到 12 岁前(青春期前)平均每年约增长 2kg。为了便于临床应用,可按以下公式粗略估计小儿体重:①<6 个月:体重(kg)=出生时体重+月龄\*0.7;②7~12 个月:体重(kg)=6+月龄\*0.25;③2~12 岁:体重(kg)=年龄(岁)\*2+8。5 个月体重(kg)=出生时体重+月龄\*0.7=3.5+5\*0.7=7。(C 对)
78. A 【解析】急、慢性胃炎患者有少量出血时,给予牛奶、米汤中和胃酸,有利于黏膜的修复(A 对)
79. B 【解析】急救时若有休克出现,应先处理休克,以抢救生命。(B 对)
80. B 【解析】该患者是脉搏短绌:即在同一单位时间内脉率少于心率。测量时应由两位护士同时进行,一人听心率,另一人测脉率。由始者发出“始”“停”的口令,计数 1min,记录方式心率/脉率/min, (B 对)

81. B 【解析】血小板减少患者进行护理操作时应注意动作轻柔,避免损伤黏膜,引起出血。(B对)
82. D 【解析】小儿4个月时应逐渐添加辅食;辅食以碎食物为主,如软饭、挂面、面包等供给热能,补充维生素、蛋白质、矿物质及纤维素,如辅食未及时添加,造成摄入不足,将导致营养性缺铁性贫血,该患儿9个月还一直奶粉喂养,未添加辅食,所以导致该患儿缺铁的主要原因是铁的摄入不足。(D对)
83. C 【解析】婴儿出生后7~12个月体重=6(kg)+月龄\*0.25=6+0.25\*8=8(C对)
84. A 【解析】乙肝疫苗接种时间为出生后24h内、1个月、6个月。(A对)
85. D 【解析】①医疗差错是指在诊疗护理过程中,医务人员确有过失,但经及时纠正未给病人造成严重后果或未造成任何后果的医疗纠纷。②过失犯罪是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见但轻信能够避免的心理态度。综合对比本题选D。(D对)
86. C 【解析】回血良好,局部无红肿说明针仍在血管内,患者由于输注氯化钾,且氯化钾对血管的刺激性比较强,输液速度太快可能会造成输液肢体疼痛,应减慢输液速度。(C对)
87. A 【解析】卡介苗预防接种时间一般为出生后的2~3天,现应立即补种。(A对)
88. D 【解析】患者处于抑郁期,应允许其发泄情绪,护士应耐心倾听并给予安抚。(D对)
89. D 【解析】中凹卧位为休克卧位,可以保证胸腔腹腔重要脏器的血液供应,促进血液回流。(D对)
90. D 【解析】晚期产后出血主要保守治疗,患者保持平卧位,针对出血原因,迅速给予止血;补充血容量,纠正失血性休克;防止感染。(D错,本题选D)
91. D 【解析】应遵医嘱使用抗生素,不可滥用抗生素以免形成耐药。(D错,本题选D)
92. A 【解析】慢性支气管炎缓解期应以增强体质,提高抗病能力和预防复发为主,缓解期要作适当的体育锻炼,以提高机体的免疫力和心、肺的贮备能力(A对)。
93. B 【解析】(1)等渗性缺水:水和钠成比例丧失。(2)低渗性缺水:水和钠同时缺失,但失钠多于缺水,血清钠低于正常范围,细胞外液成低渗状态。(3)高渗性缺水:水和钠同时丢失,但缺水更多,血清钠高于正常范围,细胞外液的渗透压升高。①轻度脱水:失水量占体重的2%~4%或体重减轻5%仅有一般的神经功能症状,如头痛、头晕无力,皮肤弹性稍有降低。高渗性脱水有口渴。②中度脱水:失水量占体重的4%~6%或体重减轻5%~10%,眼窝凹陷,皮肤弹性差,眼泪少,并开始出现循环功能不全的症征。③重度脱水:失水量占体重的6%以上或体重减轻10%以上前述症征加重,甚至出现休克、昏迷。该患者极度口渴为高渗性脱水,眼窝凹陷,

唇、舌干燥,皮肤弹性差,为中度脱水症。(B对)

94. C 【解析】高渗性脱水:饮水或输注 5%葡萄糖溶液为主,低渗性脱水轻者以等渗盐水,中度或重者需要补充高渗盐水,等渗性脱水一般以等渗盐水或 5%葡萄糖溶液各半交替输入。(C对)

95. E 【解析】见尿补钾原则是:每小时尿量大于 40ml/L,尿少就补充钾会造成人为高钾血症。(E对)

96. A 【解析】按照世界卫生组织和联合国儿童基金会的新规定,产后 30min 内尽可能给宝宝开奶,新生儿与妈咪同室同床,以便以不定时、不定量的哺乳原则按需喂。养,使宝宝得到最珍贵的初乳。根据题意可知该新生儿为足月儿,足月儿在产后 30min 开乳。早产儿出生体重在 1.5kg 以上而无青紫的患儿,可于出生后 2~4 小时喂 10%葡萄糖水 2ml/kg,无呕吐者,可在 6~8 小时喂乳。出生体重在 1.5kg 以下或伴有青紫者,可适当延迟喂养时间。(A对)

97. B 【解析】最好的喂奶姿势是坐位,因为坐位可以方便喂奶,可以避免应婴儿食道下端收缩能力弱出现奶液回流导致窒息。(B对)

98. B 【解析】婴儿的胃呈水平位置,胃容量小,而且食道下端收缩能力弱,婴儿喝完奶后应予以右侧卧位,可以避免婴儿溢奶。(B对)

99. E 【解析】石膏固定后应注意观察肢体远端颜色、温度、感觉和运动,观察被固定肢体的血供情况。(E对)

100. D 【解析】废用性骨质疏松长期缺乏负重及肌肉活动等刺激,可使骨钙严重丢失,所以要经常活动肢体,预防失用性骨质疏松。(D对)

101. C 【解析】结核分枝杆菌主要通过呼吸道传播,排菌的患者为重要传染源,需进行呼吸道隔离。(C对)

102. B 【解析】该疾病通过呼吸道传播,护士在病房均需戴口罩。(B错,本题选 B)

103. B 【解析】孕妇宫缩乏力,易引起产后大出血,胎儿窘迫甚至胎死宫内,此时应静脉滴注缩宫素。(B对)

104. D 【解析】孕妇胎膜已破,宫口开大 8cm,胎儿枕左前位,体重约 2800g,应选择自然分娩。(D对)

105. A 【解析】80% 婴幼儿腹泻由轮状病毒引起,结合患儿的临床表现,可知致病菌是轮状病毒。(A对)

106. E 【解析】轻度脱水时尿量稍减少,中度脱水时尿量明显减少,重度脱水时患者尿量极少或无尿,该患儿 4 小时无尿,为重度脱水。(E对)

107. B 【解析】患儿脱水后大量补液,可能发生了低钙血症导致惊厥。(B对)
108. E 【解析】老年性阴道炎白带多为淡黄色,假丝酵母菌阴道炎白带为白色豆腐渣样白带,滴虫阴道炎稀薄泡沫样白带,慢性宫颈炎多为血性白带。(E对)
109. C 【解析】假丝酵母菌生长环境为酸性,故应用 2%~4%碳酸氢钠液冲洗。(C对)
110. E 【解析】外阴阴道假丝酵母病治疗要点:消除诱因,改变阴道酸碱度,再选氯康唑栓剂、制霉菌素栓剂放入阴道内。(E对)
111. A 【解析】破伤风会导致肌肉持续性收缩,如发生呼吸肌痉挛,会造成呼吸停止,病人窒息死亡。(A对)
112. B 【解析】破伤风要避免声、光的刺激,鼻饲流质饮食不属于控制痉挛的护理措施。(B错,本题选B)
113. A 【解析】有机磷或吗啡类中毒均会导致瞳孔缩小,双侧瞳孔缩小常见于有机磷农药、吗啡、氯丙嗪等药物中毒。双侧瞳孔扩大常见于颅内压增高、颅脑损伤、颠茄类中毒等。(A对)
114. E 【解析】插胃管时胃管插入长度大约为 45~55cm,测量方法为前额发际至剑突或由鼻尖经耳垂至剑突的距离。(E对)
115. C 【解析】毒物不明确时,应首先抽取胃内容物送检,再用生理盐水洗胃。(C对)
116. B 【解析】急救药品“五定”:定数量品种,定点放置,定专人管理,定期消毒、灭菌,定期检查维修。(B错,本题选B)
117. A 【解析】急救物品的合格率要达到 100%。(A对)
118. D 【解析】患者诊断为肺炎球菌肺炎,首选用青霉素治疗。(D对)
119. B 【解析】肺炎久治不愈可引发休克型肺炎,休克型肺炎会出现休克体征。因此,应注意监测血压变化。(B对)
120. B 【解析】硝酸甘油主要作用是扩张血管,降压作用,感染性休克时患者血压低,无需用到降压药。(B错,本题选B)

## 实践能力

1. A 【解析】呼吸衰竭最早因缺氧发生损害的器官为大脑,出现精神、神经症状,轻度表现为注意力不集中,智力及定向力障碍,缺氧加重可出现烦躁、恍惚甚至昏迷。(A对)
2. B 【解析】二尖瓣面容的特点是两颊部紫红,口唇轻度发绀。(B对)
3. C 【解析】新生儿的正常生理状态:①生理性体重下降:一般不超过10%。生后10天左右,恢复到出生时体重。②生理性黄疸:大部分婴儿生后2~3天即出现黄疸,5~7天最重,10~14天消退。③乳腺增大:因孕酮和催乳素经胎盘至胎儿体内,生后这些激素影响突然中断所致,多于2~3周消退。④假月经:部分女婴儿生后5~7天可出现阴道流出少量的血液,持续1~3天后停止。⑤螳螂嘴:婴儿在4~6周,牙龈黏膜上常有微凸的乳白色或黄白色小斑点,类似牙齿组织。臀红是因为婴儿的尿液及大便刺激臀部,未及时更换尿布所致。(C错,本题选C)
4. A 【解析】急性黄疸型肝炎:黄疸前期有非特异的前驱症状,与短暂的病毒血症相应的低热,关节酸痛,同时有不适、疲乏,突出症状是食欲不振、恶心呕吐。(A对)
5. D 【解析】患者不可自行停药或增减药物用量,应遵医嘱用药。(D错,本题选D)
6. C 【解析】新生儿硬肿症:硬肿呈对称性,最先出现硬肿的部位是小腿,依次为大腿外侧、臀部、面颊、上肢、全身,严重时肢体僵硬,不能活动。(C对)
7. B 【解析】门静脉高压使脾脏因长期淤血而肿大,因脾对白细胞、红细胞等有灭活,所以晚期脾大常出现白细胞、红细胞、血小板计数等全血细胞减少,称为脾功能亢进。(B对)
8. C 【解析】80%的强迫症在25岁以前发病,男性比女性多。强迫症已成为15~44岁中青年人群中造成疾病负担最重的20种疾病之一。(C对)
9. B 【解析】典型心绞痛的疼痛为胸前阵发性、压榨性疼痛,可伴有其他症状,疼痛主要位于胸骨中段或上段,可放射至心前区与左上肢。(B对)
10. E 【解析】急性心肌梗死治疗要点:抗凝,止痛,心肌再灌注,心力衰竭和休克的治疗,治疗心律失常。(E错,本题选E)
11. D 【解析】慢性肝炎与肝硬化时,均有血生化检查血清总蛋白可正常、降低或增高,但白蛋白与球蛋白比例倒置,白蛋白降低,球蛋白增高,特征性改变均为白蛋白与球蛋白比例倒置。(D对)
12. C 【解析】血红蛋白正常参考值成人男性:120~160g/L;成人女性:110~150g/L;新生儿:170~200g/L;儿童:110~160g/L。(C对)
13. E 【解析】镜下脓尿,指离心沉淀后的尿液每高倍视野中平均见到5个以上的白细胞。(E

对)

14. C 【解析】缺铁性贫血时网织红细胞计数多正常或轻度增高;出血性贫血所产生的贫血是正常红细胞性的,出血后几天,可出现再生迹象(网织红细胞增多);再生障碍性贫血时常伴网织红细胞减少,多数再障是正细胞正色素性贫血,少部分可见大红细胞以及红细胞不均一性;溶血性贫血时红系代偿性增生,循环红细胞减少,可引起骨髓红系代偿性增生。此时外周血网织红细胞比例增加;营养性巨幼红细胞性贫血时,骨髓呈增生活跃,红系细胞增生明显,各系细胞均有巨幼变,以红系细胞最为显著。(C对)

15. A 【解析】尿蛋白定量标本瓶内应加防腐剂甲苯 5ml,保持尿液化学成分不变,防腐(A对);甲醛可固定尿液中有机成分,每 30ml 尿液中加 40%甲醛 1 滴;浓盐酸防止尿液中激素被氧化,防腐 24h 尿液中加 5~10ml。(A对)

16. D 【解析】酚红排泄试验:某些物质可经肾小管分泌排出体外,如对氨基马尿酸和酚红等,测定对这些物质的最大清除率用以衡量肾小管的分泌功能,临床常用酚红排泄试验来检查肾小管的排泄功能。尿常规检查主要是通过尿液分析仪和显微镜人工镜检来进行分析检测的。尿常规对于泌尿系统以及糖尿病的筛查具有重大意义。尿液浓缩稀释试验主要反映肾小管排泄功能。内生肌酐清除率检查测定单位时间内肾脏将若干毫升血中的内生肌酐全部清除出去的情况,可用于判断肾小球滤过功能的敏感指标,因此 D 正确。1h 尿细胞排泄率检查主要反应肾小管排泄功能。(D对)

17. D 【解析】脓血样便分别常见于痔疮、细菌性痢疾等。果酱样便常见于阿米巴痢疾。柏油样便常见于胃出血等上消化道出血,因此 D 正确,白陶土样便见于梗阻性黄疸。(D对)

18. D 【解析】冠心病由于脂质代谢不正常,血液中的脂质沉着在原本光滑的动脉内膜上,在动脉内膜一些类似粥样的脂类物质堆积而成白色斑块,称为动脉粥样硬化病变。这些斑块渐渐增多造成动脉腔狭窄,使血流受阻,导致心脏缺血,产生心绞痛。如果动脉壁上的斑块形成溃疡或破裂,就会形成血栓,使整个血管血流完全中断,发生急性心肌梗死,甚至猝死。冠心病的危险因素有:年龄和性别(45 岁以上的男性,55 岁以上或者绝经后的女性)、家族史(父兄在 55 岁以前,母亲/姐妹在 65 岁前死于心脏病)血脂异常(低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C 过高、高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C 过低)(D对)、高血压、糖尿病、吸烟、超重、肥胖、痛风、不运动等。(D对)

19. E 【解析】体液包括血液、脑脊液、胃液及各种消化液、精液、唾液、泪液、汗液、尿液、阴道分泌液等。体液可分为两大部分:细胞内液和细胞外液,成人体液总量占体重 60%,其中细胞内液占体重 40%(A对),细胞外液占体重 20%(B对)。细胞外液血浆占体重 5%,其余

15%为组织间液(C对),血浆约为体重的5%(D对)。各部位体液之间处于动态平衡,其内的水与电解质也处于动态平衡,这种平衡状态,很容易受外界或机体内因素的影响,导致破坏,出现代谢紊乱,即水电解质平衡紊乱和酸碱平衡紊乱。(E错,本题选E)

20. C 【解析】脑复苏脱水以渗透性利尿为主,快速利尿药(如速尿)为辅,20%甘露醇最常选用,0.5~1.0g/kg静滴,每天4~6次,必要时加用速尿20~40mg。脱水治疗应持续5~7天。(C对)

21. D 【解析】尿路结石主要表现为疼痛和血尿,肾盂内的大结石及肾盂结石可无明显的临床症状,仅表现为活动后镜下血尿。(D对)

22. B 【解析】颈静脉怒张和颈静脉征是右心衰竭的主要体征,肝颈静脉回流征也是其特征性表现。(B对)

23. C 【解析】慢性阻塞性肺气肿多由慢性支气管炎发展而来。(C对)

24. C 【解析】绒毛癌最常见的转移部位是肺,脑转移是其死亡的主要原因。(C对)

25. E 【解析】肝性脑病前驱期临床表现:轻度性格改变和行为改变。(E对)

26. A 【解析】支气管扩张的患者表现,为长期咳嗽和大量浓痰,痰量与体位有关,常在晨起和夜间卧床时,由于体位改变致气管内痰液不易流出而加重。(A对)

27. A 【解析】典型的腹外疝是由疝环、疝囊、疝内容物和疝外被盖组成,疝内容物是进入疝囊的腹内脏器或组织,以小肠最为多见。(A对)

28. A 【解析】急性胆囊炎诊断明确后治疗首选胆囊切除术,手术时机为缓解期,如出现胆囊穿孔,应立即做好紧急手术的准备。(A对)

29. C 【解析】支气管扩张大咯血患者应保持呼吸道通畅,避免血液吸入引起窒息,禁止屏气。(C对)

30. C 【解析】早期产后出血为胎儿娩出后24h内阴道出血量超过500ml,晚期产后出血是指分娩24h后,在产褥期内发生的子宫大量出血,出血量超过500ml。(C对)

31. C 【解析】B型超声检查常作为胆道结石、肿瘤、囊性病变诊断的首选方法,①诊断胆道结石:诊断胆囊结石的准确率可达90%以上,B超对受检者无痛苦、无损伤、无放射性。②探测易受消化道气体干扰的深部器官时,需空腹检查或作严格的肠道准备。如腹腔的肝、胆、胰的探测,3日前最好禁食牛奶、豆制品、糖类等易于发酵产气食物,检查前1天晚吃清淡饮食,当天需空腹禁食、禁水(C错)。③病人如同时要作胃肠、胆道X线造影时,超声波检查应在X线造影前进行,或在造影3天后进行。(C错,本题选C)

32. C 【解析】胆总管结石是指位于胆总管内的结石,胆石所致的胆道阻塞通常是不完全和非



持续性的,完全性阻塞少见,故约20%患者可以不感右上腹绞痛,40%的患者虽有绞痛但无黄疸其余患者则多数在腹痛发生后数小时至1~2天开始有黄疸,且持续数天后即可逐渐消退。胰头癌最常见的临床表现为腹痛、黄疸消瘦。因胰、胆管梗阻,管腔内压增高所致的上腹部疼痛和饱胀不适以及消化道症状。癌肿压迫或侵犯胆总管所致的黄疸,且呈进行性加重,伴有皮肤瘙痒,脉搏缓慢,有出血倾向。胰头癌的黄疸为进行性加重,胆总管结石的黄疸是逐渐消退。(C对)

33. D 【解析】患者右下肢反复发作静脉炎,并有间歇性跛行,为血栓闭塞性脉管炎,间歇性跛行是血栓闭塞性脉管炎的特征性表现。(D)

34. D 【解析】泌尿外科的患者主要是有泌尿疾病,所以要重点关注尿液,保持尿液引流通畅。(D对)

35. B 【解析】膀胱镜检查禁忌证:①尿道、膀胱处于急性炎症期不宜进行检查,因可导致炎症扩散,而且膀胱的急性炎症充血,还可使病变分辨不清。(C、D对)②膀胱容量过小,在60ml以下者,说明病变严重,病人多不能耐受这一检查,也容易导致膀胱破裂。(A对)③包茎、尿道狭窄、尿道内结石嵌顿等,无法插入膀胱镜者。(E对)④骨关节畸形不能采取截石体位者。⑤妇女月经期或妊娠3个月以上。⑥肾功能严重减退而有尿毒症征象、高血压而且心脏功能不佳者。膀胱肿瘤早期肿瘤还未很大可以进行膀胱检查。(B错,本题选B)

36. D 【解析】骨折的特殊体征是畸形、反常活动、骨擦音;关节脱位时关节疼痛与肿胀、畸形、弹性固定及关节窝空虚。所以骨折、脱位共有的特殊体征是畸形。(D对)

37. A 【解析】骨折时,合并有覆盖骨折部位的皮肤及皮下软组织损伤破裂,使骨折断端和外界相通者,称为开放性骨折,清创是治疗开放性骨折的基础,彻底清创是预防感染的关键。对污染的新鲜开放性骨折,在细菌繁殖和侵入组织的潜伏期内(伤后6~8h)施行清创术,彻底清除被感染的创面、失活的组织和异物,清洗干净后将创口闭合,可以避免发生感染。(A对)

38. A 【解析】骨折的特有体征①畸形:骨折段移位可使患肢外形发生改变,主要表现为短缩、成角或旋转。②异常活动:正常情况下肢体不能活动的部位,骨折后出现不正常的活动。③骨擦音或骨擦感:骨折后,两骨折端相互摩擦时,可产生骨擦音或骨擦感。假关节活动又可称为异常活动或反常活动。(A对)

39. D 【解析】孕妇的总循环血量比正常人多,一般于妊娠6周起血容量逐渐增加,至孕32~34周达高峰,心搏出量约自妊娠10周开始增加,至孕32~34周达高峰(A对);妊娠时由于每搏输出量加大,心脏负担重,故心肌可有轻度肥大。妊娠后期横膈被抬高,心脏被向上向左推移,心浊音界的左缘比正常略大(B对),由于血流量增加,血流加速及心脏移位使大血管轻度扭

曲(C对)。由于心搏加强,血流加速,肺动脉瓣区和心尖部可听到吹风样收缩期杂音(D错),产后即消失。(D错,本题选D)

40. D 【解析】正常新生儿正常的呼吸频率比成人快,静息状态下每分钟可达40~60次。(D对)

41. C 【解析】葡萄胎亦称水泡状胎块,是指妊娠后滋养细胞增生,绒毛间质水肿,成水泡状,水泡相连成串,形如葡萄而得名,属良性滋养细胞肿瘤,葡萄胎患者的子宫异常增大,变软,摸不到胎体,听不到胎心;可有双侧卵巢囊肿(黄素化囊肿);阴道流血,排出水泡状组织。侵蚀性葡萄胎最主要症状是阴道不规则流血,多数在葡萄胎清除后几个月开始出现,该患者停经后不规则出血,子宫异常增大,并有水泡状物流出,符合葡萄胎的临床表现。(C对)

42. C 【解析】二尖瓣狭窄代偿期无症状或仅有轻微症状,失代偿期最常出现的早期症状是劳力性呼吸困难。(C对)

43. C 【解析】上消化道出血最常用的是内镜检查,消化内镜检查是临床诊断大多数消化道疾病的金标准。(C对)

44. E 【解析】产褥期感染症状,恶露多,有臭味,宫体软,可考虑子宫内膜炎。(E对)

45. D 【解析】佝偻病初期见于6个月以内,特别是3个月以内小婴儿。多为神经兴奋性增高的表现,如易激惹、烦闹、多汗刺激头皮而摇头等。此期常无骨骼病变,骨骼X线可正常,或钙化带稍模糊;血清25-OH-D<sub>3</sub>下降,PTH升高,血钙下降,血磷降低,碱性磷酸酶正常或稍高。(D对)

46. D 【解析】颅内高压表现为两慢一快,呼吸慢。心率慢,血压高,常有呕吐,呕吐为喷射状呕吐,应考虑为颅内压增高。(D对)

47. B 【解析】吸烟是慢性支气管炎的重要因素,患者有长期吸烟,为避免疾病加重患者应戒烟,使用抗生素应遵医嘱用,不可滥用。(B对)

48. B 【解析】房间隔缺损体征:胸骨左缘2、3月间可闻及II~III级收缩期喷射样杂音,肺动脉瓣区第二心音亢进或增强,并固定分裂。室间隔缺损体征:胸骨左缘第3~4肋间闻及3~5/6级粗糙的反流性全收缩期杂音。动脉导管未闭体征:胸骨左缘第2月有响亮的连续性机器样杂音。法洛四联症体征:胸骨左缘2~4肋间有2或3级收缩期喷射样杂音。(B对)

49. D 【解析】疼痛是心肌梗死最早出现和最突出的症状,其性质和部位与心绞痛相似,但程度更为剧烈,疼痛可持续数小时或数天,经休息和含服硝酸甘油无效。(D对)

50. B 【解析】新生儿呼吸暂停是指早产儿呼吸停止超过20s,足月小儿呼吸停止超过15s;或呼吸停止不超过15~20s,但伴有心跳减慢,皮肤青紫或苍白,肌肉张力减,该患者为早产儿,

呼吸暂停超过 20s, 考虑为新生儿呼吸窘迫综合征。(B 对)

51. C 【解析】佝偻病即维生素 D 缺乏性佝偻病是由于婴幼儿、儿童、青少年体内维生素 D 不足, 引起钙、磷代谢紊乱, 产生的一种以骨骼病变为特征的全身、慢性、营养性疾病。主要的特征是生长着的长骨干骺端软骨板和骨组织钙化不全, 维生素 D 不足使成熟骨钙化不全。婴儿佝偻病的主要病因是维生素摄入不足或缺乏光照导致维生素 D 缺乏。(C 对)

52. C 【解析】90% 新生儿生后 24h 内排出胎便, 由肠粘膜脱落上皮细胞、羊水及消化液组成, 呈墨绿色, 3~4 天排完。早产儿由于胎粪形成较少和肠蠕动无力, 胎便排出常延迟。(C 对)

53. A 【解析】胎儿期: 从受精卵形成到小儿出生为止, 共 40 周。新生儿期: 自胎儿娩出脐带结扎时开始至 28 天之前(A 对)。婴儿期: 从出生到 1 周岁之前为婴儿期。是人生生长发育最快的时期。幼儿期: 自 1 岁至满 3 周岁之前为幼儿期, 这个时期智能发育非常迅速, 注意孩子语言的教育。学龄前期: 自 3 周岁到 6~7 岁入学前为学龄前期, 这时智能发育更加迅速, 注意免疫性疾病的发生。自入学到青春期前为学龄期。(A 对)

54. C 【解析】该患者寒战高热, 咳嗽, 胸痛, 胸透右上肺有云絮状阴影, 查痰肺炎球菌(+) 可诊断患者疾病为肺炎球菌肺炎, 肺炎球菌肺炎的外周血象为白细胞计数常增至  $(20\sim 30) \times 10^9/L$ , 中性粒细胞达 80%, 伴核左移及中毒颗粒。(C 对)

55. D 【解析】糖尿病酮症酸中毒是指糖尿病患者在各种诱因的作用下胰岛素不明显增加, 升糖激素不适当升高, 造成糖、蛋白质、脂肪以至于水、电解质、酸碱平衡失调而导致高血糖、高血酮、酮尿脱水、电解质紊乱、代谢性酸中毒等一个症候群。酮症酸中毒时血中的酮体增多, 正常人血酮体不超过  $10\text{mg/dl}$ , 酮症酸中毒时可升高  $50\sim 100$  倍, 超出肾脏的排泄, 尿酮阳性。(D 对)

56. C 【解析】正常时脐水平线以上的腹壁静脉血流自下向上经胸壁静脉和胶静脉而进入上腔静脉, 脐水平以下的腹壁静脉自上向下经大隐静脉而流入下腔静脉。门静脉阻塞有门脉高压时, 腹壁曲张静脉常以脐为中心向四周伸展, 血液经脐静脉(怀孕时的脐静脉于胎儿出生后闭塞而成圆韧带, 此时再通) 脐孔而入腹壁浅静脉流向四方。下腔静脉阻塞时, 曲张的静脉大都分布在腹壁两侧, 肝以下的腹壁浅静脉血流方向也转流向上, 因此 C 正确。上腔静脉阻塞时, 上腹壁或胸壁的浅静脉曲张血流均转流向下。(C 对)

57. D 【解析】心包积液时心包积液积集较慢, 可出现亚急性或慢性心脏填塞, 表现为颈静脉怒张、有奇脉、静脉压升高。该患者心前区较饱满, 有奇脉, 颈静脉怒张, 肝颈静脉回流征阳性应考虑为心包积液。奇脉也是心包积液的典型体征。(D 对)

58. E 【解析】 心室颤动心电图特征 QRS 波群与 T 波完全消失,代之以形态大小不等、频率不规则的颤动波,频率 150~500/分。(E 对)

59. B 【解析】①休克早期:休克刚开始时,人体对血容量减少有一定的代偿能力,这时中枢神经系统的反应是兴奋性提高,患者表现为精神紧张、兴奋或烦躁不安。患者开始出现皮肤苍白、四肢发冷、心跳呼吸加快、尿量减少等症状。如果在休克早期能够及时诊断、治疗,休克很快就会好转,但如果不能及时有效治疗,休克会进一步发展,进入休克期。②休克期:休克没有得到及时治疗,就会进一步发展并超过人体的代偿能力而进入休克期。这时病人出现出冷汗、四肢冰凉、皮肤很明显的苍白、尿少或根本无尿、口唇肢端发青,严重时全身皮肤黏膜都明显发青等症状。神经系统由兴奋转为抑制,表现为表情淡漠、反应迟钝,严重时出现意识模糊、昏迷。该患者烦躁不安,脉快,收缩压正常、脉压小,面色苍白,出冷汗为休克早期的表现。(B 对)

60. B 【解析】 根据题意患者外阴瘙痒,应重点评估卫生习惯。(B 对)

61. B 【解析】 4 个月时能笑出声;5 个月时新生儿能在扶着腋下能站直,两手能各握一玩具,能喃喃地发出单词音节(B 对);7 个月时能发出“爸爸”“妈妈”等复音,但无意识。9 个月时能懂几个较复杂的,如“再见”,10 个月时能开始用单词。(B 对)

62. B 【解析】 患者因颅内压增高行腰推穿刺后出现了脑疝。枕骨大孔疝生命体征改变出现较早,意识障碍出现较晚;小脑幕切迹疝反之。根据患者表现可判断最可能发生了枕骨大孔疝。(B 对)

63. B 【解析】 产后出血主要是在产后 24h 内,所以产后要密切观察生命体征,阴道出血量、子宫收缩等,当孕妇心率加快,呼吸急促,血压下降,体温大于或等于 38℃、阴道流血过多时要及时通知医生,以免发生产后出血,产后汗液分泌增多,排尿次数频繁属正常现象,脉率 109 次/分,稍加快,有可能是产后出血,循环血容量不足,心率代偿性加快,应报告医生。(B 对)

64. D 【解析】 肺结核化疗的原则包括:早期、联合、适量、规律和全程治疗。(D 错,本题选 D)

65. D 【解析】 肝性脑病昏迷者的护理:保持呼吸道通畅,做好病人的口腔护理、皮肤护理,保持床单位整洁,定期翻身,防止感染、压疮,加床档以防坠床,肝性脑病不宜大量利尿,以防加重病情。(D 错,本题选 D)

66. C 【解析】 胃溃疡疼痛的特点是进食-疼痛-缓解,表现为餐后 0.5~1h 腹痛明显,餐后 1~2h 缓解。(C 对)

67. D 【解析】有机磷农药是目前应用最广泛的杀虫剂,有机磷农药可因食入、吸入或经皮肤吸收而中毒,很多在喷洒农药时经常记得戴口罩,而忽视了农药经皮肤吸收,所以喷洒农药时应穿质厚的长袖上衣及长裤,防止农药经皮肤吸收。(D对)

68. A 【解析】严重肺动脉高压的晚期可形成艾森门格综合征,为手术禁忌证。房、室间隔缺损、动脉导管未闭等先天性心脏病,可由原来的左向右分流,由于进行性肺动脉高压发展至器质性肺动脉阻塞性病变,出现右向左分流,皮肤黏膜从无青紫发展至有青紫时,既称为艾森门格综合征。(A对)

69. B 【解析】该患者术前准备期间,因害怕手术而焦虑不安,所以目前主要的护理问题是焦虑。(B对)

70. C 【解析】患者血红蛋白 60g/L,白细胞  $2.8 \times 10^9/L$ ,白细胞低,抵抗力差且贫血,应积极预防继发感染。(C对)

71. D 【解析】患者频繁呕吐宿食,应首先考虑幽门梗阻,幽门梗阻也是幽门管溃疡常见的并发症。(D对)

72. D 【解析】心房颤动心电图特征:窦性P波消失,代之以大小形态及规律不一的f波,频率350~600次/分,QRS波群形态正常。(D对)

73. E 【解析】支气管哮喘为发作性呼气性呼吸困难,气道高反应性,发作时小支气管痉挛,呼气困难。(E对)

74. E 【解析】蛛网膜下腔出血为脑血管突然破裂,血液流至蛛网膜下腔,多为急性起病,头痛与呕吐是本病常见而重要的症状,多数患者在发病后立即出现短暂性意识丧失,常伴有呕吐,呕吐多为喷射性呕吐,系颅内压增高的表现。该案例中患者突然发病,起病急骤,剧烈头痛伴呕吐,临床检查脑脊液为血性,首先考虑蛛网膜下腔出血。(E对)

75. A 【解析】胃肠道症状是阿司匹林最常见的不良反应,较常见的症状有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等。应用阿司匹林时最好饭后服用或与抗酸药同服,溃疡病患者应慎用或不用,应遵医嘱使用药物,不可随意暂停。(A对)

76. D 【解析】血清淀粉酶一般在起病后2~12h开始升高,48h开始下降,持续3~5天。血清淀粉酶超过正常值3倍即可诊断本病。(D对)

77. D 【解析】该孕妇需要母乳喂养,不能吃避孕药避孕,最安全的避孕方法为避孕套避孕,不会影响母乳喂养。(D对)

78. C 【解析】急性胰腺炎患者的健康指导:患者平时应注意规律进食,避免暴饮暴食。腹痛缓解后应从少量低脂、低糖饮食开始,逐渐恢复到正常饮食,应避免刺激强、产气多、高脂

肪和高蛋白食物,戒除烟酒。防止复发。(C错、本题选C)

79. E 【解析】肌内注射时,2岁以下的婴幼儿不宜在臀大肌进行注射。(E对)

80. B 【解析】中暑是以体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丧失过多为特征的疾病,中暑患者最关键是补充水、电解质,补充血容量。(B对)

81. A 【解析】腹腔灌洗过程中患者出现心悸、畏寒、面色苍白时,护士应立即停止腹腔灌洗,及时通知医生进行处理。(A对)

82. D 【解析】患者因外伤致呼吸困难,发绀,右胸壁可见反常呼吸运动,此时应固定胸壁,抑制反常呼吸。(D对)

83. C 【解析】出生时头围平均为33~34cm,1岁时46cm,2岁时48cm,5岁时50cm,15岁时54~58cm(接近成人)。(C对)

84. E 【解析】身高(高)指从头顶到足底的全身长度,是代表骨骼发育的重要指标,新生儿出生时平均50cm;1岁时可达75cm;2岁时可达85cm,2~12岁身高(高)的估算公式:身高(cm)=年龄(岁)\*7+75(cm)。(E对)

85. C 【解析】出生体重平均为3kg,第1个月可增加1~1.5kg;3个月时体重约为出生时的2倍(6kg),1岁时体重约3倍于出生时体重(9kg),2岁时体重约4倍于出生时体重(12kg),2岁以后到12岁前体重稳步增长。(C对)

86. B 【解析】①浅昏迷:随意活动消失,对疼痛刺激有反应,各种生理反射(吞咽、咳嗽、角膜反射、瞳孔对光反应等)存在,体温、脉搏、呼吸多无明显改变,可伴谵妄或躁动。②深昏迷:随意活动完全消失,对各种刺激皆无反应,各种生理反射消失,可有呼吸不规则、血压下降、大小便失禁全身肌肉松弛、去大脑强直等。所以深昏迷区别于浅昏迷的最有价值的特点是全身反射是否消失。(B对)

87. D 【解析】浅反射包括角膜反射、咽反射、腹壁反射、提睾反射、跖反射、肛门反射等。深反射是指刺激骨膜、肌腱引起的反射,是通过深部感受器完成的,如肱二头肌反射、肱三头肌反射等,异常病理反射:巴宾斯基征、查多克征、奥木海姆征等。颈项强直是由于颅后窝处的脑膜受到刺激,进而累及颈髓1~4及相应的颈神经根,使其支配的颈部深层肌肉、斜方肌和胸锁乳突肌过度紧张挛缩所致。多见于各种脑膜炎或脑膜刺激性病变,如蛛网膜下腔出血等。(D对)

88. D 【解析】脑膜刺激征的临床表现为:①头痛常剧烈,是最常见的症状,病程早期即可出现。一般为弥漫性,有时有枕部和额部特别显著。为喷射性。②颈肌强直:颈部肌肉强直对被动运动有抵抗,如被动屈颈则有肌痉挛及疼痛。③克氏征:下肢髋、膝关节屈曲成直角,然后使小

腿伸直,正常可伸直达 $135^{\circ}$ 以上,如遇抵抗,小于 $135^{\circ}$ 并感觉疼痛时为阳性。④布氏征:患者仰卧,被动向前屈颈时,两下肢自动屈曲为阳性,为小脑脑膜刺激征。(D对)

89.D 【解析】双侧瞳孔缩小常见于有机磷农药、吗啡、氯丙嗪等药物中毒;双侧瞳孔扩大常见于颅内高压、颅脑损伤等;双侧瞳孔不等大常见于颅内出血等。(D对)

90.D 【解析】巴宾斯基征又名划跖试验,属于病理反射。病人仰卧,两下肢伸直,嘱其全身放松。检查者用手握住病人踝关节,另用钝物自该侧足底外侧缘由跟部向前轻划皮肤,至小趾根部隆起处再转向内侧,直至跖趾附近。正常时,可引起足趾跖屈。若出现跖趾背屈,其余各趾呈扇形散开,即为巴宾斯基征阳性。(D对)

91.B 【解析】白色豆腐渣样白带是霉菌性阴道炎的典型表现。滴虫性阴道炎主要症状是白带多和外阴瘙痒,白带呈泡沫状。(B)

92.D 【解析】凡疑为带霉菌者,为证实诊断,必须作阴道分泌物检查。可直接取阴道分泌物置玻片上,加一小滴等渗氯化钠溶液或 $10\% \sim 20\%$ 氢氧化钾溶液,加盖玻片,微加热镜检,红、白细胞及上皮细胞立即溶解,而霉菌即以线样纤维或菌丝体的形式显示,并有微芽或孢子贴附。但此法可靠性较低(60%)。如取阴道分泌物涂片经革兰染色,镜下可找到成群革兰阳性浓染的卵圆形孢子,或可见到假菌丝与出芽细胞相连成链状或分枝状,容易辨认,可靠性可提高至80%。最可靠的方法是进行霉菌培养。(D对)

93.B 【解析】霉菌的药物治疗以局部用药为主,首选制霉菌素。因霉菌在碱性环境中不易生长,故可用碱性溶液加 $2\% \sim 4\%$ 碳酸氢钠溶液冲洗外阴及阴道,然后用制霉菌素片剂或栓剂10万 $\sim$ 20万单位塞入阴道内,每晚一次,10 $\sim$ 14天为一疗程。(B对)

94.B 【解析】因霉菌在碱性环境中不易生长,故可用碱性溶液加 $2\% \sim 4\%$ 碳酸氢钠溶液冲洗外阴及阴道。(B对)

95.C 【解析】小脑出血表现为不能站立、步态不稳、共济失调、构音障碍。(C对)

96.C 【解析】脑部出血一般采用CT检查,能明确出血部位。(C对)

97.A 【解析】脑出血急性期一般不用降压药,当收缩压超过220mmHg或舒张压超过120mmHg时,可用硫酸镁等药物降压。(A错,本题选A)

98.B 【解析】自发性气胸多见于男性青壮年或患有慢性支气管炎,肺气肿,肺结核者,发作时呼吸困难,患侧胸痛,呼吸音消失,患侧肺呈鼓音。(B对)

99.C 【解析】X线检查是诊断气胸最可靠的方法,可显示肺萎缩程度、有无胸膜粘连、纵隔移位及胸腔积液等。(C对)

100.B 【解析】十二指肠溃疡进餐后3 $\sim$ 4h出现,为饥饿痛、空腹痛、夜间痛,典型节律:疼痛

-进食-缓解, 该患者的症状符合十二指肠溃疡的表现, 患者有排黑便, 说明存在溃疡出血。(B对)

101. B 【解析】 粪便隐血试验阳性说明 24h 出血量大于 5ml, 柏油样便提示:24h 出血量为 30~50ml, 粪便呈咖啡样提示:24h 失血量在 100ml 左右, 呕出胃内咖啡样胃内容物提示:胃内积血在 250~300ml, 该患者为黑便, 说明出血量在 50ml 以上, 小于 100ml。(B对)

102. A 【解析】 痈是多个相邻毛囊及其所属皮脂腺或汗腺的急性化脓性感染, 多由金黄色葡萄球菌引起。(A对)

103. C 【解析】 海绵状静脉窦炎的表现是出现眼部及其周围组织的红肿和疼痛, 并伴有寒战、高热、头痛、昏迷等。(C对)

104. A 【解析】 该产妇产后出血较多, 子宫软, 按摩后子宫变硬, 出血减少, 应考虑子宫收缩乏力。(A对)

105. E 【解析】 该产妇产后子宫收缩乏力, 应予缩宫素, 增强子宫收缩, 减少产后出血。(E对)

106. E 【解析】 在输注缩宫素时, 应注意测量宫底高度, 观察子宫恢复情况。(E对)

107. C 【解析】 急性出血超过血容量 20%时才有输血指征。(C错, 本题选 C)

108. D 【解析】 综合对比 5 个选项, 皮肤完整性受损最不可能出现。(D对)

109. D 【解析】 该患者进行性呼吸困难, 发绀, 颈部广泛皮下气肿, 气管向健侧移位等提示患者为张力性气胸。(D对)

110. C 【解析】 张力性气胸是迅速致死的危重急症, 现场急救应紧急在患侧锁骨中线第二肋间隙穿刺排气, 然后行胸腔闭式引流, 抗休克, 预防感染。(C对)

111. A 【解析】 胸腔引流管引流气体是安放在锁骨中线第二肋, 引流液体安放在腋中线和腋后线之间的第 6~7 肋, 张力性气胸主要是引流气体。(A对)

112. A 【解析】 营养性巨幼细胞贫血是由于缺乏维生素 B<sub>12</sub>和(或)叶酸所引起的一种大细胞贫血, 该患儿血清维生素 B<sub>12</sub>降低, 所以该患儿可能的诊断是营养性巨幼细胞贫血。(A对)

113. C 【解析】 该患儿为营养性巨幼细胞贫血, 营养性巨幼细胞贫血是由于缺乏维生素 B<sub>12</sub>和(或)叶酸所引起的一种大细胞贫血, 所以该患儿应补充维生素 B<sub>12</sub>和叶酸。(C对)

114. C 【解析】 指导家长给婴儿及时添加辅食是预防大细胞性贫血的重点。(C对)

115. B 【解析】 该患者肝脏增大, 且有腹水, B超:肝内有一占位性病变, 所以最有可能的是肝癌。(B对)

116. E 【解析】 腹部超声检查是癌肿定位的首选检查方法, 可显示直径为 2cm 以上的肿瘤, 对早期定位诊断有较大的价值, 结合甲胎蛋白检测, 已广泛用于普查肝癌。(E对)



117. C 【解析】介入治疗术前应禁食 6h。(C 错, 本题选 C)

118. A 【解析】急性肾小球肾炎是小儿泌尿系统最常见的疾病, 临床上以急性起病, 水肿、尿少、血尿、高血压为主要表现。肾病综合征是一组有多种原因引起的肾小球滤过膜通透性增高, 导致大量血浆蛋白自尿中丢失的临床综合征, 主要有大量蛋白尿, 低蛋白血症, 高胆固醇血症和明显水肿。该患儿血压高, 少尿, 应为急性肾小球肾炎。(A 对)

119. D 【解析】患儿起病两周内应卧床休息, 待水肿消退, 血压降至正常, 肉眼血尿消失后, 可下床轻微活动; 血沉正常可上学, 但仍需避免体育活动; Addis 计数正常后恢复正常生活。(D 对)

120. E 【解析】患儿起病两周内应卧床休息, 待水肿消退, 血压降至正常, 肉眼血尿消失后, 可下床轻微活动; 血沉正常可上学, 但仍需避免体育活动; Addis 计数正常后恢复正常生活。(E 对)



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM