



微笑计划西安站早课 ——口内

“高效记忆30分”

愿历尽千帆 归来仍是少年





“ 高效记忆 30 分 ”

- 1.最理想的根管冲洗液是**5.25%次氯酸钠+17%EDTA**
- 2.根管再治疗末次冲洗用**2%氯己定**
- 3.超声根管冲洗原理是**超声流效应、空穴效应、热效应、化学效应**
- 4.最常用的根管内封药药物是**氢氧化钙**
- 5.坏疽或感染严重根管封药用**甲醛甲酚**
- 6.化脓和腐败坏死的根管封药用**木榴油**
- 7.根尖糊剂最好的状态是**能拉丝，回弹2cm**





“高效记忆30分”

- 8.显微镜系统的组成有**支架系统、光学放大系统、照明系统、附件摄像机或照相机**
- 9.根管挫工作刃长度**16mm**，锥度**0.02**
- 10.前牙恒牙胚在**乳牙舌侧**，后牙在**乳牙根分叉下方**
- 11.奶瓶龋好发于**上颌乳切牙的唇面**，下颌无
- 12.乳牙涂氟前不能用**含碳酸钙的摩擦剂**
- 13.乳牙防龋最有效的方法是**窝沟封闭术**





“高效记忆30分”

- 14.预防性树脂充填指**复合树脂充填窝洞+其余相邻深窝沟封闭剂封闭**
- 15.乳牙**牙根吸收1/2**时不做活髓切断术，治疗时出血不止，颜色暗红，有坏死物，做**根尖诱导成形术**
- 16.引起乳牙异常动度最主要的原因是**根尖炎**
- 17.乳牙根管治疗用**可吸收糊剂**，主要是**氢氧化钙**
- 18.乳牙失活时首选**多聚甲醛**，禁止使用**亚砷酸**，牙根吸收时也不能用**金属砷**
- 19.乳牙备动（修整）或外伤漏髓，点状、探及、针尖大小应该**直接盖髓**





“高效记忆30分”

20. 根尖诱导成形术的成功标准是**根尖周病变消失，牙根延长，根尖形成或根端闭合**
21. **良性脆骨症**唯一的口腔表现是乳牙迟萌
22. 恒牙迟萌的全身因素是**颅骨锁骨发育不全、先天性甲状腺分泌减少症**
23. 单纯疱疹病毒明确诊断的是**血常规**
24. 扁平苔藓的皮肤主要病变是**Wickham纹**
25. 梅罗综合征指**沟（裂）纹舌，肉芽肿性唇炎（巨唇），面神经麻痹**





“高效记忆30分”

26..天疱疮的病理学基础是**上皮内疱、棘层细胞松解**

27.梅毒的治疗首选**青霉素**

28.带状疱疹属于**丙类传染病**

29.工作长度指**参照点到根尖止点的距离**，测试方法有**电测法、X线估测，手感**

法

30.根管弯曲小于**5度**，算直根管；大于**20度**，算重度弯曲根管

31.有机物多、有残髓，冲洗用**次氯酸钠**

32.无机物多、钙化物多冲洗用**EDTA**





“高效记忆30分”

33.初挫是指**能深入根管达到根尖狭窄处，并在抽出时有紧缩感的最大号挫**

34.解剖性根尖孔距离生理性根尖孔**0.5-2mm**

35.根尖止点在**牙本质方**

36.尖端直径 (D1) = **型号/100**,末端直径(D2)=**D1+0.32**

37.乳牙早失间隙在**6个月内**变化最快，**2周内**做间隙保持器

38.H挫不能**旋转**，横断面呈**逗点状**，切削能力强，**提拉动作**





“高效记忆30分”

- 39. 艾滋病最早出现的口腔表现是**白色念珠菌感染**
- 40. 盘状红斑狼疮直接免疫检查可见**翠绿色的荧光带**
- 41. 菌状乳头增生形成**草莓舌**
- 42. 舌弓保持器、Nance腭弓式间隙保持器能保持**牙弓周长不变**
- 43. 二期梅毒的主要临床表现是**黏膜斑、玫瑰疹**
- 44. 主控指**完成根尖部预备所用的最大号锉**
- 45. **葡萄糖酸钙**不能用于根管冲洗
- 46. 近期不替换的乳牙充填时首选**复合树脂**





“高效记忆30分”

根管治疗术后效果评估（术后2年）：

（1）痊愈：无自觉症状、临床检查无异常，功能良好，x线片显示根尖周组织影像无异常。（都好）

（2）有效：无自觉症状、临床检查无异常，功能良好，x线片显示根尖周透射区明显减小。（感觉好，X线不好）

（3）无效：有自觉症状、临床检查异常，功能不好，x线片显示根尖周透射区不变或增大，或术前无根尖病变，术后出现根尖透射区。（都不好）





“高效记忆30分”

根管预备的标准：

- ①形成连续的锥形结构，无偏移
- ②机械+化学药物冲洗，彻底去除根管内的感染物
- ③保持根尖狭窄处完整、通畅（关键）
- ④预防根管再感染





“高效记忆30分”

充填后X线检查

- ① 恰填：恰好严密填满，充填物距根尖端0.5 ~ 2 mm, X线无异常
- ② 欠填：根管内充填物距根尖端2 mm以上，X线有透射影
- ③ 超填：填满根管，超出了根尖孔
- ④ 漏填：形成残髓炎，上6 MB2





“高效记忆30分”

根管充填的时机

- ① 已经过严格的根管预备和消毒
- ② 患牙无疼痛或其他不适
- ③ 暂封材料完整
- ④ 根管内无异味、无明显渗出
- ⑤ 根管充填必须在严格隔湿条件下进行





“高效记忆30分”

癌前病变PLOM：白斑（OLK）、红斑、红白斑、黏
膜良性淋巴组织增生病

癌前状态PCOM：口腔扁平苔藓（糜烂、萎缩）、口
腔黏膜下纤维性变、盘状红斑狼疮、上皮过度角化、先
天性角化不良以及梅毒

