

初级备考测评第七天答案与解析

外科一

1. 答案：C

解析：便血常见原因有：①上消化道出血；②小肠出血，如肠结核、局限性肠炎、急性出血性坏死性肠炎、小肠肿瘤、肠套叠等；③结肠出血，如痢疾、溃疡性结肠炎、局限性肠炎、结肠癌等；④直肠出血，如直肠癌、直肠损害、痔、肛裂等；⑤其他疾病，如各种血液病、流行性出血热、伤寒与副伤寒、钩虫病、维生素缺乏症等。凡儿童有无痛性鲜血便者，首先考虑为幼年性直肠息肉。故选 C。

2. 答案：A

解析：在三级医院的 ICU 护士不满三年，必须参加理论和实践培训后才可以参加 ICU 专科培训，所以只有 A 是错误的

3. 答案：D

解析：T 管拔管的护理：若 T 管引流出的胆汁色泽正常，且引流量逐渐减少，可在术后 10 天左右，试行夹管 1~2 日，夹管期间应注意观察病情，病人若无发热、腹痛、黄疸等症，可经 T 管做胆道造影，若造影无异常发现，再持续开放 T 管 24 小时充分引流造影剂后，再次夹管 2~3 日，病人仍无不适即可拔管。故本题选 D。

4. 答案：E

解析：A 可避免诱发感染；B 可避免空气进入胸膜腔；C 可防止水封瓶被踢倒或抬高；D 可检测系统是否被堵塞或肺已完全膨胀。胸腔闭式引流主要是靠重力引流，水封瓶高于患者胸腔引流口将起不到引流作用。故本题选 E。

5. 答案：D

解析：急性重症胆管炎，即急性梗阻性化脓性胆管炎，是指胆管严重的急性梗阻性化脓性感染，常伴胆管内压升高；病人常有右上腹痛、畏寒发热、黄疸、休克及精神异常症状的 Reynolds 五联征。本病是我国胆道疾病最突出的急症，也是最严重的感染性急腹症，可并发急性呼吸衰竭及急性肾衰竭，严重者可于短期内死亡。故选 D。

6. 答案：C

解析：防治心搏停止后缺氧性脑损伤所采取的措施称为脑复苏，其目的是为了实现在脑组织中微血管的再充盈，以减缓脑水肿的发展。脱水、低温和肾上腺皮质激素治疗是目前较为有效的预防急性脑水肿的措施，故本题选则 C。

7. 答案：E

解析：护士的职责包括：①配合手术：做好术前室内清洁卫生和各类物品的准备；术前了解病人情况及所施手术；认真做好查对工作；检查手术区备皮情况；与洗手护士共同核对器械、纱布、纱布垫、缝针等，详细记录；负责参加手术人员的衣服穿着，供应洗手护士需要的一切用物，保持手术间的整洁、安静，适时调节手术野灯光与室温；负责输液、输血；随时督促手术人员严格执行无菌操作，对违反者应立即予以纠正；术毕，协助擦净手术野周围的血迹，妥善包扎伤口，护送病人回病房，并向病室值班人员详细交待病情及用物；整理手术间，室内一切用物归还原处；②配合麻醉。故选 E。

8. 答案：E

解析：门静脉高压症的病理：①脾肿大、脾功能亢进；②交通支扩张，消化道器官淤血；③腹水；中心静脉压的大小取决于心脏射血能力和静脉回心血量之间的相互关联，与门脉压力无关，故选 E。

9. 答案：B

解析：头部受暴力作用后，立即出现短暂的大脑功能障碍，而无器质性的脑组织损害者称为脑震荡。其临床特点为：①伤后立即出现意识障碍，不超过 30 分钟；伴面色苍白、出汗、血压下降、肌张力减低等，但随意识的恢复很快趋于正常；②逆行性遗忘；③头痛、头晕、呕吐等症状可在短期内可好转；④神经系统检查、脑脊液检查均无异常；⑤无须特殊治疗和护理，一般卧床休息 1~2 周，给予镇静剂，多数顺利康复，预后良好。B 为硬膜外出血的临床表现。故本题应选 B。

10. 答案：D

解析：肠梗阻解除的主要指标就是肠鸣音恢复或正常排便、排气。故选 D。

11. 答案：B

解析：体液中细胞内液占体重的 40%，女性占 35%；细胞外液占 20%，细胞外液中组织间液为 15%，血浆为 5%。故本题选 B。

12. 答案：C

解析：体液中细胞内液占体重的 40%，女性占 35%；细胞外液占 20%，细胞外液中组织间液为 15%，血浆为 5%。故本题选 C。

13. 答案：C

解析：夏柯三联征为上腹部剧烈疼痛、高热寒战、黄疸，是胆管炎的基本表现和早期症状。故本题选 C，A 急性胆囊炎很少出现黄疸；B 胆囊结石很少出现黄疸和高热；D 肝内胆管结石一般不出现剧烈疼痛和高热寒战；E 萎缩性胆囊炎亦没有黄疸和高热寒战症状。

14. 答案：B

解析：发病初由于动眼神经受损导致患侧瞳孔逐渐缩小，随病情发展患侧动眼神经麻痹，出现患侧瞳孔逐渐散大，随着病情恶化，影响脑干血供时，病人处于濒亡状态时双侧瞳孔散大。故选 B。

15. 答案：C

解析：术后观察：①观察排便的性状、次数；②术后禁食 2~3 天，第 3 天如无腹胀即可拔除胃管，禁食期间，胃肠减压，进少量流食，如无腹胀可进半流食；③引流管内引流液的性质、量、颜色，2~3 日后，如引流液每日少于 10ml，为非血性液体可考虑拔管。导尿管留置时间为 1~2 周，拔除尿管前，锻炼膀胱的收缩功能，7~10 天内不可灌肠防止伤口感染破裂等，C 错。

16. 答案：A

解析：单纯性机械性肠梗阻只有肠内容物通过受阻，而无肠壁血运障碍。多表现为阵发性绞痛，如腹痛发展为剧烈持续性腹痛，应警惕绞窄性肠梗阻的可能；肠鸣音亢进，有气过水声或金属音。麻痹性肠梗阻时表现为持续性胀痛或不适，肠鸣音减弱或消失。故本题选 A。

17. 答案：A

解析：单纯性甲状腺肿是机体缺碘、存在致甲状腺肿物质，以及甲状腺激素合成酶缺陷而引起代偿性甲状腺增生肿大，一般无甲状腺功能异常。故本题应选 A。

18. 答案：A

解析：本病治疗原则为解痉止痛，预防感染，驱除蛔虫，支持疗法，非手术无效时可手术治疗。注意病因诊断未明确前禁用吗啡、杜冷丁、阿托品等药物以免延误诊断，因其掩盖胆道穿孔、腹膜炎等急腹症。解痉止痛可用一般镇静剂、维生素 K3 或针刺治疗。故本题选 A。

19. 答案：A

解析：B 超在胆道疾病的诊断中具有无创，简便易行，可多次重复检查，价格适中，准确率高等优点，因此 B 超应作为诊断的首选。故本题选 A。

20. 答案：A

解析：胆固醇含量过多或胆汁酸含量减少，出现三种脂类比例失调，胆汁中的胆固醇含量超过了胆汁酸和磷脂溶解胆固醇的能力，胆汁中部分胆固醇就不能溶解在胆汁中，就会析出胆固醇结晶而发生沉淀。析出的胆固醇结晶相互聚结，久而久之便会形成胆固醇结石。

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM