

口腔执业/助理技能考情考况——网友回忆版

助理【考生回忆版本】男，39岁。

主诉：前牙区牙龈肥大1年，并要求修复缺失前牙。

现病史：近一年来发现前牙区牙龈肥大，偶有刷牙出血，未曾牙周治疗。上前牙3个月前外伤折断后拔除。

既往史：因癫痫服用苯妥英钠1年，否认药物过敏史。

家族史：无特殊记载。

检查：全口牙龈肥大，圆钝，质地较韧，探诊点状出血，以前牙区为重，探诊深度3~5mm，未探及釉牙骨质界，左上1缺失，拔牙创愈合良好，左上2牙冠完整，右上1轻度舌倾，舌面磨损，前牙色泽和咬合关系正常，不松动，叩诊(-)，余牙未见异常。

1. 主诉疾病诊断、诊断依据和鉴别诊断
2. 主诉疾病的治疗原则及修复设计

助理【考生回忆版本】女，28岁，咬苹果和刷牙时牙龈出血2个月。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

执业【考生回忆版本】患者，男，70岁。

主诉：义齿松动、咀嚼无力2年，口干、进食刺激痛半年。

现病史：15年前拔除全口余留松动牙，曾3次全口义齿修复6年前第二次全口义齿修复，戴用至今。一年前自觉义齿松动，咀嚼无力半年来自觉口干，进食刺激性食物疼痛，症状逐渐加重，未做治疗。

既往史：否认全身系统性疾病，否认药物过敏史。

家族史：无特殊记载。

检查：全口牙齿缺失，上颌剩余牙槽嵴丰满，下颌剩余牙槽嵴低平，上颌义齿腭侧承托区黏膜呈亮红色，充血、水肿，可见凝乳状白色斑点，可擦去上、下颌义齿回位差，咬合面重度磨损，息止牙合间隙6mm，义齿基托组织面大量软垢附着。实验室检查：涂片可见菌丝和孢子。

1. 主诉疾病诊断
2. 诊断依据
3. 旧义齿存在的主要问题
4. 治疗设计

执业【考生回忆版本】患者，男，53岁，后牙松动6个月就诊。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

执业【考生回忆版本】64. 患者，女，50岁。

主诉：右面部阵发性痛3年。

现病史：3年来右面部阵发性、针刺样痛，洗脸、刷牙及进食均可引起疼痛，与冷、热刺激无关，每次持续约半分钟，触摸口角区可引起疼痛，并向右下颌、右下唇放射。3年前外伤磕碰下前牙。2年前右下前牙开始变黑，偶感发胀，无肿痛。X线示右下1根尖周透射区边缘不清楚。

既往史：否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：面部无肿胀，张口度 43mm，开口型无偏斜，无开口痛。双侧面部触觉对称，无压痛。按压右口角区可诱发右面部剧烈疼痛，疼痛持续约半分钟。右下 1 唇侧倾斜，牙冠完整，色灰暗，牙髓电活力测验无反应，叩痛（+）

执业【考生回忆版本】患者，女，65 岁。

主诉：戴义齿后黏膜压痛 3 天。

现病史：全口牙缺失 10 年，2 年前第二次全口义齿修复。最近 3 天戴义齿后黏膜压痛，不能咀嚼。发现舌背发白，无明显症状 3 个月。

既往史：否认全身系统性疾病和皮肤病史。否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：全口牙缺失，上下牙槽嵴较丰满。上、下颌弓大小及位置协调。上、下颌义齿贴合、固位好，人工牙排列位置正常，正中合后牙接触均匀、稳定，前牙覆合 2mm。右侧~下颌舌骨嵴处黏膜可见 3mmx3mm 溃疡，周围黏膜红肿。舌背部视诊见珠光白色网纹，未见充血糜烂。

【考生回忆版本】1. 患者，女，44 岁

2. 主诉：反复发生口腔溃疡 1 年余。

3. 现病史：1 年来口腔内反复发生口腔溃疡，且部位不断变化，发作间隙半个月到 1 个月，发作时疼痛明显，影响进食，7 天左右前合。近 4 天舌部出现破溃，疼痛明显，影响进食。工作压力大，晚上休息差。

4. 口腔检查：舌左侧缘有 1 个直径 2mm 的表浅溃疡，周边红，溃疡表面覆盖淡黄色假膜，溃疡面微凹陷，触痛明显。口内其他检查未见异常。答题要点

1 诊断：复发性口腔溃疡

2. 诊断依据

(1) 女，35 岁，某企业骨干，未婚，1 年来口腔内反复发生口腔溃疡，且部位不断变化，发作间隙半个月到 1 个月，发作时疼痛明显，影响进食，7 天左右愈合。

(2) 近 4 天舌部出现破溃，疼痛明显，影响进食。工作压力大，晚上休息差。

(3) 口腔检查：舌左侧缘有 1 个直径 2mm 的表浅溃疡，周边红，溃疡表面覆盖淡黄色假膜，溃疡面微凹陷，触痛明显。

(4) 口内其他检查未见异常。

3. 鉴别诊断

(1) 手足口：不但有口腔溃疡还有手和足的溃疡

(2) 白塞病：不但有口腔黏膜的溃疡还有手和生殖器的溃疡

(3) 创伤性溃疡：溃疡常发生于邻近或接触机械刺激因子的部位，无复发性和自限性。溃疡发展缓慢，故疼痛不明显。刺激去除后溃疡可前合。

(4) 结核性溃疡：初起为无痛性小结节，溃疡扩大后表现为界限清楚，边缘微隆呈鼠啮状向中央卷曲的形态特征，底部可见暗红色的桑葚样肉芽肿，常并发肺部结核感染。(5) 癌性溃疡：老年多见，呈菜花状，基底硬结，淋巴结坚硬粘连