



• **1.**怀疑腮腺浅叶肿物时首选的检查方法是

- A.超声
- B.MRI
- C.腮腺造影
- D.螺旋 CT
- E.锥形束 CT
- F.曲面断层片

• **2.**牙震荡时牙齿受到损伤的部位是

- A.牙釉质
- B.牙髓
- C.牙骨质
- D.牙周膜
- E.牙槽骨
- F.牙本质

• **3.**嚼槟榔引起的口腔癌最好发于

- A.唇
- B.牙龈
- C.口底
- D.颊部
- E.舌
- F.腭

• **4.**营养不良性口角炎最常见的病因是缺乏

- A.烟酸
- B.维生素 C
- C.叶酸
- D.维生素 B2
- E.维生素 E
- F.维生素 A

• **5.**目前推荐使用的根管内消毒药物是

- A.甲酚甲醛
- B.樟脑酚
- C.甲硝唑
- D.碘仿
- E.氢氧化钙
- F.氯仿

• **6.**可摘局部义齿初戴时就位困难的处理方法是

- A.用力将义齿戴入
- B.确定阻碍部位后逐步调改、缓冲
- C.缓冲卡环体
- D.调整支托
- E.缓冲基托组织面
- F.调磨基牙

• **7.** 口腔颌面部感染的局部临床表现

- A. 全身发热
- B. 头痛
- C. 全身不适
- D. 食欲减退
- E. 局部红肿热痛和功能障碍
- F. 体重减轻

• **8.** 下列口腔条件中可采用固定修复的是

- A. 牙列远中游离端缺失
- B. 牙缺失数目多、缺隙跨度大
- C. 前牙区伴有严重的颌骨缺损
- D. 前牙缺失，两侧基牙稳固
- E. 后牙缺失，两侧基牙松动 III°
- F. 前牙缺失，两侧基牙松动 III°

• **9.** 上颌窦癌出现复视症状的原因是

- A. 侵犯上颌窦上壁
- B. 侵犯上颌窦内侧壁
- C. 侵犯上颌窦外侧壁
- D. 侵犯上颌窦后壁
- E. 侵犯上颌窦下壁
- F. 出现颅内转移

• **10.** 釉质的基本结构是

- A. 釉小皮
- B. 釉丛
- C. 釉梭
- D. 釉柱
- E. 釉板
- F. 绞釉

• **11.** 创伤牙合的 X 线表现为

- A. 根周膜增宽
- B. 硬骨板清晰
- C. 牙槽骨水平吸收
- D. 宽而浅的牙周袋
- E. 牙周脓肿
- F. 根尖周低密度影

• **12.** Kennedy IV 的活动义齿模型设计时, 将模型向后倾斜的主要目的是

- A. 减小义齿前份基托与余留牙间的间隙, 利于美观
- B. 制作方便, 便于义齿的摘戴
- C. 利用倒凹固位
- D. 牙槽嵴丰满, 唇侧倒凹过大
- E. 使义齿由前向后戴入
- F. 利于义齿修理

- **13.**既能反映牙周健康状况，又能反映治疗需求的指数是
  - A.菌斑指数
  - B.牙龈指数
  - C.CPI 指数
  - D.QT 指数
  - E.龈沟出血指数
  - F.探诊出血指数
  
- **14.**塑料全冠最常用的适应证是
  - A.前牙永久性修复
  - B.后牙永久性修复
  - C.固定义齿的固位体
  - D.保护性或诊断性暂时修复
  - E.咬合紧、力大的后牙永久性修复
  - F.种植义齿冠部永久修复
  
- **15.**地图舌的舌背黏膜表现为
  - A.略高于黏膜表面的白色斑块
  - B.乳头消失而平伏的浅白色斑片
  - C.中央舌乳头萎缩发红，周围边缘隆起呈白色条带
  - D.丝状乳头增生呈毛发状
  - E.大量沟纹分布状如叶脉
  - F.中心微凹陷，表面覆盖淡黄色假膜，周围黏膜充血呈红晕状

- **16.**特纳牙好发于
  - A.上颌乳切牙
  - B.上颌恒切牙
  - C.双尖牙
  - D.乳磨牙
  - E.第一恒磨牙
  - F.第二恒磨牙
  
- **17.**成釉细胞瘤为临界瘤的主要原因是
  - A.来源于牙源性上皮
  - B.长得特别大
  - C.瘤体内牙根吸收
  - D.有局限性浸润生长
  - E.压迫三叉神经引起相应部位麻木
  - F.早期症状不明显，不易发现
  
- **18.**为减小基牙负担，桥体设计时应考虑
  - A.减小颊舌径宽度
  - B.面面积和原缺失牙相同
  - C.采用金属与树脂材料
  - D.设计成卫生桥
  - E.尽量扩大邻间隙
  - F.增大颊舌径宽度

- **19.**根尖片中表现为根管影像局部增宽，粗细不均的病变是
  - A.牙脱位
  - B.牙隐裂
  - C.牙骨质增生
  - D.牙内吸收
  - E.髓石
  - F.牙震荡

- **20.**全口义齿“中性区”排牙的优点是
  - A.使人工牙排在牙槽嵴顶上
  - B.在功能性运动中增强义齿稳定性
  - C.为了美观，与肌肉协调
  - D.为了有更好的支持作用
  - E.为了发音清楚
  - F.为了减小基托面积

多选

- **21.**以下哪些情况应视为拔牙禁忌症
  - A.有近期心肌梗死病史者
  - B.近期心绞痛频繁发作
  - C.心功能Ⅲ~Ⅳ级或有端坐呼吸、紫绀等症状
  - D.心功能Ⅰ级
  - E.三度房室传导阻滞

F.血压 130/80mmHg

• **22.**嵌体与银汞合金充填洞形预备原则的相同点有

- A.做预防性扩展
- B.底平、壁直
- C.点、线、角清楚
- D.洞形无道凹
- E.可利用辅助固位形
- F.制备洞缘斜面

• **23.**一级口腔预防包括

- A.健康教育
- B.OHI
- C.饮食指导
- D.窝沟封闭
- E.早期龋充填
- F.早期牙周炎的基础治疗

• **24.**如果种植体及其组件的机械强度不足时,在使用过程中,可能出现下列的  
哪些问题

- A.种植体折断
- B.种植体松动
- C.修复螺钉折断
- D.基台折断



E.基台螺钉折断

F.种植体周围炎

• **25.**牙内陷的表现形式有

A.畸形舌侧窝

B.畸形根面沟

C.畸形舌侧尖

D.牙中牙

E.畸形中央尖

F.特纳牙

• **26.**下列有关正畸治疗与牙周病关系的说法, 哪些是正确的

A.矫治器的佩带能增加菌斑的滞留

B.正畸治疗前, 应常规对患者进行牙周检查

C.正畸治疗的患者应加强口腔卫生宣教

D.牙周炎的患者可直接进行正畸治疗

E.正畸治疗不当可引起牙周病

F.正畸治疗与牙周病相互独立, 无明显关系

• **27.**舌癌区域性淋巴结转移早的原因有

A.舌淋巴丰富

B.舌血运丰富

C.舌活动频繁

D.生长快

E.距区域淋巴结近

F.早期症状不明显

• **28.**以下哪些是局麻并发症

A.血肿

B.牙龈撕裂损伤

C.牙根折断

D.晕厥

E.感染

F.暂时性面瘫

• **29.**第二乳磨牙与同颌第一恒磨牙的区别包括

A.第一恒磨牙根与牙冠的比例更大

B.第二乳磨牙颜色较白，光泽较差

C.第一恒磨牙牙冠近颈部膨大而牙合面较小

D.第二乳磨牙磨耗较重

E.第二乳磨牙根分叉较大

F.第二乳磨牙颈部缩窄明显

• **30.**下颌后牙种植手术后即刻拍摄曲面断层片的目的是包括

A.检查种植体位置

B.检查种植体轴向

C.初步确定种植体根尖与下牙槽神经管的位置关系

D.检查种植体与邻牙位置关系

E.检查种植体周围骨密度

F.确定种植体类型

• **31.**修复牙体预备时保护牙髓的措施中, 哪些是正确的

A.用高速切割器械做牙体预备时, 应用水雾冷却

B.局麻下操作时应注意保护牙髓

C.牙体预备可分次完成

D.牙体预备后, 避免用刺激性药物

E.活髓牙牙体预备后应做临时冠

F.加大压力磨切以便快速完成预备

• **32.**以下不可行组织活检术的有

A.舌癌

B.唇癌

C.恶性淋巴瘤

D.恶性黑色素瘤

E.肉瘤

F.血管性肿瘤

• **33.**全冠试戴时出现翘动, 可能的原因有

A.全冠组织面有金属瘤

B.邻接过紧

C.预备体轴壁聚合度大

D.未完全就位

- E.石膏代型磨损
- F.轴面突度过小

• **34.**以下哪些是拔牙适应症

- A.根尖周病不可能治愈
- B.阻生牙引起冠周炎
- C.额外牙
- D.牙外伤根尖 1/3 折断
- E.滞留乳牙
- F.正畸减数牙

• **35.**下列可用可摘局部义齿修复的有

- A.双侧游离缺失
- B.需升高颌间距离者
- C.牙弓一侧牙槽骨缺损较大
- D.口腔溃疡经久不愈者
- E.新近拔牙者，等待伤口愈合期间
- F.牙槽黏膜充血红肿者

• **36.**V-Y 皮瓣可以

- A.增加组织长度
- B.缩小组织长度
- C.增加组织宽度
- D.缩小组织宽度

E.增加组织厚度

F.缩小组织厚度

• **37.**以下属于影响牙周病的全身疾病有

A.糖尿病

B.Down 综合症

C.Papillon-Lefever 综合症

D.胆囊炎

E.艾滋病

F.乙型肝炎

• **38.**以下哪些不属于种植修复禁忌症

A.牙列缺失

B.缺失牙的邻牙中龋

C.未经控制的牙周炎

D.多数牙缺失

E.轻度高血压

F.患者年龄较大

• **39.**下颌阻生智齿拔除时阻力包括

A.冠部软组织阻力

B.冠部骨组织阻力

C.邻牙阻力

D.牵拉颊部阻力

E.牙根部阻力

F.牵拉舌体阻力

- **40.**一患者, 检查: 46MOD 银汞充填, 剩余颊舌侧牙体硬组织强壮, 咬合紧, 牙冠高度仅 4mm。若行全冠修复, 下列增加固位的措施中可考虑的有

A.在轴壁上制备倒凹

B.增加箱状或钉洞等辅助固位形

C.设计龈下边缘

D.适当增加龈边缘宽度

E.设计嵌体冠

F.增加粘接剂稠度

- **41.**舌癌的远处转移最多见于脑

正确  错误

- **42.**对 II 类根分叉缺损治疗较有效的方法是半牙切除术

正确  错误

- **43.**当固定桥两端固位力不相等时会引起一端固位体的松动

正确  错误

- **44.**骨性 III 类错合的牙性代偿通常表现为下切牙唇倾合并上切牙舌倾

正确  错误

- **45.**种植义齿中种植体与相邻的天然牙根至少应有的间隔是 1.5mm 以上

•  正确  错误

- **46.**可摘局部义齿中起辅助固位和增强稳定作用的部分是间接固位体

正确  错误

- **47.** 双侧第一恒磨牙为远中错合关系, 上颌切牙舌向倾斜, 错合畸形的诊断是安氏II1

正确  错误

- **48.** 角化龈是指附着龈和龈乳头

正确  错误

- **49.** 腭裂修复术最佳时机为 8-18 个月

正确  错误

- **50.** 采用固定义齿修复的主要依据是患者的美观性

正确  错误

- **51.** 引起口腔单纯疱疹的主要病原体是水痘-带状疱疹

正确  错误

- **52.** 腮腺是由浆液性腺泡形成的纯浆液性腺体

正确  错误

- **53.** 目前认为人类的主要致龋菌是乳酸杆菌

正确  错误

- **54.** 儿童开始刷牙的时机为乳牙全部萌出后

正确  错误

- **55.** 上颌全口义齿后堤区应在前、后颤动线之间

正确  错误

- **56.** 口腔黏膜上所发生的白色斑块都称为白斑

正确  错误

• **57.**Herbst 矫治器属于功能性矫治器

正确  错误

• **58.**RPI 卡环组中使用近中支托的主要目的是减小基牙所受扭力

正确  错误

• **59.**颌面部创口初期清创缝合最长期限一般为伤后 48 小时

正确  错误

• **60.**血管神经性水肿较严重时会引起喉头水肿、窒息

正确  错误

扫码关注公众号  
更多口腔医考资料免费领取

