

2年 易错考题

1. 阴中求阳的治法适用于

- A. 阴虚
B. 阳虚
C. 阴盛
D. 阳盛
E. 阴阳两虚

【答案】B

【解析】阴阳间相互对立,又相互依存,当出现阳虚病证时,除了使用补阳药外,还应适当运用补阴药,使阳得阴助而生化无穷,此为阴中求阳,这是根据阴阳互根理论确定的治疗原则。

涉及考点 | 阴阳在疾病预防和治疗方面的应用

2. 五行中火的“所胜”是

- A. 木
B. 水
C. 土
D. 金
E. 火

【答案】D

【解析】“克我”者是“所不胜”,“我克”者是“所胜”,火的“所胜”,即火“所克”者。根据五行相克次序:水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。所以火的“所胜”是金。

涉及考点 | 五行相克

3. 下列关于五行生克规律的表述,正确的是

- A. 木为土之所胜
B. 木为水之子
C. 火为土之子
D. 水为火之所胜
E. 金为木之所胜

【答案】B

【解析】五行相生次序:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。“生我”者为母,“我生”者为子。五行相克次序:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。“克我”者为“所不胜”,“我克”者为“所胜”。

涉及考点 | 五行相生与相克

4. 心主神志最主要的物质基础是

- A. 津液
B. 精液
C. 血液
D. 宗气
E. 营气

【答案】C

【解析】心藏神,心具有主宰人体五脏六腑、形体官窍的一切生理活动和人体精神意识思维活动的功能。心主血脉,心气可推动和调控血液在脉管中正常运行,流注全身。心的这两种功能相互影响:一方面,心主血脉的功能受心神主宰;另一方面,心神又必须得到心血的濡养才能正常地工作。

涉及考点 | 心的生理功能

5. 根据五行的生克乘侮规律,以下说法错误的是

- A. 心火不足,肾水乘之
B. 木火刑金

- C. 肝木乘土
E. 岁土太过,雨湿流行,肾水受邪
- D. 心火过亢,反侮肺金

【答案】D

【解析】心属火,肺属金,火克金,心火过亢则称心火乘肺金,不是反侮。

涉及考点 | 五行的相生与相克、相乘与相侮

6. 导致津液输布障碍,水湿痰饮潴留的最主要因素是
- A. 肺的宣发肃降失职
B. 脾的运化功能失健
C. 肝的疏泄功能失常
D. 肾的主水功能失调
E. 三焦疏通水道不利

【答案】B

【解析】脾居中焦,为人体气机升降的枢纽,故在人体水液代谢过程中起着重要的枢纽作用。因此,脾运化水湿的功能健旺,既能使体内各组织得到水液的充分濡润,又不致使水湿过多而潴留。反之,如果脾运化湿的功能失常,必然导致水液在体内的停滞,而产生水湿、痰饮等病理产物,甚则形成水肿。即所谓脾为“生痰之源”。

涉及考点 | 脾的生理功能

7. 《素问·上古天真论》记述了肾气由稚嫩到充盛,由充盛到衰少继而耗竭的演变过程,耗竭的变化是

- A. 筋骨坚,发长极,身体盛壮
B. 三阳脉衰于上,面皆焦,发始白
C. 任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭
D. 阳明脉衰,面始焦,发始堕
E. 肾气平均,真牙生而长极

【答案】C

【解析】《素问·上古天真论》：“女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七，肾气平均，故真牙生而长极。四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮。五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕。六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白。七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

涉及考点 | 肾的生理功能

8. “吐下之余,定无完气”的生理基础是
- A. 气能生津
B. 气能行津
C. 气能摄津
D. 津能载气
E. 津能生气

【答案】D

【解析】津液是气的载体之一,在血脉之外,气必须依附于津液而存在,否则就将涣散不定而无所归。若因汗、吐太过,使津液大量丢失,则气亦随之而外脱,形成“气随津脱”之危候,故曰:“吐下之余,定无完气”。

涉及考点 | 气与津液的关系

9. 手阳明大肠经在何处交于何经
- A. 在鼻翼旁交于足阳明胃经
B. 在拇指端交于手太阴肺经
C. 在小指端交于手太阳小肠经
D. 在无名指端交于手少阳三焦经
E. 在足大趾端交于足太阴脾经

【答案】A

【解析】手阳明大肠经起于示指桡侧端(商阳穴),经过手背行于上肢伸侧前缘,上肩,至肩关节前缘,向后与督脉在大椎穴处相会,再向前下行入锁骨上窝(缺盆),进入胸腔络肺,通过膈肌下行,入属大肠。其分支从锁骨上窝上行,经颈部至面颊,入下齿中,回出夹口两旁,左右交叉于人中,至对侧鼻翼旁,经气于迎香穴处与足阳明胃经相接。

涉及考点 | 十二经脉的交接规律

10. 治疗血行瘀滞,多配用补气、行气药是由于

- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 气能摄血
- D. 血能生气
- E. 血能载气

【答案】B

【解析】气为血之帅,气能生血、行血、摄血。气能行血,指气的推动作用使血液循行的动力。气可以直接推动血液运行,又可促进脏腑的功能活动,通过脏腑的功能活动推动血液运行。故治疗血行瘀滞时,多配用补气、行气药,气行则血行。

涉及考点 | 气与血的关系

11. 五行相乘,下列哪种说法是正确的

- A. 母气有余而乘其子
- B. 子气有余而乘其母
- C. 气有余则乘己所胜
- D. 气有余则乘己所不胜
- E. 气不及则己所胜侮而乘之

【答案】C

【解析】五行中的某一行过于亢盛,对其所胜行进行超过正常限度的克制,引起其所胜的虚弱,从而导致五行之间的协调关系失常。根据《素问·五运行大论》:“气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不及,则己所不胜,侮而乘之,己所胜,轻而侮之”。

涉及考点 | 五行相乘

12. 关于肺气肃降,说法错误的是

- A. 吸入自然界之清气
- B. 呼出体内浊气
- C. 脾转输至肺的津液及部分水谷精微向下向内布散
- D. 将脏腑代谢后产生的浊液下输于膀胱
- E. 肺气向内向下的布散运动

【答案】B

【解析】肺气宣发,是肺气向上向外的布散运动,主要体现在以下三个方面:一是呼出体内浊气。二是将脾所转输来的津液和部分水谷精微上输头面诸窍,外达于全身皮毛肌腠。三是宣发卫气于皮毛肌腠,以温分肉,充皮肤,肥腠理,司开阖,将代谢后的津液化为汗液,并控制和调节其排泄。选项B为肺气宣发的具体表现,所以本题选B。

涉及考点 | 肺的生理功能特性

13. “壮水之主,以制阳光”是指

- A. 以阳中求阴之法调整阴阳偏衰
- B. 以阴中求阳之法调整阴阳偏衰
- C. 泻热之法,调整阳偏衰
- D. 以补阴之法,治疗阴虚阳亢之证
- E. 以补阳之法,治疗阴虚阳亢之证

【答案】D

【解析】阴虚则热的虚热证,治宜滋阴以抑阳,即王冰所谓“壮水之主,以制阳光”,《内经》所谓“阳病治阴”。

涉及考点 | 阴阳失调

14. “益火之源,以消阴翳”,所指的是

- A. 补阴扶阳
- B. 阳病治阴
- C. 阴中求阳
- D. 阳中求阴
- E. 阴病治阳

【答案】E

【解析】阴阳互制之调补阴阳:阳虚则寒的虚寒证,治宜扶阳以抑阴,即王冰所谓“益火之源,以消阴翳”,《内经》所谓“阴病治阳”。

涉及考点 | 阴阳失调

15. 按十二经脉的流注次序,肝经流注于哪条经脉之前

- A. 膀胱经
- B. 胆经
- C. 三焦经
- D. 心经
- E. 肺经

【答案】E

【解析】十二经脉流注次序:肺大胃脾心小肠,膀胱肾包焦胆肝藏。

涉及考点 | 十二经脉的流注次序

16. 《素问·五藏生成》说:多食辛,则

- A. 肉胝皱而唇揭
- B. 筋急而爪枯
- C. 骨痛而发落
- D. 脉凝泣而变色
- E. 皮槁而毛拔

【答案】B

【解析】《素问·五藏生成》说:“多食咸,则脉凝泣而变色,多食苦,则皮槁而毛拔;多食辛,则筋急而爪枯;多食酸,则肉胝皱而唇揭;多食甘,则骨痛而发落,此五味之所伤也。”

涉及考点 | 饮食偏嗜

17. 所谓“得气”体现的经络功能是

- A. 沟通联络作用
- B. 运输渗灌作用
- C. 感应传导作用
- D. 调节平衡作用
- E. 运行气血作用

【答案】C

【解析】经络的生理机能为沟通联系作用、运输渗灌作用、感应传导作用、调节作用。感应传导,是指经络系统具有感应及传导针灸或其他刺激等各种信息的作用。如对经穴刺激引起的感应及传导,通常称为“得气”,即局部有酸、麻、胀的感觉及沿经脉走向传导,就是经络感应传导作用的体现。

涉及考点 | 经络的生理功能

18. 患者四肢冰凉,神志昏迷,口臭。口渴引饮,脉有力,辨证为

- A. 表热证
- B. 里虚热证
- C. 表寒里热证
- D. 真寒假热证
- E. 真热假寒证

【答案】E

【解析】真热假寒是内热炽盛而外见寒象的证候。四肢冰凉是因内热过盛,阳气闭郁不能外达所致。口臭,口渴引饮,脉有力,此类都是内有实热的表现。

涉及考点 | 真热假寒

19. 补阳时适当配伍补阴药的方法是

- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 阴病治阳
- D. 阳病治阴
- E. 阴阳双补

【答案】A

【解析】善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷。根据阴阳互补的原理,补阳时适当佐以补阴药谓之阴中求阳。

涉及考点 | 调整阴阳

(20~21 题共用备选答案)

- A. 津
- B. 液
- C. 受纳水谷
- D. 贮存尿液
- E. 运化

20. 小肠主

【答案】B

21. 胃主

【答案】C

【解析】选项 A 大肠主津。选项 B 小肠主液。选项 C 胃受纳水谷。选项 D 膀胱贮存尿液。选项 E 脾主运化。

涉及考点 | 胃、小肠的生理机能

(22~23 题共用备选答案)

- A. 督脉
- B. 任脉
- C. 冲脉
- D. 带脉
- E. 维脉

22. 与女子妊娠关系密切,主胞胎的是

【答案】B

【解析】任脉起于胞中,与女子妊娠有关,称“任主胞胎”。

23. 与妇女月经关系密切的是

【答案】C

【解析】冲脉有“十二经脉之海”“血海”之称,与女子月经及孕育机能密切相关。

涉及考点 | 任脉、冲脉的基本机能

(24~25 题共用备选答案)

- A. 益火补土法
- B. 金水相生法
- C. 抑木扶土法
- D. 培土制水法
- E. 泻南补北法

24. 肾阳虚不能温脾,以致脾阳不振,其治疗宜采用

【答案】A



【解析】益火补土法是温肾阳补脾阳的一种方法,适用于肾阳不能温煦脾土的脾肾阳虚证。

25. 脾虚不运或脾肾阳虚,水湿泛滥而致的水肿胀满之证,其治疗宜采用

【答案】D

【解析】培土制水法是通过温运脾阳或健脾温肾治疗水湿停蓄的一种方法,适用于脾虚不运或脾肾阳虚、水湿泛滥而致的水肿胀满之证。

涉及考点 | 五脏疾病的具体治法

26. 适用于热结旁流的治则是

- | | |
|---------|---------|
| A. 热因热用 | B. 寒因寒用 |
| C. 通因通用 | D. 塞因塞用 |
| E. 寒者热之 | |

【答案】C

【解析】通因通用,即以通治通,是用通利的药物来治疗具有通泻症状的实证。适用于“大实有羸状”的真实假虚证。

涉及考点 | 反治

27. 《素问·上古天真论》中关于“丈夫五八”在生理上的表现是

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A. 阳气衰竭于上,面焦,发鬓斑白 | B. 肾气衰,发堕齿槁 |
| C. 肾脏衰,形体皆极 | D. 肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少 |
| E. 三阳脉衰于上,面皆焦,发始白 | |

【答案】B

【解析】丈夫八岁,肾气实,发长齿更。二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。四八,筋骨隆盛,肌肉满壮。五八,肾气衰,发堕齿槁。六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓斑白。七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极。八八,则齿发去。

涉及考点 | 《素问·上古天真论》

28. 《素问·上古天真论》提到女子“三阳脉衰于上,面皆焦,发始白”的年龄是

- | | |
|-------|-------|
| A. 二七 | B. 四七 |
| C. 五七 | D. 六七 |
| E. 三七 | |

【答案】D

【解析】女子七岁,肾气盛,齿更发长。二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。三七,肾气平均,故真牙生而长极。四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕。六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

涉及考点 | 《素问·上古天真论》

29. 阳偏盛而导致的实热证,其治疗方法为

- | | |
|---------|---------|
| A. 阴病治阳 | B. 热因热用 |
| C. 热者寒之 | D. 寒者热之 |
| E. 阳中求阴 | |

【答案】C

【解析】“阳盛则热”的实热证,据阴阳对立制约原理,宜用寒凉药物以泻其偏盛之阳热,此即“热者寒之”之意。

涉及考点 | 正治

30. “湿浊内生”的主要机制是

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 肺气不足,寒饮内停 | B. 胸阳不振,阴寒内盛 |
| C. 恣食生冷,内伤脾胃 | D. 脾肾阳虚,阴寒内盛 |
| E. 痰湿内阻,从阴化寒 | |

【答案】C

【解析】内湿的产生,多因过食肥甘,嗜烟好酒,恣食生冷,内伤脾胃,致使脾失健运不能为胃行其津液,或喜静少动,素体肥胖,情志抑郁,致气机不利,津液输布障碍,聚而成湿所致。因此,脾的运化失职是湿浊内生的关键。

涉及考点 | 湿浊内生的机制

金英杰医学教育

90. 前额头痛连及眉棱骨属于

- A. 阳明头痛
B. 少阳头痛
C. 厥阴头痛
D. 太阳头痛
E. 太阴头痛

【答案】A

【解析】少阴经头痛：头痛连齿；阳明经：前额部连眉棱骨痛；少阳经：两侧头痛；太阳经：后头部连头项痛；厥阴经：巅顶痛。

涉及考点 | 问疼痛

2年 易错考题

1. 渴喜热饮而量不多，或水入即吐多为

- A. 湿热内蕴
B. 痰饮内停
C. 营分热盛
D. 阴虚津亏
E. 瘀血内阻

【答案】B

【解析】渴喜热饮，饮水不多，多为痰饮内停证或阳虚水津不布。

涉及考点 | 问饮食

2. 大便时干时稀是因

- A. 脾气虚
B. 脾阳虚
C. 食滞胃肠
D. 肝郁脾虚
E. 脾肾阳虚

【答案】D

【解析】溇结不调即大便时干时稀的症状，多因肝郁脾虚所致。

涉及考点 | 望二便

3. 滑脉、动脉两者脉象相似的特点是

- A. 脉形如豆
B. 来去俱盛
C. 来盛去衰
D. 往来流利
E. 脉率均快

【答案】D

【解析】滑脉往来流利，如盘走珠，应指圆滑；动脉脉形如豆，厥厥动摇，滑数有力。两脉均见往来流利。

涉及考点 | 脉象

4. 不具有短、滑、数3种脉象的特点的是

- A. 动脉
B. 涩脉
C. 弦脉
D. 滑脉
E. 数脉

【答案】B

【解析】动脉：脉形如豆，厥厥动摇，滑数有力；涩脉：脉细而缓，往来艰涩不畅，如轻刀刮竹；弦脉：端直以长，如按琴弦；滑脉：往来流利，如盘走珠，应指圆滑；数脉：脉来急促，一息五六至。

涉及考点 | 脉象

5. 以下脉象中除哪项外均易出现于气血两虚证中
- A. 濡脉
 - B. 弱脉
 - C. 细脉
 - D. 涩脉
 - E. 虚脉

【答案】D

【解析】涩脉临床见于气滞血瘀,精伤血少。

涉及考点 | 脉象

6. 下列各项不属于面赤临床意义的是
- A. 肝火上炎
 - B. 阴虚证
 - C. 戴阳证
 - D. 实热证
 - E. 肾精久耗

【答案】E

【解析】本题主要考察的是五色与疾病的关系。面赤多属于阳热有余或者阴虚不足。所以前四个选项都可以,但是肾精久耗一般情况多见黑色,因为五色中肾对应的是黑色。

涉及考点 | 五色与脏腑疾病的关系

7. 阳明经证与腑证的鉴别要点是
- A. 有无汗出
 - B. 有无发热
 - C. 有无神志改变
 - D. 有无燥屎内结
 - E. 有无舌苔黄燥

【答案】D

【解析】阳明经证是指邪热亢盛,充斥阳明经,弥漫全身,而肠中无燥屎内结。阳明腑证指邪热内盛阳明之里,与肠中糟粕相结,燥屎内结所表现的证候。所以两者之间的鉴别要点为有无燥屎内结。

涉及考点 | 阳明病热证、实证

8. 患者手足疼痛,肤色紫黯发凉,得温痛减,喜暖恶寒,月经愆期,经色黯紫,脉沉迟而涩的临床意义是
- A. 气滞血瘀证
 - B. 血寒证
 - C. 血瘀证
 - D. 血虚证
 - E. 气虚证

【答案】B

【解析】血寒证症见畏寒,手足或少腹等患处冷痛拘急、得温则痛减,肤色紫暗发凉,或为痛经、月经愆期、经色紫暗、夹有血块。唇舌青紫,舌苔白滑,脉沉迟弦涩。

涉及考点 | 血寒证

(9~10 题共用备选答案)

- A. 伸舌时舌体歪向一侧
 - B. 舌体紧缩,不能伸长
 - C. 舌体震颤抖动,不能自主
 - D. 舌伸出口外,不即回缩或立即收回
 - E. 舌体软弱,无力伸缩,痿废不用
9. 颤动舌的舌象特征是

【答案】C

10. 吐弄舌的舌象特征是

【答案】D

【解析】伸舌时舌体歪向一侧,称歪斜舌;舌体紧缩,不能伸长,称为短缩舌;舌体不自主地颤动,动摇不宁者,称颤动舌;舌伸于口外,不即回缩者,称为吐舌,伸舌即回缩,或反复舐口唇四周,动摇不宁者,均称弄舌;舌体软弱,无力伸缩,痿废不用称为痿软舌。

涉及考点 | 舌态变化

(11~12 题共用备选答案)

- A. 滑
B. 促
C. 弦
D. 涩
E. 数

11. 胸痹心痛患者,脉象多见

【答案】C

12. 心烦不寐患者,脉象多见

【答案】E

【解析】弦脉主疼痛,所以在胸痹心痛中会出现弦脉。数脉主热证,心烦不寐患者多为阳热或虚热导致。

涉及考点 | 常见脉象

(13~14 题共用备选答案)

- A. 面色苍白,口唇青紫
B. 头晕眼花,气短疲乏
C. 脘腹坠胀,便意频频,久泻脱肛
D. 神疲乏力,气短,汗出不止,劳累后加重
E. 全身瘫痪,神识朦胧

13. 气不固证的临床表现为

【答案】D

14. 气陷证的临床表现为

【答案】C

【解析】气虚不固证的临床表现:少气懒言,乏力,舌淡,脉虚无力或自汗或出血,或大便失禁,或余沥不尽,遗尿,小便失禁,滑胎小产,遗精早泄。气陷证的临床表现:头晕目眩,少气倦怠,便意频频,久泻久痢,形体消瘦,腹部有坠胀感,内脏下垂,脱肛,子宫脱垂,舌淡苔白,脉弱。

涉及考点 | 气陷证、气不固证

(15~18 题共用备选答案)

- A. 肌肤水肿,无汗,身体疼痛
B. 胸胁胀满,咳唾引痛
C. 胸闷,咳喘,不能平卧,其形如肿
D. 喉中有物,吞之不下,吐之不出
E. 肠鸣辘辘有声

15. 饮留胸胁则见

【答案】B

16. 饮在胸膈则见

【答案】C

17. 饮留肠间则见

【答案】E

18. 饮溢肌肤则见

【答案】A

【解析】胸胁胀满疼痛、呼吸、咳唾，转侧时加重，气短息促，为饮留胸胁。咳喘胸满，不能平卧，呼吸困难，痰如白沫量多，久咳则面目水肿，为饮留胸膈脘腹胀满而疼，肠间辘辘有声，为饮留胃肠。四肢沉重或关节疼痛，甚则肢体微肿，为饮溢肌肤。

涉及考点 | 饮证

(19~20 题共用备选答案)

- | | |
|------------|------------|
| A. 咳嗽痰多，胸闷 | B. 神昏，喉中痰鸣 |
| C. 形体肥胖 | D. 脘痞纳呆 |
| E. 肌肤见圆滑包块 | |

19. 痰泛于肌肤的临床表现是

【答案】E

20. 痰浊中阻，胃失和降的临床表现是

【答案】D

涉及考点 | 痰证

(21~22 题共用备选答案)

- | | |
|----------|----------|
| A. 脾不统血证 | B. 脾虚气陷证 |
| C. 寒湿困脾证 | D. 脾阳虚证 |
| E. 脾气虚证 | |

21. 症见神疲乏力，气短懒言，脘腹坠胀，小便混如米泔，其证候是

【答案】B

22. 症见脘腹胀闷，泛恶欲呕，腹痛便溏身重，其证候是

【答案】C

【解析】脾虚气陷证的临床表现：除脾气虚证表现外，尚见眩晕耳鸣，脘腹坠胀，便意频数，肛门重坠，或久泻久痢，或小便浑浊如米泔，或脱肛、子宫下垂、胃肾下垂、眼睑下垂，舌淡苔白，脉弱。寒湿困脾的临床表现：脘腹痞闷胀痛，泛恶欲吐，口淡不渴，纳呆便溏，头身困重，或身目发黄，晦暗如烟熏色，或水肿，小便短少，或妇女白带量多清稀，舌淡胖苔白腻，脉濡缓。

涉及考点 | 脾虚气陷证、寒湿困脾证

(23~24 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A. 真寒假热 | B. 真热假寒 |
| C. 真实假虚 | D. 真虚假实 |
| E. 不虚不实 | |

23. 热结肠胃，痰食壅积，以致经脉阻滞，气血不能畅达，致倦怠懒言，身羸瘦，脉细，此为

【答案】C

24. 脏腑虚衰，气血不足，运化无力，致腹部胀满，呼吸喘促，二便闭涩等，此为

【答案】D

【解析】当病情发展到寒极或热极的时候，有时会出现一些与其寒热本质相反的“假象”症状或体征，即所谓真热假寒、真寒假热。虚证与实证，都有真假疑似的情况。所谓“至虚有盛候”“大实有羸状”，就是指证候的虚实真假。虚实真假的辨别，关键在于脉象的有力无力、有神无神，其中尤以沉取之象为真谛。

涉及考点 | 证候真假

(25~26 题共用备选答案)

- A. 肝阳化风证
B. 阴虚动风证
C. 血虚生风证
D. 热极生风证
E. 肝阳上亢证

25. 可见步履不稳,眩晕欲仆症状的是

【答案】A

26. 可见眩晕肢体震颤,面白无华症状的是

【答案】C

【解析】肝阳化风可见眩晕欲仆,步履不稳。阴虚风动以手足蠕动,眩晕耳鸣为主。血虚生风以手足震颤,伴面色无华为主。热极生风以高热烦躁,颈项强直为主。肝阳上亢以眩晕耳鸣,头目胀痛为主。

涉及考点 | 肝风内动四证

(27~28 题共用备选答案)

- A. 肺肾气虚
B. 肺气虚
C. 脾肺气虚
D. 心肺气虚
E. 肾气不固

27. 久病咳喘,乏力少气,呼多吸少,自汗耳鸣,舌淡脉弱。其证候是

【答案】A

28. 久病咳喘,胸闷心悸,乏力少气,自汗声低,舌淡脉弱。其证候是

【答案】D

涉及考点 | 肺肾气虚、心肺气虚证

29. 假神的病机是

- A. 气血不足,精神亏损
B. 机体阴阳严重失调
C. 脏腑虚衰,功能低下
D. 精气衰竭,虚阳外越
E. 阴盛于内,格阳于外

【答案】D

【解析】久病、重病之人,精气本已极度衰竭,而突然出现某些神气暂时“好转”的虚假表现,是为假神。假神的出现,是因为脏腑精气极度衰竭,正气将脱,阴不敛阳,虚阳外越,阴阳即将离决所致,常是危重病人临终前的征兆。

涉及考点 | 假神

30. 气血两虚证的舌象表现为

- A. 舌体淡瘦
B. 舌淡齿痕
C. 舌尖芒刺
D. 舌暗瘀点
E. 舌红裂纹

【答案】A

【解析】当气血两虚时,气血不能濡养舌体,舌体失于濡养后出现瘦的表现。且因气血虚少,舌色呈现淡白。选项 B 项属脾虚,选项 C 项为心火,选项 D 项为血瘀,选项 E 项为热盛伤津。

涉及考点 | 舌形变化

87. 具有降逆止呕功效的药物是

- A. 白前
- B. 旋覆花
- C. 桔梗
- D. 前胡
- E. 白芥子

【答案】B

【解析】白前有降气化痰之功效。旋覆花降气化痰、降逆止呕。桔梗宣肺、祛痰、利咽、排脓。前胡降气化痰、疏散风热。白芥子温肺化痰、利气散结、通络止痛。

涉及考点 | 旋覆花的功效

88. 丹参治疗疮痍肿痛,其功效是

- A. 活血化瘀
- B. 凉血止血
- C. 凉血消痈
- D. 行气止痛
- E. 凉血活血

【答案】E

【解析】丹参属于活血调经药,其药性苦,微寒,归心,肝经。所以属于凉血活血药,适用于血热瘀滞者。

涉及考点 | 丹参的功效

2年 易错考题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 山茱萸
- B. 五倍子
- C. 莲子
- D. 诃子
- E. 金樱子

1. 具有补脾止泻,养心安神功效的药物是

【答案】C

2. 具有益肾固精,养心安神功效的药物是

【答案】C

【解析】山茱萸补益肝肾,收敛固涩;五倍子敛肺降火,止咳止汗,涩肠止泻,固精止遗,收敛止血,收湿敛疮;莲子补肾固精缩尿,补脾止泻止带,养心安神;诃子敛肺止咳,利咽开音,涩肠止泻;金樱子固精缩尿止带,涩肠止泻。

涉及考点 | 莲子的功效

(3~4 题共用备选答案)

- A. 肝、脾经
- B. 肝、肾经
- C. 肺、肝、肾经
- D. 心、脾经
- E. 肝、心、肾经

3. 熟地的归经是

【答案】B

4. 白芍的归经是

【答案】A

【解析】熟地和白芍都属于补血药,但是归经不同,功效也不同。熟地归肝、肾经,功效是

补血养阴,填精益髓;白芍归肝、脾经,功效是养血敛阴,柔肝定痛,平抑肝阳。

涉及考点 | 熟地、白芍的性味

(5~6 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A. 祛寒除湿 | B. 祛风止痒 |
| C. 养肝明目 | D. 活血止痛 |
| E. 温脾止泻 | |
5. 补骨脂具有的功效是

【答案】E

6. 菟丝子具有的功效是

【答案】C

【解析】补骨脂补肾助阳,固精缩尿,温脾止泻,纳气平喘。菟丝子补肾益精、固精缩尿、养肝明目、止泻、安胎,外用消风祛斑。

涉及考点 | 补骨脂、菟丝子的功效

(7~8 题共用备选答案)

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| A. 补肾助阳,固精缩尿,养肝明目 | B. 补肺益肾,纳气平喘,助阳益精 |
| C. 补肾阳,强筋骨,祛寒湿 | D. 补肾阳,强筋骨,祛风湿 |
| E. 补肝肾,强筋骨,止崩漏,续折伤,安胎 | |
7. 续断的功效是

【答案】E

8. 淫羊藿的功效是

【答案】D

【解析】续断药性苦、辛,微温,归肝、肾经,功效是补肝肾、强筋骨、止崩漏、续折伤、安胎;淫羊藿药性辛、甘,温,归肾、肝经,功效是补肾壮阳,祛风除湿。

涉及考点 | 续断、淫羊藿的功效

(9~10 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A. 合欢皮 | B. 酸枣仁 |
| C. 远志 | D. 琥珀 |
| E. 磁石 | |
9. 既能活血消肿,又能解郁安神的药物是

【答案】A

10. 既能活血散瘀,又能镇惊安神的药物是

【答案】D

【解析】合欢皮解郁安神,活血消肿;酸枣仁养心益肝,安神,敛汗;远志宁心安神,祛痰开窍,消散痈肿;琥珀镇惊安神,活血散瘀,利尿通淋;磁石镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气定喘。

涉及考点 | 合欢皮、琥珀的功效

(11~12 题共用备选答案)

- | | |
|--------------|-----------------|
| A. 杀虫,疗癣 | B. 清热解毒,凉血止血,杀虫 |
| C. 杀虫,解暑 | D. 杀虫消积,行气利水,截疟 |
| E. 杀虫,润肺下气止咳 | |

11. 槟榔的功效是

【答案】D

12. 百部的功效是

【答案】E

【解析】槟榔药性辛、苦，温，归胃、大肠经。其功效是杀虫消积，行气，利水，截疟。百部药性甘、苦，微温，归肺经。其功效是润肺下气止咳，杀虫灭虱。

涉及考点 | 槟榔、百部的功效

(13~14 题共用备选答案)

A. 胃热呕吐

B. 气逆呕吐

C. 胃虚呕吐

D. 胃寒呕吐

E. 妊娠呕吐

13. 生姜的主治病证是

【答案】D

14. 旋覆花的主治病证是

【答案】B

【解析】生姜属于解表药，具有解表散寒、温中止呕、温肺止咳、解鱼蟹毒的功效，可以治疗胃寒呕吐。旋覆花属于温化寒痰药，具有降气，消痰，行水，止呕的功效，可以治疗气逆呕吐。

涉及考点 | 生姜、旋覆花的主治

15. 具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛功效的药物是

A. 全蝎、蜈蚣

B. 地龙、僵蚕

C. 龙骨、牡蛎

D. 石决明、决明子

E. 天麻、钩藤

【答案】A

【解析】全蝎、蜈蚣的功效都是息风止痉，攻毒散结，通络止痛，两味药相须有协同增效作用，与题意相符。地龙与僵蚕都有息风之效；天麻与钩藤都有平息肝风止痉之效；龙骨与牡蛎都有重镇安神、平肝潜阳、收敛固涩之效，石决明与决明子都有清肝明目之效。

涉及考点 | 全蝎、蜈蚣的功效

16. 治疗外感风热，咳嗽痰多，咽痛音哑，胸闷不舒者，应首选

A. 百部

B. 川贝母

C. 桔梗

D. 杏仁

E. 旋覆花

【答案】C

【解析】百部主治新旧咳嗽，百日咳，蛲虫，排除选项 A。川贝母主治虚劳咳嗽，肺热燥咳，排除选项 B。杏仁主治咳嗽气喘，肠燥便秘，排除选项 D。旋覆花主治咳嗽痰多，痰饮蓄结，呕吐，排除选项 E。桔梗主治咳嗽痰多，胸闷不畅，咽喉肿痛，肺痛咳嗽。

涉及考点 | 桔梗的应用

17. 半夏的归经是

A. 心、脾、肾经

B. 肝、脾、肾经

C. 肺、胃、肾经

D. 心、肝、胃经

E. 肺、脾、胃经

【答案】E

【解析】半夏味辛、性温，有毒，归脾、胃、肺经。

涉及考点 | 半夏的归经

18. 治疗痰壅气逆，咳喘痰多，胸闷食少，甚则不能平卧，宜选用的药物是

- A. 紫苏子、白芥子、莱菔子
- B. 紫菀、款冬花、川贝母
- C. 桑叶、贝母、北沙参
- D. 杏仁、麻黄、甘草
- E. 麻黄、石膏、杏仁

【答案】A

【解析】紫苏子、白芥子、莱菔子用于痰壅气逆，咳喘痰多，胸闷食少，甚则不能平卧，选项 A 合适。紫菀、款冬花、川贝母用于肺热咳喘，排除选项 B。桑叶、贝母、北沙参，用于肺热或燥热伤肺，咳嗽痰少，色黄而黏稠，或干咳，咽痒等，排除选项 C。杏仁、麻黄、甘草，用于治疗风寒外束，肺气壅遏的喘咳实证，排除选项 D。杏仁、麻黄、石膏，用于肺热壅盛，高热喘急，排除选项 E。

涉及考点 | 紫苏子、白芥子、莱菔子的应用

19. 具有破血行气、消积止痛的药物是

- A. 马钱子
- B. 三棱
- C. 血竭
- D. 儿茶
- E. 自然铜

【答案】B

【解析】马钱子的功效是通络止痛，散结消肿。主治跌打损伤，骨折肿痛；风湿顽痹，麻木瘫痪；痈疽疮毒，咽喉肿痛。三棱的功效是破血行气，消积止痛，其破血力量较强，善于治疗血滞经闭以及癥瘕。血竭应用于跌打损伤；心腹疼痛；外伤出血；疮疡不敛。儿茶应用于跌仆伤痛；外伤出血；吐血衄血；疮疡不敛；湿疹；湿疮；牙疳；痔疮；肺热咳嗽。自然铜应用于跌打损伤；筋骨折伤；瘀肿疼痛。

涉及考点 | 三棱的功效

20. 桃仁的功效是

- A. 活血行气，润肠通便
- B. 活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘
- C. 活血止痛，解毒消痈
- D. 活血祛瘀，止咳平喘
- E. 行气活血，祛风止痛

【答案】B

【解析】桃仁属于活血调经药，其性苦甘平，归心肝大肠经，有活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘的功效，可以治疗血瘀证，肠燥便秘，咳嗽气喘的病症。

涉及考点 | 桃仁的功效

21. 善治血热便血、痔血及肝热目赤头痛的药物是

- A. 虎杖
- B. 槐花
- C. 小蓟
- D. 地榆
- E. 大蓟

【答案】B

【解析】虎杖主治湿热黄疸，淋浊，带下；水火烫伤，痈肿疮毒，毒蛇咬伤；经闭，癥瘕，跌打损伤；肺热咳嗽；热结便秘。槐花主治血热出血证；目赤，头痛。小蓟主治血热妄行的咯血、衄

血、吐血、尿血及崩漏；热毒痈肿。地榆主治下焦血热的便血、痔血、血痢、崩漏；烫伤、湿疹、疮疡痈肿等。大蓟主治血热出血证；热毒痈肿。

涉及考点 | 槐花的主治病证

22. 对绦虫疗效最佳的药物是

- | | |
|--------|--------|
| A. 使君子 | B. 苦楝皮 |
| C. 麦芽 | D. 稻芽 |
| E. 槟榔 | |

【答案】E

【解析】槟榔有杀虫、消积、行气、利水，截疟的功效，可用以肠道寄生虫病，本品驱虫谱广，用治绦虫症疗效最佳。故选 E。

涉及考点 | 槟榔的主治病证

23. 治疗夏伤暑湿，身热烦渴，小便不利，泄泻者，应首选

- | | |
|--------|-------|
| A. 茯苓 | B. 猪苓 |
| C. 金钱草 | D. 滑石 |
| E. 泽泻 | |

【答案】D

【解析】茯苓主治水腫，痰飲，脾虛泄瀉，心悸、失眠，排除选项 A。猪苓主治水腫，小便不利，泄瀉，排除选项 B。金钱草主治濕熱黃疸，石淋、熱淋；痈腫疔瘡、毒蛇咬傷，排除选项 C。泽泻主治水腫，小便不利，泄瀉，淋证，遺精，排除选项 E。滑石主治熱淋，石淋，尿熱疼痛，暑濕，濕溫，濕疹，痲子；滑石既能利水濕，又能解暑熱，是治療暑熱常用藥。

涉及考点 | 滑石的应用

24. 桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还具有的功效是

- | | |
|------------|---------|
| A. 清热安胎 | B. 利尿消肿 |
| C. 定惊止痉 | D. 温通经络 |
| E. 补肝肾，强筋骨 | |

【答案】E

【解析】桑寄生祛風濕，補肝腎，強筋骨，安胎；五加皮祛風濕，補肝腎，強筋骨，利水。桑寄生、五加皮除均可祛風濕外，還能補肝腎、強筋骨。

涉及考点 | 桑寄生、五加皮功效的共同点

25. 既能泻下逐水，又能去积杀虫的药物是

- | | |
|--------|--------|
| A. 槟榔 | B. 甘遂 |
| C. 使君子 | D. 牵牛子 |
| E. 京大戟 | |

【答案】D

【解析】槟榔杀虫消积，行气利水，截疟，排除选项 A。甘遂泻水逐饮，消肿散结，排除选项 B。使君子杀虫消积，排除选项 C。京大戟泻水逐饮，消肿散结，排除选项 E。牵牛子泻下逐水，去积杀虫。

涉及考点 | 牵牛子的功效

26. 既能清热燥湿，又能泻火解毒，尤善治疗痈疽疔疮的药物是

- | | |
|--------|--------|
| A. 决明子 | B. 生地黄 |
|--------|--------|

- C. 大血藤
E. 马勃
- D. 黄连

【答案】D

【解析】这几味药都属于清热药,其中黄连既能清热燥湿,又能泻火解毒,可用于治疗痈肿疔毒。决明子清热明目,润肠通便;马勃清热解毒,利咽,止血;生地黄清热凉血,养阴生津,均不适合治疗痈疽疔疮。大血藤是治疗肠痈的要药,但不能治疗疔疮。

涉及考点 | 黄连的应用

27. 黄芩具有而黄柏不具有的功效是

- A. 燥湿
C. 解毒
E. 退虚热
- B. 泻火
D. 清肺热

【答案】D

【解析】黄芩清热燥湿、泻火解毒、凉血止血、安胎。黄柏清热燥湿、泻火解毒、清退虚热。A、B、C 三个选项为两者同有功效;选项 D 为黄芩有而黄柏没有的功效;选项 E 为黄柏有而黄芩没有的功效。

涉及考点 | 黄芩、黄柏功效的不同点

28. 葛根的功效,以下说法错误的是

- A. 解肌退热
C. 透疹
E. 生津止渴
- B. 升阳止泻
D. 解痉

【答案】D

【解析】葛根是属于发散风热药。葛根具有解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒的作用。所以 D 是错误的。

涉及考点 | 葛根的功效

29. 具有收敛止血、止痢、截疟、补虚功效的药物是

- A. 苦楝皮
C. 侧柏叶
E. 三七
- B. 沙苑子
D. 仙鹤草

【答案】D

【解析】苦楝皮的功效是杀虫,疗癣。沙苑子的功效是补肾助阳,固精缩尿,养肝明目。侧柏叶的功效是凉血止血,化痰止咳,生发乌发。仙鹤草的功效是收敛止血,止痢,截疟,补虚。三七的功效是散瘀之血,消肿定痛。

涉及考点 | 仙鹤草的功效

涉及考点 | 麦门冬汤、旋覆代赭汤的配伍意义

(77~78 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A. 白术 | B. 泽泻 |
| C. 猪苓 | D. 滑石 |
| E. 茯苓 | |

77. 五苓散中起补气健脾作用的方剂是

【答案】A

78. 猪苓汤中起清热利水作用的方剂是

【答案】D

【解析】五苓散的功用是利水渗湿，温阳化气，方中重用泽泻为君，甘淡利水渗湿，臣以茯苓、猪苓淡渗，增强其利水渗湿之力，佐以白术，和茯苓健脾以运化水湿，佐以桂枝温阳化气以助利水，解表散邪以祛表邪。猪苓汤的功用是利水渗湿，养阴清热，方中猪苓为君，专以淡渗利湿，臣以泽泻、茯苓甘淡，增加猪苓利水渗湿之力，且泽泻性寒能泄热，茯苓尚可健脾运湿，佐以滑石甘寒，利水、清热两彰其功，阿胶滋阴润燥，既益已伤之阴，又防诸药渗利重伤阴血。

涉及考点 | 五苓散、猪苓汤的配伍意义

(79~80 题共用备选答案)

- | | |
|------------|-----------|
| A. 祛风湿止痛 | B. 祛风湿止痛 |
| C. 祛风胜湿清热 | D. 祛风胜湿化痰 |
| E. 祛风湿，补肝肾 | |

79. 九味羌活汤和羌活胜湿汤共同点是

【答案】B

80. 羌活胜湿汤和独活寄生汤共同点是

【答案】B

【解析】九味羌活汤的功用是发汗祛湿，兼清里热，主治外感风寒湿邪，内有蕴热证。羌活胜湿汤的功用是祛风、胜湿、止痛，主治风湿在表之闭证。九味羌活汤和羌活胜湿汤均可祛风胜湿、治头身痛。独活寄生汤的功用是祛风湿，止痹痛，益肝肾补气血主治痹证日久、肝肾两虚、气血不足证。羌活胜湿汤和独活寄生汤均可祛风胜湿止痛。

涉及考点 | 九味羌活汤、羌活胜湿汤、独活寄生汤的功用

2年 易错考题

1. 主治外感风寒湿邪，内有蕴热证的方剂是

- | | |
|--------------|----------|
| A. 败毒散 | B. 九味羌活汤 |
| C. 羌活胜湿汤 | D. 柴葛解肌汤 |
| E. 麻黄杏仁甘草石膏汤 | |

【答案】B

【解析】九味羌活汤以羌活为君，散表寒，祛风湿，利关节，止痹痛，为治太阳风寒湿邪在表之要药。以苍术、防风解表除湿为臣。细辛、白芷、川芎“分经论治”头痛，生地、黄芩清泄里热，以上五味俱为佐药。甘草调和为使。诸药配伍，既兼治内外，又属六经，协调表里而成发汗祛湿、兼清里热之剂。

E. 犀角地黄汤

【答案】E

【解析】犀角地黄汤治热入血分证。热入血分，一则热扰心神；二则热邪迫血妄行，血不循经，溢于脉外则出血，离经之血则为瘀血；三则血分热毒耗伤血中津液，而成瘀。此时不清其热则血不宁，不散其血则瘀不去，不滋其阴则火不息，故叶天士所谓“入血就恐耗血动血，直须凉血散血”，故组方配伍当以清热解毒，凉血散瘀为法。

涉及考点 | 犀角地黄汤的配伍意义

7. 仙方活命饮中的君药是

- A. 赤芍
B. 当归
C. 陈皮
D. 天花粉
E. 金银花

【答案】E

【解析】仙方活命饮主治痈疡肿毒初起。方中金银花善清热解毒疗疮，乃“疮疡圣药”，重用为君。

涉及考点 | 仙方活命饮的配伍意义

8. 治疗凉燥的代表方剂是

- A. 银翘散
B. 桂枝汤
C. 香薷散
D. 杏苏散
E. 小青龙汤

【答案】D

【解析】杏苏散属于清宣外燥剂，有清宣凉燥，理肺化痰的功效。可以治疗外感凉燥证。

涉及考点 | 杏苏散的主治证候

9. 下列各项中，既能治疗自汗又能治疗盗汗的是

- A. 四物汤
B. 归脾汤
C. 六味地黄丸
D. 肾气丸
E. 镇肝息风汤

【答案】B

【解析】归脾汤主治心脾气血两虚证之心悸怔忡，健忘失眠，盗汗食少；脾不统血证之便血，紫癜，崩漏，月经提前，或淋漓不止。其出处《正体类要》所写主治尚有跌仆损伤，自汗，大便不调。

涉及考点 | 归脾汤的主治

10. 配伍中体现“阳中求阴”之法的方剂是

- A. 百合固金汤
B. 八珍汤
C. 左归丸
D. 清瘟败毒饮
E. 右归丸

【答案】C

【解析】左归丸是张介宾由六味地黄丸化裁而成，去“三泻”，加入枸杞、龟板胶、牛膝加强滋补肾阴之力，又加入鹿角胶、菟丝子温润之品。以补阳益阴，阳中求阴，即所谓“善补阴者，必阳中求阴，则阳得阴生而泉源不竭”之义。配伍特点为纯补无泻，阳中求阴。

涉及考点 | 左归丸的全方配伍特点

11. 薄荷在逍遥散中的作用是

- A. 疏散肺经风热
- B. 透达肝经郁热
- C. 辛凉散邪利咽
- D. 清利头目利咽
- E. 辛凉解表疏肝

【答案】B

【解析】逍遥散属于调和肝脾剂，具有疏肝解郁，养血健脾的功效。方中加入薄荷少许，疏散郁遏之气，透达肝经郁热。

涉及考点 | 逍遥散的配伍意义

12. 以下除哪项外，均是独活寄生汤的功用

- A. 补气血
- B. 降浊气
- C. 祛风湿
- D. 益肝肾
- E. 止痹痛

【答案】B

【解析】独活寄生汤功能祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。主治痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。

涉及考点 | 独活寄生汤的功用

13. 下列哪项不是八正散主治证的症状

- A. 小便涩痛
- B. 小腹急满
- C. 恶心呕吐
- D. 舌苔黄腻
- E. 脉数有力

【答案】C

【解析】八正散功能清热泻火，利水通淋。主治湿热淋证。症见尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色浑赤，甚或癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

涉及考点 | 八正散主治

14. 越鞠丸中以行气为主的药物是

- A. 木香
- B. 沉香
- C. 香附
- D. 枳壳
- E. 厚朴

【答案】C

【解析】越鞠丸的药物组成：香附、川芎、山栀子、苍术、神曲。其中香附行气解郁以治气郁；川芎活血祛瘀以治血郁；栀子清热泻火以治火郁；苍术燥湿运脾以治湿郁；神曲消食导滞以治食郁。从越鞠丸的药物组成可排除 A、B、D、E 选项。

涉及考点 | 越鞠丸的配伍意义

15. 患者，男，43 岁。患乙型肝炎半年余，症见两胁胀满，口苦，食欲不振，有时欲呕，咽喉发干，舌苔薄白，脉弦。宜选何方治疗

- A. 四逆散
- B. 大柴胡汤
- C. 柴胡疏肝散
- D. 小柴胡汤
- E. 逍遥散

【答案】D

【解析】小柴胡汤的主治有七大症，是寒热往来，胸胁苦满，心烦喜呕，不欲饮食，口苦，咽

干,目眩。大柴胡汤应该具备承气汤的阳明证,柴胡疏肝散以气滞为主,而逍遥散应该有血虚之证,都不合适。

涉及考点 | 小柴胡汤的主治

16. 患者,男,28岁。高热烦躁,神昏谵语,口干舌燥,痰涎壅盛,舌绛,脉数。治宜选用
- A. 安宫牛黄丸
B. 苏合香丸
C. 紫雪
D. 牛黄清心丸
E. 至宝丹

【答案】A

【解析】选项 A 安宫牛黄丸长于清心解毒,常用于邪热内陷心包、痰热壅闭心窍之高热、神昏谵语;选项 B 治疗寒闭;选项 C 清热开窍,息风止痉;选项 D 超纲;选项 E 治疗痰热内闭心包证选项。

涉及考点 | 安宫牛黄丸功效

17. 下列各项,不属于苏合香丸主治证候的是
- A. 心腹猝痛
B. 高热烦躁
C. 牙关紧闭
D. 苔白
E. 脉迟

【答案】B

【解析】苏合香丸的主要症状表现是,突然昏倒,牙关紧闭,不省人事,苔白脉迟。亦治寒凝气滞,心腹猝痛,及痰厥等。

涉及考点 | 苏合香丸的主治症状

18. 血府逐瘀汤的臣药为
- A. 桃仁、生地
B. 桔梗、枳壳
C. 桃仁、红花
D. 生地、当归
E. 赤芍、川芎

【答案】E

【解析】血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。本方以活血化瘀、行气止痛为法。方中桃仁破血行滞润燥,红花活血祛瘀止痛,共为君药;赤芍、川芎助君药活血祛瘀,牛膝活血通经,祛瘀止痛,引血下行,共为臣药;生地、当归养血益阴,清热活血,桔梗、枳壳,一升一降,宽胸行气,柴胡疏肝解郁,升达清阳,与桔梗、枳壳同用,尤善理气行滞,使气行则血行,以上均为佐药;桔梗并能载药上行,兼有使药之用,甘草调和诸药,亦为使药。

涉及考点 | 血府逐瘀汤的配伍意义

19. 咳血方主治证的病机是
- A. 肝火犯肺,灼伤肺络
B. 脾阳不足,统血失常
C. 阴虚火旺,损伤肺络
D. 血热妄行,损伤肺络
E. 心脾两虚,气不摄血

【答案】A

【解析】咳血方清火化痰,敛肺止咳,主治肝火犯肺,灼伤肺络。

涉及考点 | 咳血方的主治证候

20. 食积属湿热积滞者,宜选用
- A. 保和丸
B. 乌梅丸

- C. 香连丸
E. 健脾丸

D. 枳实导滞丸

【答案】D

【解析】本题所有选项均可用于治疗泻痢。保和丸主治食积。乌梅丸主治蛔厥证。香连丸主治湿热痢疾。枳实导滞丸主治湿热食积。健脾丸主治脾虚食积证。

涉及考点 | 枳实导滞丸的主治证候

(21~22 题共用备选答案)

- A. 枳实消痞丸
C. 半夏厚朴汤
E. 柴胡疏肝散

B. 金铃子散
D. 天台乌药散

21. 具有行气散结,降逆化痰功用的方剂是

【答案】C

22. 具有行气疏肝,散寒止痛功用的方剂是

【答案】D

【解析】半夏厚朴汤的功用是行气散结、降逆化痰。所以 23 题选 C 选项。枳实消痞丸的功用是消痞除满、健脾和胃。金铃子散的功用是疏肝泄热、活血止痛。天台乌药散的功用是行气疏肝、散寒止痛。所以 24 题选 D 选项。柴胡疏肝散的功用是疏肝行气、活血止痛。

涉及考点 | 半夏厚朴汤、天台乌药散的功用

(23~24 题共用备选答案)

- A. 防风
C. 白芷
E. 羌活

B. 细辛
D. 川芎

23. 川芎茶调散中偏于治阳明经头痛的药物是

【答案】C

24. 川芎茶调散中偏于太阳经头痛的药物是

【答案】E

【解析】川芎茶调散主治外感风邪头痛。李东垣谓“头痛须用川芎,如不愈,各加引经药,太阳羌活,阳明白芷”。方中川芎长于治疗少阳、太阳经头痛;羌活长于治疗太阳经头痛;白芷长于治疗阳明经头痛;细辛长于治疗少阴经头痛。

涉及考点 | 川芎茶调散的配伍意义

(25~26 题共用备选答案)

- A. 桂枝汤
C. 小建中汤
E. 补中益气汤

B. 归脾汤
D. 当归补血汤

25. 劳倦内伤,气血俱乏,营卫失调,手足烦热,咽干口燥,舌淡苔白,脉细弦者,治宜选用

【答案】C

26. 产后血虚,发热头痛,肌热面赤,烦渴欲饮,脉大而虚者,治宜选用

【答案】D

【解析】小建中汤主治虚劳里急证,症见手足烦热。舌淡苔白,脉细弦。其病机特点是气血俱乏。当归补血汤主治血虚发热证,症见肌热面赤,烦渴欲饮,脉大而虚,亦治产后血虚,发

热头痛。

涉及考点 | 小建中汤主治、当归补血汤主治

(27~28 题共用备选答案)

- A. 胡麻仁、阿胶、麦冬、生地
B. 白芍、阿胶、麦冬、当归
C. 胡麻仁、阿胶、麦冬
D. 胡麻仁、当归、生地
E. 生地、玄参、麦冬、白芍

27. 清燥救肺汤中所用的养阴药是

【答案】C

28. 消风散中所用的补血活血药是

【答案】D

【解析】清燥救肺汤中养阴药为胡麻仁、阿胶、麦冬。消风散重用荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子为君,其他补血活血药为当归、胡麻仁、生地,以补血活血,凉血止痒。

涉及考点 | 清燥救肺汤、消风散组成及含义

金英杰医学教育

- A. 肝风上扰
B. 痰浊中阻
C. 肝火亢盛
D. 阴虚阳亢
E. 肝肾阴虚

【答案】E

【解析】肾阴亏虚，水不涵木，肝阳上亢，则头晕耳鸣；虚热内扰，五心烦热，舌红少苔，脉细数，为阴虚内热之征。据此判断其证型是肝肾阴虚。

涉及考点 | 原发性高血压的辨证论治

125. 患者，男，53岁。头晕头痛，目眩，面红目赤，烦躁，口苦，便秘，小便短赤，舌质红苔薄黄，脉弦细有力。血压 170/100 mmHg(22.6/13.2 kPa)。其治法是

- A. 滋阴降火
B. 平肝潜阳
C. 滋阴补阳
D. 化痰胜湿
E. 镇肝息风

【答案】B

【解析】患者头晕头痛，目眩，面红目赤，烦躁，口苦，便秘，小便短赤，舌红苔黄，脉弦细有力，都是肝阳上亢证的临床表现。治法是平肝潜阳。

涉及考点 | 原发性高血压的辨证论治

126. 患者，男，48岁。十二指肠溃疡病史 20 年，近感头痛，眩晕二就诊。检查：血压 160/100 mmHg(21/12 kPa)。下列降压药应慎用的是

- A. 可乐定
B. 利血平
C. 胍屈嗪
D. 氢氯噻嗪
E. 卡托普利

【答案】B

【解析】临床上在对高血压伴有溃疡病的治疗时应慎用利血平，因其可以诱发或加重溃疡。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

2年 易错考题

1. 肺动脉高压早期的 X 线表现是

- A. 双肺纹理增多
B. 双肺透亮度增加
C. 右下肺主动脉干增宽
D. 右心房肥大
E. 右心室肥厚、扩张

【答案】C

【解析】肺动脉高压早期的 X 线表现为右下肺动脉干扩张，其横径 ≥ 15 mm；横径与气管横径的比值 ≥ 1.07 ；肺动脉段明显突出，或其高度 ≥ 3 mm；右心室肥大征。

涉及考点 | 肺动脉高压早期的 X 线表现

2. 患者，女，26岁。产后第 3 天出现寒战，高热，腰痛，尿痛，下腹痛。检查：肾区叩击痛，耻骨上压痛，尿白细胞 30 个/高倍视野，尿蛋白(+)，血白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性 0.86。其诊断是

- A. 败血症
B. 肾结核



配套名师高清视频

- C. 急性肾盂肾炎
E. 急性肾小球炎

D. 急性膀胱炎

【答案】C

【解析】急性肾盂肾炎的临床表现:发热、寒战、头痛、全身酸痛等,体温多在 38℃ 以上,多为弛张热,也可呈稽留热或间歇热;泌尿系症状有尿频、尿急、尿痛、排尿困难、下腹部疼痛、腰痛等;腰痛程度不一,多为钝痛或酸痛;常规检查可见尿中有白细胞、血细胞、蛋白。

涉及考点 | 肾盂肾炎的诊断

3. 患者,女,35 岁。寒战发热、腰痛伴尿频、尿痛 2 天。尿常规检查:红细胞(+++),白细胞(+++),尿蛋白(+),血常规检查:白细胞计数增高。应首先考虑的诊断是

- A. 急性肾盂肾炎
C. 急性肾炎
E. 肾脓肿

B. 急性膀胱炎
D. 肾结核

【答案】A

涉及考点 | 肾盂肾炎的诊断

4. 治疗有机磷农药中毒毒蕈碱样症状的药物是

- A. 阿托品
C. 利多卡因
E. 双复磷

B. 氯解磷定
D. 甲硝唑(灭滴灵)

【答案】A

【解析】阿托品主要作用于外周 M 受体,能缓解毒蕈碱样症状(M 样症状)。

涉及考点 | 有机磷杀虫药中毒的治疗

5. 患者查体发现尿糖(+++),为明确诊断,应进一步检查

- A. 24 小时尿糖定量
C. 血脂
E. 葡萄糖耐量试验

B. 空腹血糖
D. 肾功能

【答案】B

涉及考点 | 糖尿病的诊断

6. 患者,男,65 岁。常于安静时突发胸骨后疼痛,每次约半小时,含硝酸甘油片不能缓解。心电图示有关导联 ST 段抬高。诊断为心绞痛,其类型是

- A. 稳定型
C. 卧位型
E. 恶化型

B. 变异型
D. 中间型

【答案】B

【解析】变异型心绞痛常于安静时突发胸骨后疼痛,疼痛时间延长,含硝酸甘油片不能缓解。心电图示有关导联 ST 段抬高。

涉及考点 | 变异型心绞痛的诊断

7. 患者,男,74 岁。胸痛反复发作 2 年。2 小时前,胸痛再次发作,持续不缓解,烦躁不安,大汗淋漓。经检查诊断为急性前间壁心肌梗死。其心电图特征性改变出现的导联

- A. V₁、V₂、V₃
C. V₁、V₂、V₃、V₄、V₅

B. II、III、aVF
D. V₁、V₂、V₃、aVF、II、III

E. V_5 、 V_6 、 V_7

【答案】A

【解析】前间壁心肌梗死特征性心电图改变,常常表现在 V_1 、 V_2 、 V_3 导联;前壁心梗表现在 V_3 、 V_4 、 V_5 导联;前侧壁心梗表现在 V_4 、 V_5 、 V_6 导联;广泛前壁心梗表现在 V_1 ~ V_6 导联;下壁心梗表现在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联;后壁心梗表现在 V_7 ~ V_9 导联上。

涉及考点 | 前间壁心肌梗死特征性心电图的改变

8. 患者,男,50岁。急性心肌梗死第2天,少尿,血压80/50 mmHg,烦躁不安,面色苍白,表情淡漠,皮肤湿冷,大汗淋漓,脉细弱无力。应首先考虑的是

- A. 左心衰竭
B. 急性肾衰竭
C. 心肌梗死后综合征
D. 低血糖反应
E. 心源性休克

【答案】E

【解析】患者因心梗引起泵衰竭,导致有效循环血量不足,出现血压下降、皮肤湿冷、大汗淋漓等症状,因此应首先考虑心源性休克。

涉及考点 | 心源性休克的诊断

9. 患者,男,23岁。先天性心脏病致心力衰竭,应用强心苷疗效不显著。可试换用的药物是

- A. 氯化钙
B. 阿托品
C. 卡托普利
D. 肾上腺素
E. 异丙肾上腺素

【答案】C

【解析】当先天性心脏病致心力衰竭应用强心苷疗效不显著时,可试换卡托普利。卡托普利为血管紧张素转换酶抑制剂,除了发挥扩血管作用改善心衰时的血流动力学、减轻淤血症状外,更重要的是可降低心衰患者代偿性神经-体液因素的不利影响,限制心肌、小血管的重塑,以达到维护心肌功能,推迟充血性心力衰竭的进展,降低远期死亡率的目的。

涉及考点 | 心力衰竭的治疗

10. 患者,男,58岁。高血压病史20年,近1年常常心慌,气短。昨夜睡眠中突然憋醒,胸闷,咳嗽,气喘,急诊入院。经检查诊断为急性肺水肿,左心衰竭。治疗宜用

- A. 肾上腺素
B. 异丙肾上腺素
C. 东莨菪碱
D. 吗啡
E. 以上均非

【答案】D

【解析】患者有高血压病史,又突发急性肺水肿、左心衰竭。吗啡有舒张心肌的作用,防止呼吸肌痉挛出现呼吸衰竭。肾上腺素及异丙肾上腺素均具有升压作用,故高血压患者慎用;东莨菪碱对呼吸中枢的兴奋作用明显,但对左心衰竭无治疗作用。

涉及考点 | 左心衰竭的治疗

11. 患者,女,19岁。春季旅游途中突然胸闷,呼吸困难,大汗。查体:口唇稍发绀,呼吸急促,听诊双肺布满干啰音,心律95次/分。既往有类似发作,有时休息后可缓解。应首先考虑的是

- A. 过敏性休克
B. 支气管哮喘

- C. 喘息性支气管炎
E. 癔症

D. 心源性哮喘

【答案】B

【解析】支气管哮喘的临床表现为发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难或发作性胸闷和咳嗽。有些青少年,其哮喘症状表现为运动时出现胸闷、咳嗽和呼吸困难。可见发作时胸部呈过度充气状态,有广泛的哮鸣音,呼气音延长。心率增快、奇脉、胸腹反常运动和发绀常出现在严重哮喘患者中。本题中患者口唇稍发绀,呼吸急促,听诊双肺布满干啰音,心律 95 次/分,既往有类似发作史,有时休息后可缓解,应首先考虑支气管哮喘。

涉及考点 | 支气管哮喘的诊断

12. 患者,男,52 岁。患支气管哮喘 20 余年,冠心病 6 年。5 月 1 日游园时突感咽痒,胸闷憋气,很快出现呼吸困难而送至医院急诊。查体:端坐呼吸,口唇发绀,桶状胸,心率 108 次/分,肺动脉瓣第二心音大于动脉瓣第一心音,双肺满布哮鸣音,舌暗红苔薄黄,脉弦滑。其诊断是

- A. 实喘
C. 热哮
E. 以上均非

- B. 虚喘
D. 寒哮

【答案】C

【解析】根据症状,辨为痰热壅阻气道,肺失清肃,所以可诊断为热哮。

涉及考点 | 哮喘的分型



13. 患者,男,21 岁。呼吸困难,咳嗽,汗出 1 小时而就诊。查体:端坐呼吸,呼吸急促,口唇微绀,心率 114 次/分,律不齐,双肺布满哮鸣音。为迅速缓解症状,应立即采取的最佳治法是

- A. 口服氨茶碱
C. 喷吸沙丁胺醇
E. 口服阿托品

- B. 肌注氨茶碱
D. 口服泼尼松

【答案】C

【解析】缓解哮喘发作的药物主要作用为舒张支气管。首选吸入法,因药物吸入气道直接作用于呼吸道,局部浓度高且作用迅速,所用剂量较小,全身不良反应少,临床常用沙丁胺醇缓解症状。

涉及考点 | 支气管哮喘的治疗

14. 患者,男,65 岁。体胖,有高血压和糖尿病史。饱餐后突感心前区闷痛,伴有气短痰多,纳呆恶心,含服硝酸甘油 2 分钟疼痛缓解。舌苔浊腻,脉滑。心电图示 $V_3 \sim V_6$ 导联 T 波倒置,心肌酶谱正常。应首先考虑的诊断是

- A. 冠心病心绞痛心血瘀阻证
C. 心肌梗死气滞血瘀证
E. 冠心病心绞痛气虚血瘀证

- B. 冠心病心绞痛痰浊内阻证
D. 心肌梗死寒凝心脉证

【答案】B

【解析】患者饱餐后突感心前区闷痛,伴有气短痰多,纳呆恶心,含服硝酸甘油 2 分钟疼痛缓解,且舌苔浊腻,脉滑,应属于痰浊内阻。心肌梗死的疼痛部位与心绞痛相仿,但性质更剧烈,持续可达数小时,含服硝酸甘油多不能缓解。

涉及考点 | 心绞痛的辨证论治

15. 患者,女,62岁。有冠心病心绞痛史1年。今天上午情绪激动后胸痛再次发作。查体:血压160/70 mmHg,心率100次/分。心电图示窦性心动过速、房性早搏、ST段下降0.1 mV。为迅速缓解症状应首先考虑的治疗是

- A. 消心痛含服
- B. 普鲁帕酮静注
- C. 利多卡因静注
- D. 硝酸甘油含服
- E. 阿司匹林口服

【答案】D

【解析】冠心病心绞痛急性发作时,为迅速缓解症状应首先考虑的治疗药物是硝酸甘油,可用0.3~0.6 mg,置于舌下含化,迅速被唾液溶解而吸收,1~2分钟即开始起作用。

涉及考点 | 冠心病心绞痛急性发作的治疗

16. 患者,女,75岁。胸痛持续剧烈,甚则心痛彻背,背痛彻心,动则加重,神疲乏力,气短懒言,心悸自汗,舌体胖大有齿痕,舌质暗淡,苔薄白,脉细弱无力。诊断为急性前壁心肌梗死,其证型是

- A. 气阴亏损
- B. 心肾阳虚
- C. 心脾两虚
- D. 气虚血瘀
- E. 心肺气虚

【答案】D

【解析】根据症状其病机是素体阳虚,阴寒凝滞,气血痹阻,心阳痹阻,其证型属于气阳虚衰,寒凝心络。

涉及考点 | 心肌梗死的辨证论治

17. 患者胸闷憋气,心痛频发,四肢厥逆,大汗淋漓,面色苍白,口唇发绀,手足青至节,虚烦不安,神志淡漠,舌质青紫,脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

- A. 人参养荣汤合左归饮
- B. 炙甘草汤合生脉散
- C. 参附龙牡汤
- D. 苓桂术甘汤合左归丸
- E. 苏合香丸合左归饮

【答案】C

【解析】诊断为心肌梗死的心阳欲脱证。当治以回阳救逆,益气固脱。用参附龙牡汤治疗。

涉及考点 | 心肌梗死的辨证论治

18. 患者,男,68岁。陈旧性心肌梗死病史,近日劳累后心悸,气短咳喘,乏力。动则加剧,神疲,腰膝酸软,舌红,苔少,脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 葶苈大枣泻肺汤
- B. 苓桂术甘汤
- C. 生脉散
- D. 真武汤
- E. 养心汤合补肺汤

【答案】C

【解析】根据症状辨证为气阴两虚型,方选生脉散加减。A与D合用适用于阳虚水泛证,其余选项均不是心肌梗死的适用方剂。

涉及考点 | 心肌梗死的辨证论治

19. 患者,女,59岁。近1月常感心悸心慌,自测脉搏间歇,动则加剧,汗出倦怠,面色苍

白,形寒肢冷,舌淡苔白,脉沉细而数。其中医治法是

- A. 补血养心,益气安神
- B. 温补心阳,通脉定悸
- C. 益气养阴,养心安神
- D. 镇惊定志,养心安神
- E. 滋阴清火,养心安神

【答案】B

【解析】患者心悸心慌,脉搏有间歇,坐卧不安,动则加剧,时有突然昏倒,汗出倦怠,面色苍白,四末欠温,舌淡苔白,脉象虚弱。此为心气虚而导致的心阳不足证,心阳虚衰无以温养心神,治法应以温补心阳,通脉定悸为主。

涉及考点 | 缓慢性心律失常的辨证论治

20. 患者,女,50岁。胃脘胀痛,痛窜两胁,每因情志不舒而加重,暖气嘈杂,舌淡,脉弦缓。经胃镜检查诊断为慢性浅表性胃炎。治疗应首先考虑的方剂是

- A. 四君子汤加减
- B. 益胃汤加减
- C. 失笑散合丹参饮加减
- D. 柴胡舒肝散加减
- E. 三仁汤加减

【答案】D

【解析】患者胃脘胀痛,痛窜两胁,因情志不舒而加重,暖气嘈杂,舌淡,脉弦缓,属于肝气郁滞证。治疗应疏肝行气,活血止痛,首先考虑的方剂是柴胡舒肝散加减。四君子汤主治脾胃气虚;益胃汤主治胃阴损伤;失笑散合丹参饮主治气血瘀滞之心胃诸痛;三仁汤主治湿温初起,湿重于热者。

涉及考点 | 慢性浅表性胃炎的治疗

21. 患者,男,55岁。右上腹胀痛、消瘦2个月,发热1周。查体:体温38.5℃,皮肤巩膜轻度黄染,肋下3.0cm触及,质硬,表面有结节。最有助于确诊的检查是

- A. 腹部B
- B. 血清AFP定性
- C. 腹部CT
- D. 肝穿刺病理检查
- E. 异常凝血酶原检查

【答案】D

【解析】临床上最有助于肝癌确诊的检查是肝穿刺病理检查。

涉及考点 | 肝癌的辅助检查

22. 患者,女,21岁。寒战高热,腰痛,尿频、尿急,灼热刺痛,舌红苔黄,脉濡数。检查:体温38℃,双肾区叩击痛,血白细胞 $19.5 \times 10^9/L$ 。治疗应首选

- A. 氨苄西林加八正散
- B. 诺氟沙星加易黄散
- C. 诺氟沙星加龙胆泻肝汤
- D. 庆大霉素加萆薢分清饮
- E. 庆大霉素加知柏地黄汤

【答案】A

【解析】根据症状判断该患者是肾盂肾炎膀胱湿热证,所以应用八正散进行治疗。常用药物如氨苄西林、头孢噻肟钠、头孢曲松钠、左氧氟沙星等。

涉及考点 | 尿路感染的治疗

23. 患者,男,40岁。颅脑术后第5天,但持续高热4天,全身浮肿,近2天每日尿量不足1000ml,血尿素氮260mmol/L,血肌酐 $>740 \mu\text{mol/L}$,血钾6.6mmol/L。其诊断是

- A. 急性肾衰竭
- B. 休克

- C. 心力衰竭
D. 肝肾综合征
E. 以上均非

【答案】A

【解析】肾衰竭的诊断标准为：①症状：急性少尿（ $<400\text{ ml}/24\text{h}$ ），或无尿（ $<100\text{ ml}/24\text{h}$ ），烦躁、嗜睡、意识障碍。②体征：水肿、高血压。③肾功能：血尿素氮、血肌酐进行性上升，血钾 $>6.5\text{ mmol/L}$ ，酸碱平衡紊乱。据症状和体征可以诊断此病为急性肾衰竭。

涉及考点 | 急性肾衰竭的诊断

24. 风湿性心脏瓣膜病并发栓塞，最常见于
- A. 二尖瓣狭窄合并心力衰竭
B. 二尖瓣狭窄合并心房纤颤
C. 二尖瓣关闭不全合并心力衰竭
D. 二尖瓣关闭不全合并主动脉瓣关闭不全
E. 二尖瓣狭窄合并关闭不全

【答案】B

【解析】风湿性心脏瓣膜病并发栓塞，最常见于二尖瓣狭窄合并心房纤颤。

涉及考点 | 风湿性心脏瓣膜病并发栓塞的病因

25. 下列各项中，不属于缺铁性贫血诊断依据的是
- A. 血清铁浓度降低
B. 血清铁蛋白降低
C. 小细胞低色素性贫血
D. 总铁结合力降低
E. 转铁蛋白饱和度 $<15\%$

【答案】D

【解析】缺铁性贫血的诊断包括以下五方面：①贫血为小细胞低色素性，男性 $\text{Hb}<120\text{ g/L}$ ，女性 $\text{Hb}<110\text{ g/L}$ ，孕妇 $\text{Hb}<100\text{ g/L}$ 。②血清铁浓度低于正常。③血清铁蛋白 $<12\text{ }\mu\text{g/L}$ 。④骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失，铁粒幼红细胞少于 15% ，转铁蛋白饱和度 $<15\%$ ；⑤存在铁缺乏的病因，铁剂治疗有效。

涉及考点 | 缺铁性贫血的诊断

26. 上消化道大出血患者出现外周血液血红蛋白下降的时间一般是
- A. 即时
B. 半小时
C. 1小时
D. 2小时
E. 3~4小时后

【答案】E

【解析】出血早期血象无明显改变，一般3~4小时后可出现不同程度的贫血。

涉及考点 | 上消化道出血的临床表现

27. 下列各项，对左心衰竭没有诊断意义的是
- A. 咳吐粉红色泡沫样痰
B. X线检查见肺门蝶状阴影
C. 端坐呼吸
D. 漂浮导管检查 $\text{PCWP}>12\text{ mmHg}$
E. 心电图Ⅱ导联P波高尖， $\geq 0.25\text{ mV}$

【答案】E

【解析】左心衰竭的诊断标准有咳吐粉红色泡沫样痰、X线检查见肺门蝶状阴影、端坐呼吸、漂浮导管检查 $\text{PCWP}>12\text{ mmHg}$ 等。而心电图P波高尖， $\geq 0.25\text{ mV}$ ，以Ⅱ、Ⅲ、aVF突出，称为肺性P波，属于右房肥大的特征。

涉及考点 | 左心衰竭的诊断

28. 急性心肌梗死最常见的心律失常是

- A. 房性早搏或心房纤颤
- B. 室性早搏
- C. 房室传导阻滞
- D. 预激综合征
- E. 右束支传导阻滞

【答案】B

【解析】急性心肌梗死最常见的心律失常是室性早搏或室性心动过速。

涉及考点 | 急性心肌梗死最常见的并发症

29. 下列哪项不能作为糖尿病确诊的依据

- A. 多次空腹血糖 ≥ 7.8 mmol/L
- B. 尿糖(++)
- C. 多次餐后血糖 > 11.1 mmol/L
- D. 葡萄糖耐量试验 1 小时和 2 小时血糖均 > 11.1 mmol/L
- E. 无“三多一少”症状, 血糖多次在 7.8~11.1 mmol/L 之间

【答案】B

【解析】糖尿病的诊断标准有多次空腹血糖 ≥ 7.8 mmol/L, 或餐后血糖为 11.1 mmol/L; 或糖尿病症状加任意时间血糖 11.1 mmol/L, 或 FPG ≥ 7.0 mmol/L, 或 OGTT 2 小时 PG ≥ 11.1 mmol/L。OGTT 2 小时 PG < 7.7 mmol/L 为正常糖耐量; 7.8~11.0 mmol/L 为 IGT; ≥ 11.1 mmol/L 应考虑糖尿病。偶然尿糖增高不能作为糖尿病的诊断依据, 只能作为参考。

涉及考点 | 糖尿病的诊断

2年 易错题



配套名师高清视频

1. 下列各项,宜采用透托法的是

- A. 急性脓肿,毒盛正气不衰
- B. 肿疡已成,正气已虚
- C. 肿疡初起
- D. 溃瘍脓出不畅
- E. 溃瘍后期,疮口不敛

【答案】A

【解析】透托法用于毒气盛而正气未衰者,可用透脓的药物,促其早日脓出毒泄,肿消痛减,以免脓毒旁窜深溃。A符合透托法的病机,B应考虑用补法,C应用消法,D可用补托法,E应用补法。

涉及考点 | 透托法的适用范围

2. 金黄散主要适用于

- A. 阳证溃瘍
- B. 阴证溃瘍
- C. 溃后生肌
- D. 半阴半阳证
- E. 阳证疮疡

【答案】E

【解析】金黄散可清热除湿,散瘀化痰,止痛消肿,用于溃瘍疮疡阳证。溃瘍阴证多选用回阳玉龙散,半阴半阳证则可选用冲和膏等。

涉及考点 | 金黄散的适应证

3. 外科红灵丹主要适用于

- A. 脓肿初起
- B. 溃瘍阴证
- C. 一切阳证未溃者
- D. 一切阴证
- E. 溃后生肌

【答案】C

【解析】红灵丹由雄黄、乳香、没药、朱砂等9味药组成,功能活血止痛,消坚化痰,适用于一切痈疽未溃属阳者。阴证及溃瘍已溃者都为红灵丹的禁用证或慎用证。

涉及考点 | 红灵丹的适应证

4. 一切溃瘍或烧伤之腐肉未脱,新肉未生的外治首选方是

- A. 金黄油膏
- B. 冲和油膏
- C. 生肌玉红膏
- D. 回阳玉龙膏
- E. 青黛散油膏

【答案】C

【解析】A长于除湿化痰,对肿而有结块,尤其是急性炎症控制后形成的慢性迁延性炎症更为适宜。B具有活血止痛、祛风散寒作用,适用于半阴半阳证。C功能活血祛腐,解毒止痛,润肤生肌收口,适用于一切溃瘍腐肉未脱、新肉未生之症,或日久不能收口者。D有温经散寒、活血化瘀的作用,适用于阴证。E功能收湿止痒、清热解毒,适用于蛇串疮及急、慢性湿疮等。

涉及考点 | 生肌玉红膏的适应证

5. 首选用于治疗疮疡阳证的外用药物是

- A. 阳和油膏
- B. 冲和油膏

- C. 玉露油膏
E. 回阳玉龙膏

D. 生肌白玉膏

【答案】C

【解析】阳和油膏适用于疮疡初起脓未成。冲和油膏具有活血止痛；祛风散寒的作用，适用于半阴半阳证。玉露油膏适用于疮疡阳证，对红灼热明显、肿势散漫者效果更佳。生肌白玉膏润肤生肌收敛，适用于溃疡已净，疮口不敛者。回阳玉龙膏有温经散寒、活血化瘀的作用，适用于阴证。

涉及考点 | 玉露油膏的适应证

6. 益胃汤适宜治疗疮疡的

- A. 气血两虚证
C. 热盛伤津证
E. 湿伤脾胃证

- B. 阴伤胃虚证
D. 瘀血流注证

【答案】B

【解析】益胃汤养胃益阴，用于疮疡阴伤胃虚者。气血两虚证应首选补益气血方；热盛伤津证治疗应选清热益津方；瘀血流注证的治疗重在活血化瘀；湿伤脾胃证治疗应以健脾祛湿为主。

涉及考点 | 益胃汤的适应证

7. 首选用于治疗溃疡疮口过小，脓水不易排出，或已形成瘻管、窦道的外科手术疗法是

- A. 烙法
C. 浸渍法
E. 药线引流

- B. 垫棉法
D. 结扎法

【答案】E

【解析】烙法适用于甲下瘀血、四肢深部溃疡、疔、痈、赘疣、息肉，以及创伤出血等。垫棉法适用于溃疡脓出不畅有袋脓者，或疮口窦道形成脓水不易排尽者，或溃疡脓腐已尽，新肉已生，但皮肉一时不能黏合者。浸渍法适用于阳证疮疡初起溃后、半阴半阳证及阴证疮疡。药线引流法适用于溃疡疮口过小，脓水不易排除者，或已成瘻管、窦道者。

涉及考点 | 外科手术疗法的适用范围

8. 外科辨证中，辨脓的操作方法不包括

- A. 接触法
C. 点压法
E. 切开法

- B. 透光法
D. 穿刺法

【答案】E

【解析】确认成脓的方法：①接触法。②透光法。③点压法。④穿刺法。⑤B超。

涉及考点 | 确认成脓的方法

9. 患者，女，36岁，颈前肿块，边界清楚并有完整包膜，可随吞咽移动，确诊甲状腺瘤，中医治疗首选方剂为

- A. 海藻玉壶汤
C. 四海舒郁丸
E. 逍遥散

- B. 五海瘰疬丸
D. 柴胡清肝饮

【答案】A

【解析】甲状腺腺瘤属于中医“瘰疬”的范畴,首选方剂以海藻玉壶汤为主。辨证为肝郁气滞证者药用逍遥散合海藻玉壶汤加减。痰凝血瘀证者用海藻玉壶汤合神效瓜蒌散加减。肝肾亏虚证者用知柏地黄丸合海藻玉壶汤加减。

涉及考点 | 甲状腺腺瘤的中医治疗

10. 患者,女,20岁。左乳外上方有一圆形肿块,质地坚韧,表面光滑,活动度较好,边界清,无压痛。应首先考虑的诊断是

- A. 乳发
- B. 乳痈
- C. 乳癌
- D. 乳癖
- E. 乳核

【答案】E

【解析】乳痈又名乳发,相当于西医的急性化脓性乳腺炎,其特点为乳房局部结块,红肿热痛,并有恶寒发热等全身症状。乳癌常见乳房肿块,无痛,质地较硬,与周围组织分界不清楚,表面不光滑,活动度小,少数患者伴有疼痛或不适。乳癖相当于西医学的乳腺增生,特点为单侧或双侧乳房出现肿块,疼痛,乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关。乳核相当于西医学的乳房纤维腺瘤,其特点为形如丸卵,边界清楚,表面光滑,推之活动,无压痛。根据患者临床表现应首先考虑为乳核。

涉及考点 | 乳核的诊断

11. 首选用于治疗急性乳腺炎,肝胃郁热证的方剂是

- A. 托里消毒散
- B. 普济消毒饮
- C. 瓜蒌牛蒡汤
- D. 柴胡清肝汤
- E. 五味消毒饮

【答案】C

【解析】急性乳腺炎肝胃郁热证,治当疏肝清胃,通乳散结,方用瓜蒌牛蒡汤。

涉及考点 | 急性乳腺炎肝胃郁热证

12. 患者,女,26岁。左乳房发现肿块1年,无疼痛。查体:左乳外下象限可扪及1.5~2.5 cm大小的肿块,形如鸡卵,表面光滑,活动度好,应首先考虑的是

- A. 乳腺增生病
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房结核
- D. 乳腺癌
- E. 乳腺导管内乳头状瘤

【答案】B

【解析】乳腺导管内乳头状瘤症状跟乳房纤维腺瘤很相似,但大多数患者会出现乳头溢液。

涉及考点 | 乳房纤维腺瘤的诊断

13. 大疱型带状疱疹的直径为

- A. >1 cm
- B. >0.5 cm
- C. >3 cm
- D. >2 cm
- E. >2.5 cm

【答案】A

【解析】若皮损为大疱,直径超过1 cm者称大疱型带状疱疹。

涉及考点 | 皮肤及性传播疾病

14. 患者,女,26岁。右前臂圆形肿物如指头大小,质硬,表面光滑,边缘清楚,无粘连,活动度大。诊断应首先考虑为

- A. 粉瘤
- B. 脂肪瘤
- C. 神经纤维瘤
- D. 纤维瘤
- E. 血管瘤

【答案】D

【解析】纤维瘤硬者具有包膜,切除后不易复发,不发生转移。其生长缓慢,大小不定,实性,圆形,质硬,光滑,界清,无粘连,活动度大,无压痛,很少引起压迫和功能障碍。

涉及考点 | 纤维瘤的特点

15. 患者,男,52岁。腹痛,腹胀,嗝气,恶心,呕吐,便血;右下腹触及肿块,舌紫暗有瘀斑,脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A. 桃红四物汤
- B. 槐角地榆汤
- C. 八珍汤
- D. 麻仁滋脾丸
- E. 硫酸镁口服

【答案】A

【解析】患者症状提示腑气不通;舌紫暗有瘀斑,脉弦涩,提示气滞血瘀为患。治疗应遵循活血行气止痛法。选项A可活血行气;B有清肠凉血之效,主治痔漏下血;C为补益剂;D为润肠滋脾方,适用于脾虚便秘者。

涉及考点 | 桃红四物汤的主治

16. 胆道蛔虫梗阻出现腹痛的特点是

- A. 突发中上腹剧烈刀割样持续性疼痛
- B. 持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张
- C. 右上腹进行性锐痛
- D. 剑突下钻顶样疼痛
- E. 右上腹阵发性绞痛

【答案】D

【解析】胆道蛔虫梗阻出现腹痛的特点是剑突下钻顶样疼痛。

涉及考点 | 胆道蛔虫梗阻腹痛的特点

17. 患者,男,25岁。餐后突发性右上腹痛,疑为十二指肠溃疡穿孔。下列哪项最具有诊断意义

- A. 肠鸣音消失
- B. 腹腔穿刺
- C. 肠鸣音亢进
- D. 上腹压痛、反跳痛
- E. 立位腹部平片可见膈下游离气体

【答案】E

【解析】X线检查约80%的十二指肠穿孔患者在立位腹部透视或摄片时,可见半月形的膈下游离气体影对诊断有重要意义。

涉及考点 | 十二指肠穿孔的实验室检查

18. 能判断血尿来自何处尿路的检查方法是

- A. X线摄片
- B. B型超声波
- C. CT
- D. 膀胱镜检查
- E. 尿三杯试验

【答案】E

【解析】尿三杯试验可初步判断镜下血尿的来源和病变部位。以最初 10~15 mL 尿为第一杯,以排尿最后 10 mL 为第三杯,中间部分为第二杯。第一杯尿液异常提示病变在尿道或膀胱颈部;第三杯异常提示病变在后尿道、膀胱颈部或三角区;若三杯均异常提示病变在膀胱或以上部位。

涉及考点 | 尿三杯试验

19. 患者,男,胸部损伤,现损伤后期症见肋肋隐痛,悠悠不休,口干咽燥,心中烦热,头晕目眩,腰膝酸软,遗精;舌红少苔,脉弦细,应选用的方药是

- A. 八珍汤
- B. 六味地黄丸
- C. 接骨紫金丹
- D. 十灰散
- E. 复元活血汤

【答案】B

【解析】胸部损伤肝肾不足证。证候:损伤后期症见肋肋隐痛,悠悠不休,口干咽燥,心中烦热,头晕目眩,腰膝酸软,遗精;舌红少苔,脉弦细。治法:调补肝肾,强筋壮骨。方药:六味地黄丸加减。

涉及考点 | 胸部损伤肝肾不足证

20. 患者,男,40 岁,反复上腹饱胀、嗝气吞酸、呕吐宿食 2 个月,体检上腹饱满,可见胃型,未及肿块,胃有振水音。最可能是

- A. 急性胃炎
- B. 胃溃疡
- C. 急性胃扩张
- D. 十二指肠憩室
- E. 十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻

【答案】E

【解析】梗阻早期可以是不完全性的,逐渐出现食欲减退、恶心、上腹部饱胀及沉重感。当出现完全性梗阻时,呕吐频繁,呕吐量大且多含积存的宿食。十二指肠溃疡腹部体检一般仅有上腹部压痛,部分患者有胃脘部胀满感。肠鸣音活跃,通常并不亢进,约半数患者体温轻度增高。

涉及考点 | 十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻特征

21. 局麻药内加肾上腺素的主要目的是

- A. 预防过敏反应
- B. 延缓药物吸收,延长作用时间
- C. 使局部血管收缩,减少出血
- D. 预防术中血压下降
- E. 预防术中脉搏减慢

【答案】B

【解析】局麻药中加用 1:200 000 的肾上腺素,目的是延缓局麻药的吸收,延长麻醉时间。

涉及考点 | 麻醉

22. 下列不是麻醉前用药目的的是

- A. 解除术前紧张和恐惧
- B. 控制不良反应
- C. 增强麻醉效果
- D. 延长麻醉有效时间
- E. 拮抗麻醉药副作用

【答案】D

【解析】麻醉前用药目的:①解除精神紧张和恐惧心理,达到术前安睡或嗜睡状态。②控制不良反应,降低基础代谢,减少氧耗量,减少呼吸道腺体分泌,利于麻醉顺利诱导。③提高痛

阈,增强麻醉效果,减少麻醉药用量,利于麻醉维持。④对抗麻醉药的不良反应,降低麻醉药的毒性。

涉及考点 | 麻醉前用药目的

(23~24 题共用备选答案)

- | | |
|----------|------------|
| A. 阳和汤 | B. 桃红四物汤 |
| C. 四妙勇安汤 | D. 八珍汤合左归丸 |
| E. 十全大补丸 | |

23. 治疗血管闭塞性脉管炎气血两虚证应首选

【答案】E

24. 治疗动脉硬化性闭塞症脾肾阳虚证应首选

【答案】D

【解析】血栓闭塞性脉管炎气血两虚证治法:补气养血,益气通络。方药:十全大补丸加减。可适当加赤芍、王不留行等活血药;同时加玄参等清热解毒药。动脉硬化性闭塞症脾肾阳虚证治法:补肾健脾,益气活血。方药:八珍汤合左归丸或右归丸加減。

涉及考点 | 血栓闭塞性脉管炎气血两虚证治法

(25~28 题共用备选答案)

- | | |
|-------------|----------|
| A. 镇静安定药 | B. 催眠药 |
| C. 麻醉性镇痛药 | D. 抗胆碱类药 |
| E. 稳定血流动力学药 | |

25. 地西洋属于

【答案】A

26. 芬太尼属于

【答案】C

27. 苯巴比妥属于

【答案】B

28. 东莨菪碱属于

【答案】D

【解析】地西洋属于镇静安定药。麻醉性镇痛常用药有吗啡、哌替啶、芬太尼等。镇静催眠药主要抑制大脑皮层,起镇静催眠、对抗局麻药毒性反应和降低局麻药过量惊厥发生率等作用。常用的药物为巴比妥类药。抗胆碱类药具有抑制呼吸道腺体分泌,保持呼吸道通畅,削弱迷走神经不良反应和维持呼吸、循环正常功能等功效。此外还有对抗吗啡类药抑制呼吸和恶心、呕吐副效应的的作用。常用药有阿托品和东莨菪碱等。

涉及考点 | 麻醉药物

(29~30 题共用备选答案)

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| A. 皮色暗褐,或青紫而胀痛 | B. 痛无定处,忽此忽彼,走注甚速 |
| C. 皮色不红,不热,酸痛,得暖则痛缓 | D. 皮肤焮红,灼热疼痛,遇冷则痛减 |
| E. 肿势急,痛无止时,如有鸡啄,按之中软应指 | |

29. 痛是由多种因素导致气血凝滞,阻塞不通而成,外科疾病热痛的特点是

【答案】D

30. 痛是疮疡最常见的自觉症状,外科疾病瘀血痛的特点是

【答案】A

【解析】热痛皮色焮红,灼热疼痛,遇冷则痛减。见于阳证疮疡。瘀血痛初起隐痛、胀痛,皮色不变或皮色暗褐,或见皮色青紫瘀斑。见于创伤或创伤性皮下出血。寒痛皮色不红、不热,酸痛,得温则痛缓。见于脱疽、寒痹等。风痛痛无定处,忽彼忽此,走注甚速,遇风则剧。见于行痹等。化脓痛势急胀,痛无止时,如同鸡啄,按之中软应指。多见于疮疡成脓期。

涉及考点 | 辨痛

金英杰医学教育

- A. 阴虚火旺
B. 心火偏亢
C. 肾阳衰微
D. 膀胱气化失司
E. 湿热下注膀胱

【答案】C

【解析】尿路感染常见病因病机为阴虚火旺，心火偏亢，湿热下注膀胱，致膀胱气化失司，水道不利，而出现小便异常改变。

涉及考点 | 尿路感染的病机

2年 易错考题

1. 临产的重要标志是

- A. 见红,破膜,规律宫缩
B. 见红,规律宫缩,宫口开张不明显
C. 见红,先露下降,伴尿频
D. 规律宫缩,见红
E. 规律宫缩,进行性宫口扩张和胎先露部下降

【答案】E

【解析】临产开始的标志为有规律而且逐渐增强的子宫收缩,持续 30 秒或以上,间歇 5~6 分钟,同时伴有进行性宫颈管消失,宫口扩张和胎先露部下降,用镇静药物不能抑制临产。

涉及考点 | 正常分娩的过程

2. 下列不属于先兆流产症状的是

- A. 阴道流血
B. 腹痛
C. 腰背痛
D. 小腹坠胀
E. 阴道胎块

【答案】E

【解析】先兆流产指妊娠 28 周前出现少量阴道流血,下腹痛或腰背痛。妇科检查:子宫颈口未开,胎膜未破,子宫大小与停经周数相符。经治疗及休息后症状消失,可继续妊娠。中医称“胎漏”“胎动不安”。如果出现阴道胎块指胚胎组织或者羊膜囊,是难免流产的表现。

涉及考点 | 先兆流产的临床表现

3. 下列巨大儿肩难产的处理,错误的是

- A. 抑制宫缩
B. 屈大腿
C. 压前肩
D. 牵后臂
E. 做充分大的会阴后-斜切开

【答案】D

【解析】巨大儿肩难产时,可压前肩、屈大腿,做充分大的会阴后-斜切开、抑制宫缩。

涉及考点 | 产时并发症的处理

4. 闭经的中医病名是

- A. 暗经
B. 血枯
C. 激经
D. 季经
E. 并月

【答案】B

【解析】闭经在《素问·阴阳别论》中被称为“女子不月”“月事不来”“血枯”。

涉及考点 | 闭经的概念

5. 应用激素替代法治疗围绝经期综合征的适应证是
- 可疑乳腺癌
 - 可疑宫内膜癌
 - 因孕激素水平低落而产生明显的神经血管舒缩性
 - 因雌激素水平低落而产生明显的神经血管舒缩性
 - 心血管疾病或凝血功能亢进者

【答案】D

【解析】激素替代法治疗围绝经期综合征的适应证为因雌激素水平低落而产生明显的神经血管舒缩性,影响其生活和工作时。可疑乳腺癌、心血管疾病或凝血功能亢进者均为激素替代法治疗围绝经期综合征的禁忌证。

涉及考点 | 围绝经期综合征的治疗

6. 下列关于滴虫阴道炎的叙述,错误的是
- 为性传播疾病
 - 分泌物为豆腐渣样
 - 性伴侣应同时检查和治疗
 - 治疗后复查为阴性并不能确诊为治愈
 - 为感染阴道毛滴虫所引起

【答案】B

【解析】外阴阴道假丝酵母菌病分泌物为豆腐渣样。

涉及考点 | 阴道炎症

7. 治疗子宫内膜不规则脱落之湿热蕴结证,应首选
- | | |
|----------|--------|
| A. 清肝止淋汤 | B. 二妙丸 |
| C. 清经散 | D. 两地汤 |
| E. 固经丸 | |

【答案】E

【解析】治疗子宫内膜修复延长湿热蕴结证应该清热利湿,滋阴清热,固经止带,选择固经丸加减。

涉及考点 | 功能失调性子宫出血的辨证与治疗

8. 二仙汤合二至丸可用于治疗绝经期综合征的哪个类型
- | | |
|----------|---------|
| A. 肾阴不足 | B. 肾阳亏虚 |
| C. 肝肾阴虚 | D. 肝阳上亢 |
| E. 肾阴阳两虚 | |

【答案】E

【解析】二仙汤以仙茅、仙灵脾为主药,佐以巴戟天、当归、黄柏、知母,功以温补肾阳,补肾填精,治疗肾阴阳两虚的绝经期综合征。二至丸由女贞子和墨旱莲组成,功用补益肝肾、滋阴止血。因此二仙汤与二至丸合用可治疗肾阴阳两虚之证。

涉及考点 | 绝经综合征的治疗

9. 治疗不孕症肾虚型宜选用
- | | |
|---------|--------|
| A. 大补元煎 | B. 温胞饮 |
|---------|--------|

- C. 开郁种玉汤
E. 养精种玉汤

D. 六味地黄丸

【答案】E

【解析】治疗不孕症肾气虚弱证用毓麟珠，肾阴虚证用养精种玉汤合清骨滋肾汤，肾阳虚证用温胞饮。

涉及考点 | 不孕症的辨证论治

10. 患者,女,23岁。每逢经行小腹胀痛拒按,月经量少,色紫暗有块,块下痛减,伴胸胁、乳房作胀,舌暗,脉弦。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
C. 少腹逐瘀汤
E. 逍遥散

B. 膈下逐瘀汤
D. 桂枝茯苓丸

【答案】B

【解析】痛经气滞血瘀证常会伴有经前或经期下腹胀痛,拒按,经量少,经色紫暗夹血块,血块排出后疼痛减轻,月经干净后疼痛消失,伴胸胁、乳房胀痛,舌质紫暗,有瘀点瘀斑,苔薄白,脉弦或弦滑等症状。治疗应该理气行滞,化瘀止痛,方用膈下逐瘀汤或者痛经汤加减。A用于肝瘀气滞证;C用于寒湿凝滞证;D用于血瘀型先兆流产;E用于肝瘀脾虚证。

涉及考点 | 痛经的辨证与治疗

11. 下列各项,属宫颈癌早期临床特点的是

- A. 不规则阴道出血
C. 大量脓血性恶臭白带
E. 输尿管上段扩张

B. 接触性出血
D. 下肢肿痛

【答案】B

【解析】宫颈癌早期多为接触性出血或血水样阴道分泌物;晚期为不规则阴道流血。

涉及考点 | 妊娠孕妇产前检查时间

12. 临产的重要标志是

- A. 见红、破膜、规律宫缩
C. 见红、先露下降、伴尿频
E. 规律宫缩、进行性宫口扩张和胎先露下降

B. 见红、规律宫缩、宫口开张不明显
D. 规律宫缩、见红

【答案】E

【解析】临产开始的标志为有规律而且逐渐增强的子宫收缩,持续30秒或以上,间歇5~6分钟,同时伴有进行性宫颈管消失,宫口扩张和胎先露部下降。

涉及考点 | 临产

13. 下列各项,不属于受精卵着床条件的是

- A. 透明带消失
B. 胚泡细胞滋养层细胞分化出合体滋养细胞
C. 胚泡和子宫内膜必须同步发育
D. 有足够数量的孕酮
E. 子宫内膜发生蜕膜变

【答案】E

【解析】受精卵着床必须具备的条件有:透明带消失;胚泡细胞滋养层细胞分化出合体滋



配套名师高清视频

养细胞;胚泡和子宫内膜同步发育且功能协调及孕妇体内有足够数量的孕酮。

涉及考点 | 受精卵着床

14. 患者,女,28岁,已婚。妊娠后阴道少量出血,伴小腹隐痛,腰酸,恶心纳差,舌苔白,脉细滑。B超检查示宫内可见胎囊。应首选考虑的是

- A. 难免流产
- B. 先兆流产
- C. 习惯性流产
- D. 稽留流产
- E. 不全流产

【答案】B

【解析】A由B发展而来,妇科检查可见胚胎组织或胎囊堵塞于宫颈口内,子宫大小与停经月份相等或略小。C指自然流产3次或3次以上者。D指胚胎或胎儿在宫内已死,尚未自然排出者。E指妊娠物部分排出体外,部分仍残留于宫腔或宫颈内。

涉及考点 | 先兆流产的诊断

15. 患者,女,31岁,已婚。停经2个月余,反复少量阴道流血18天,10天前曾下腹剧痛。现小腹坠胀。妇科盆腔及B超检查:子宫大小正常,右附件包括大小约7cm×6cm×5cm,尿妊娠试验可疑(+).应首先考虑的是

- A. 宫外孕未破损型
- B. 宫外孕不稳定型
- C. 宫外孕包块型
- D. 子宫内膜异位症
- E. 右附件炎性包块

【答案】B

【解析】宫外孕不稳定型的主要症状为停经、少量阴道流血、腹剧痛坠胀,实验室检查见到明显包块,而子宫内无异常。

涉及考点 | 宫外孕的诊断

16. 患者,女,25岁。在分娩时突发呼吸困难,其后咯血而死。尸检发现肺小血管内有胎脂及角化上皮。其死因可能是

- A. 血栓栓塞
- B. 气体栓塞
- C. 脂肪栓塞
- D. 羊水栓塞
- E. 瘤细胞栓塞

【答案】D

【解析】羊水栓塞是指在分娩过程中羊水突然进入母体血循环引起急性肺栓塞、休克、DIC、肾衰竭或突发死亡的严重并发症。

涉及考点 | 产时并发症

17. 患者,女,26岁,已婚,孕2产1。现孕40周,来院途中分娩,总产程1小时,产后5天出现寒战、高热、下腹痛,无乳胀及腹泻,妇科检查:阴道内有脓血,宫颈轻度损伤,子宫大而软,压痛明显。应首先考虑的是

- A. 乳腺炎
- B. 宫颈炎
- C. 产褥感染
- D. 产后细菌性痢疾
- E. 泌尿系统感染

【答案】C

【解析】根据总产程1小时,产后5天出现寒战、高热、下腹痛,无乳胀及腹泻,可排除A、B、D、E。而且阴道内有脓血,宫颈轻度裂伤,子宫大而软,可以判断为感染导致的,属于产褥

感染。

涉及考点 | 产褥感染的诊断

18. 下列哪项属于子宫内膜的周期性变化

- | | |
|---------|--------|
| A. 增生期 | B. 泌乳期 |
| C. 性成熟期 | D. 排卵期 |
| E. 黄体期 | |

【答案】A

【解析】子宫内膜分为基底层和功能层,其组织形态的周期性改变可分为3期:增生期、分泌期和月经期。

涉及考点 | 子宫内膜的周期性

19. 患者,女,45岁,已婚。接触性阴道流血2个月,宫颈重度糜烂伴颗粒样增生,宫颈脱落细胞检查巴氏Ⅲ级。为了明确诊断,提高活检的准确性,应做的检查是

- | | |
|--------------|-------------|
| A. 宫颈活组织检查 | B. 阴道镜与宫颈检查 |
| C. 外阴活组织检查 | D. 阴道活组织检查 |
| E. 子宫内膜活组织检查 | |

【答案】A

【解析】防癌涂片用巴氏染色,结果分5级:I级正常,Ⅱ级炎症引起,Ⅲ级可疑,Ⅳ级可疑,Ⅴ级阳性。Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级涂片者应重复刮片检查并行宫颈活组织检查。

涉及考点 | 宫颈活组织检查的适应证

20. 患者,女,30岁,已婚。月经周期正常,但经量多(5包纸/次),色深红、质稠,心烦口渴,尿黄便结,舌红苔黄,脉滑数。妇科盆腔,及B超检查无异常,基础体温呈双向。治疗应首选

- | | |
|----------|--------|
| A. 保阴煎 | B. 清经散 |
| C. 清热固经汤 | D. 安冲汤 |
| E. 桃红四物汤 | |

【答案】A

【解析】根据症状、检查月经周期正常,但经量多(5包纸/次),色深红、质稠,心烦口渴,尿黄便结,舌红苔黄,脉滑数,妇科盆腔及B超检查无异常,基础体温呈双相,西医当诊断为排卵性异常子宫出血。中医诊断为月经过多血热证,治疗应用保阴煎。

涉及考点 | 月经过多的治疗

87. 患儿,5个月。急性腹泻,频繁呕吐2天,检查头颅,可能发现的体征是

- A. 囟门逾期不闭
B. 囟门凹陷
C. 囟门高凸
D. 囟门宽大,头缝开解
E. 囟门早闭

【答案】B

【解析】患儿5个月自门未闭合是正常的,急性腹泻、频繁呕吐2天,可有不同程度的脱水,因此检查头颅可能发现的体征是囟门凹陷。

涉及考点 | 泄泻的临床表现

2年 易错考题



配套名师高清视频

1. 7周岁小儿的标准体重、身高按现行公式计算应为

- A. 12 kg, 85 cm
B. 14 kg, 105 cm
C. 16 kg, 110 cm
D. 18 kg, 115 cm
E. 22 kg, 124 cm

【答案】E

【解析】2岁至青春前期体重:年龄 \times 2(kg)+8(kg)。2~12岁身高:身高(高)(cm)=年龄 \times 7+75

涉及考点 | 儿童身高的计算公式

2. 小儿营养不良是体重低于正常值的

- A. 40 %
B. 30 %
C. 20 %
D. 15 %
E. 10 %

【答案】D

【解析】营养不良分三级。I度营养不良:精神状态正常,体重低于正常的15%~25%;II度营养不良:精神不振,烦躁不安,体重低于正常的25%~40%;III度营养不良:精神萎靡,智力发育落后,体重低于正常的40%以上。

涉及考点 | 营养不良的诊断

3. 下列哪项不是小儿体格生长规律

- A. 头尾生长规律
B. 由粗到细规律
C. 由初级到高级规律
D. 由简单到复杂规律
E. 由远及近规律

【答案】E

【解析】由上到下、由近到远、由粗到细、由简单到复杂、从低级到高级。

涉及考点 | 小儿发育规律

4. 中医学称小儿为“纯阳之体”,其含义是

- A. 纯阳无阴
B. 发育迅速
C. 阳常有余
D. 肝常有余
E. 阴虚阳亢

【答案】B

【解析】“纯阳”指小儿先天禀受的元阴元阳未曾耗散,因而成为后天生长发育的动力,使儿童显示出蓬勃的生机,迅速地发育成长。“纯阳”是我国古代医家关于小儿生理特点的学说之一,不能将“纯阳”理解成正常小儿为有阳无阴或阳亢阴亏之体。

涉及考点 | 小儿“纯阳”学说的意义

5. 乳婴儿中药用量为成人量的

- | | |
|--------|--------|
| A. 1/6 | B. 1/5 |
| C. 1/4 | D. 1/3 |
| E. 1/2 | |

【答案】D

【解析】小儿中药用量新生儿用成人量的 1/6,乳婴儿为成人量的 1/3,幼儿为成人量的 1/2,学龄儿童为成人量的 2/3 或成人量。

涉及考点 | 小儿的用药剂量

6. 儿科常见病中发病率最高的是

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 消化系统疾病 | B. 循环系统疾病 |
| C. 呼吸系统疾病 | D. 营养性疾病 |
| E. 泌尿系统疾病 | |

【答案】C

【解析】小儿呼吸系统的解剖和生理还未发育完全,婴幼儿的鼻和鼻咽腔相对短小,鼻道狭窄,无鼻毛,黏膜柔嫩,故容易患呼吸道疾病。

涉及考点 | 小儿生理病理特点

7. 下列关于母乳喂养的叙述,正确的是

- A. 母乳中的酪蛋白多,易于消化吸收
- B. 目前主张正常足月新生儿的开奶时间应为出生后 1 天
- C. 1 岁半~2 岁可完全断奶
- D. 每次哺乳时间为 30 分钟
- E. 乳母患活动性肺结核、急性肝炎时禁忌哺乳

【答案】E

【解析】母乳中的酪蛋白少(母乳蛋白 35% 为酪蛋白,牛乳为 80%),易于消化吸收;目前主张越早开奶越好,正常足月新生儿出生半个小时内就可以让母亲喂奶;一般小儿于 10~12 月可逐渐完全断奶,母乳量多者也可延至 1.5~2 岁;每次哺乳时间为 15~20 分钟,以吃饱为准,哺乳后 30 分钟乳母血中催乳素的浓度达到高峰;母亲患传染病、重症心脏病或肾脏病,或身体过于虚弱者,不宜哺乳。

涉及考点 | 母乳喂养的优点和方法

8. 下列关于母乳喂养优点的叙述,错误的是

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| A. 母乳含饱和脂肪酸多,利于婴儿消化吸收 | B. 母乳钙磷比例适宜,较少发生低钙血症 |
| C. 母乳含优质蛋白质、必需氨基酸多 | D. 母乳有促进婴儿免疫力的作用 |
| E. 哺乳可促进子宫收缩,利于母亲早日康复 | |

【答案】A

【解析】母乳中含不饱和脂肪酸较多,能供给丰富的必需脂肪酸,脂肪颗粒小,又含较多解脂酶,有利于婴儿消化吸收。

涉及考点 | 母乳喂养的优点

9. 足月男婴。出生后7小时即出现身黄,目黄,哭闹不安,呕吐,乳食不思,尿黄,稍伴发热,舌质红,苔黄稍腻,指纹紫滞。治宜选用的药物是

- A. 茵陈理中汤加减
B. 茵陈蒿汤加减
C. 膈下逐瘀汤加减
D. 羚角钩藤汤合茵陈蒿汤加减
E. 黄连解毒汤加减

【答案】B

【解析】湿热熏蒸证的证候:主要表现为阳黄,目黄、身黄,其黄鲜明,哭闹不安,呕吐腹胀,乳食不思,尿黄便结,或伴有发热,舌质红,苔黄腻,指纹紫滞。治法:清热利湿退黄。方药:茵陈蒿汤加味。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

10. 下列属于小儿正常指纹的是

- A. 指纹沉而不显
B. 指纹细而浅淡
C. 黄红相兼,隐现于风关之内
D. 过风关至气关
E. 过气关达命关

【答案】C

【解析】小儿指纹沉而不显是病邪入里的表现;指纹细而浅淡说明患儿多虚多寒;黄红相兼为正常颜色,隐现于风关之内为正常的长度;指纹过风关至气关是邪深而病重;指纹过气关达命关是邪入脏腑,病情严重的表现。

涉及考点 | 小儿指纹诊查的临床表现及其意义

11. 卫气营血辨证与三焦辨证用于治疗

- A. 心理性疾病
B. 肠寄生虫病
C. 营养性疾病
D. 急性传染病
E. 结缔组织病

【答案】D

【解析】卫气营血辨证与三焦辨证适用于温病,是小儿温病病机辨证的基本方法。中医的温病相当于西医的急性传染病。

涉及考点 | 常用辨证方法

12. 诊断病毒性心肌炎的主要指标,错误的一项是

- A. 急慢性心功能不全或心脑血管综合征
B. 有心脏扩大、奔马律或心包炎表现之一
C. 多汗、肌痛、胸闷
D. 发病1个月内血清CK-MB增高
E. 心脏同位素扫描发现异常

【答案】C

【解析】临床诊断依据(心肌炎依据):①心功能不全、心源性休克或心脑血管综合征。②心脏扩大(X线、超声心动图检查具有表现之一)。③心电图改变:以R波为主2个或2个以上的主要导联(I、II、aVF、V₅)的ST-T改变持续4天以上。④心肌酶:CK-MB升高或心肌肌钙蛋白(cTnI或cTnT)阳性。

涉及考点 | 病毒性心肌炎的临床诊断依据

13. 下列属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A. 出生后5~6天出现,30~35天完全消退
B. 出生后3~4天出现,21~28天完全消退

- C. 出生后 3~4 天出现,15~20 天完全消退 D. 出生后 2~3 天出现,10~14 天完全消退
E. 出生后 1~2 天出现,3~7 天完全消退

【答案】D

【解析】由于新生儿胆红素代谢的特点,约有 60% 的足月儿和 80% 的早产儿可于出生后 2~5 天出现黄疸,但一般状况良好,足月儿在 14 天内消退,早产儿可延迟至 3~4 周消退。

涉及考点 | 新生儿生理性黄疸

14. 肾病综合征临床特征最重要的一项是

- A. 血沉明显增快 B. 大量蛋白尿
C. 水肿 D. 血胆固醇增高
E. 低白蛋白血症

【答案】B

【解析】肾病综合征具有以下四大特点:大量蛋白尿、低蛋白血症、高胆固醇血症(高脂血症)和不同程度的水肿。其中大量蛋白尿和低蛋白血症为必要条件。

涉及考点 | 肾病综合征的临床特征

15. 6 个月以内婴儿无热性支气管肺炎应考虑诊断为

- A. 葡萄球菌肺炎 B. 合胞病毒性肺炎
C. 革兰阴性杆菌肺炎 D. 肺炎支原体肺炎
E. 衣原体肺炎

【答案】E

【解析】除选项 E 外,其余选项的病原体感染所致的肺炎均伴有发热,且有研究认为 6 个月以内婴儿无热性支气管肺炎,应考虑衣原体肺炎。

涉及考点 | 小儿肺炎的鉴别诊断

16. 患儿,5 岁。反复咳嗽 2 个月,咳嗽呈发作性,干咳痰少,夜间加剧,用抗生素治疗无效,口服氨茶碱能明显减轻症状。应首先考虑的诊断是

- A. 咳嗽变异性哮喘 B. 急性支气管炎
C. 急性上呼吸道感染 D. 热性哮喘
E. 寒性哮喘

【答案】A

【解析】咳嗽变异性哮喘的诊断依据:①持续咳嗽>1 月,常在夜间和/或清晨发作,运动、遇冷空气或嗅到特殊气味后加重,痰少,临床上无感染征象,或经较长时间抗生素治疗无效。②支气管舒张剂诊断性治疗可使咳嗽发作缓解(基本诊断条件)。③有个人或家族过敏史、家族哮喘史,过敏原(变应原)检测阳性可作辅助诊断。④排除其他原因引起的慢性咳嗽。

涉及考点 | 咳嗽变异性哮喘的诊断

17. 小儿肺炎痰热闭肺证的首选方剂是

- A. 银翘散合麻杏石甘汤加减 B. 华盖散
C. 杏苏散 D. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
E. 荆防败毒散

【答案】D

【解析】小儿肺炎痰热闭肺症见咳嗽气急、明显鼻翼扇动、高热口渴、口唇微绀、痰黄黏稠、大便干、小便黄、舌红苔黄腻、脉滑数、指纹青紫在气关以上。治法是清热宣肺、豁痰平喘。本

题主要需排除 A 选项, A 的作用是辛凉解表宣肺,但是小儿肺炎痰热闭肺证是里证不兼表证,故 A 是错误选项。

涉及考点 | 小儿肺炎的辨证论治

18. 小儿哮喘发病的主要内因是

- A. 外感六淫之邪
- B. 嗜食酸、甘、咸、膩
- C. 胎禀不足与伏痰
- D. 接触异常气味
- E. 活动过度,情绪激动

【答案】C

【解析】中医学认为,哮喘发作既有内因,又有外因。内因为肺、脾、肾三脏不足,痰饮留伏,是发病的内在因素;外因为感受外邪,饮食生冷酸咸,接触异物刺激(如花粉、煤烟、绒毛等)或劳累、激动等,使肺气不利,触动伏痰,痰阻气道而发病。除选项 C 外,其他均是外来因素。

涉及考点 | 小儿哮喘的病因病机

19. 治疗小儿哮喘外寒内热证的方剂是

- A. 小青龙汤合三子养亲汤
- B. 麻杏石甘汤
- C. 射干麻黄汤合都气丸
- D. 苏子降气汤
- E. 人参五味子汤

【答案】C

【解析】小青龙汤合三子养亲汤的功用为温肺散寒,化痰定喘,可以治疗寒性哮喘;麻杏石甘汤功用清热化痰,止咳定喘,可以治疗热性哮喘;射干麻黄汤合都气丸功用降气化痰,补肾纳气,可以治疗外寒内热哮喘。

涉及考点 | 哮喘的辨证论治

20. 患儿,男,6岁。面色不华已逾3个月,指甲苍白,纳食不佳,四肢乏力,大便溏泻,舌淡苔薄白,脉细无力。血常规示小细胞低色素性贫血。治疗应首选的方剂是

- A. 八珍汤
- B. 大补元煎
- C. 六君子汤
- D. 保和丸
- E. 补中益气汤

【答案】C

【解析】脾胃虚弱证的证候:面色萎黄无华,唇淡不泽,指甲苍白,长期食欲不振,神疲乏力,形体消瘦,大便不调,舌淡苔白,脉细无力,指纹淡红。治法:健运脾胃,益气养血。方药:六君子汤。

涉及考点 | 营养性缺铁性贫血的脾胃虚弱证的选方

21. 病毒性脑膜炎与化脓性脑膜炎脑脊液检查相同的是

- A. 氯化物减低
- B. 蛋白质增高
- C. 糖升高
- D. 白细胞明显增高
- E. 颅内压降低

【答案】B

【解析】化脓性脑膜炎脑脊液可见典型化脓性改变。外观混浊或呈稀米汤样,颅内压增高。镜检白细胞甚多,糖含量增高,蛋白质显著增高。病毒性脑膜炎的脑脊液外观清亮,颅内压不高,以淋巴细胞为主,蛋白质轻度升高或正常,糖含量正常,细菌学检查阴性。因此病毒性

脑膜炎和化脓性脑膜炎脑脊液检查相同的是蛋白质均有增高。

涉及考点 | 化脓性脑膜炎和病毒性脑膜炎的鉴别诊断

22. 过敏性紫癜血热妄行证的首选方剂是

- | | |
|--------|-----------------|
| A. 银翘散 | B. 犀角地黄汤 |
| C. 四妙散 | D. 葛根黄芩黄连汤合小承气汤 |
| E. 茜根散 | |

【答案】B

【解析】过敏性紫癜血热妄行证的治法是清热解毒,凉血化斑。犀角地黄汤具有清热解毒,凉血散瘀之功,主治热入血分证。银翘散辛凉解表;四妙散主治湿热下注;葛根黄芩黄连汤合小承气汤可表里两解,轻下热结,除满消痞;茜根散主治阴虚出血证。

涉及考点 | 过敏性紫癜的辨证论治

23. 消瘦型小儿营养不良皮下脂肪减少的顺序是

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A. 腹部、躯干、臀部、四肢、面颊部 | B. 躯干、臀部、四肢、面颊部、腹部 |
| C. 四肢、面颊部、腹部、臀部、躯干 | D. 面颊部、四肢、躯干、腹部、臀部 |
| E. 面颊部、腹部、躯干、臀部、四肢 | |

【答案】A

【解析】皮下脂肪减少的顺序是:首先是腹部,其次为躯干、臀部、四肢,最后为面颊部。其中腹部皮下脂肪厚度可作为判断营养不良程度的重要指标之一。

涉及考点 | 小儿营养不良皮下脂肪减少的顺序

24. 2岁女孩,发热、咳嗽、气促1周,查体:精神不振,面色苍白,呼吸困难,皮肤可见荨麻疹样皮疹,双肺可闻及细湿罗音,X线检查显示多发性小脓肿,易变。首先考虑诊断为

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 革兰阴性杆菌肺炎 | B. 肺炎支原体肺炎 |
| C. 腺病毒肺炎 | D. 呼吸道合胞病毒肺炎 |
| E. 葡萄球菌肺炎 | |

【答案】E

【解析】革兰阴性杆菌肺炎X线基本改变为支气管肺炎征象,易见胸腔积液;肺炎支原体肺炎特征为刺激性咳嗽,肺部体征不明显;腺病毒肺炎X线特点为肺气肿多见;呼吸道合胞病毒肺炎以喘憋为突出表现;葡萄球菌肺炎以皮肤常见猩红热样或荨麻疹样皮疹为特征,选项A、B、C、D均不伴皮疹。

涉及考点 | 肺炎不同病原体的鉴别诊断

25. 患儿,男,2岁。发热、咳嗽5天,口渴,小便短赤,舌红苔黄。检查:听诊双下肺固定中细湿啰音,血白细胞总数及中性粒细胞增高。治疗应首选

- | | |
|--------------|-------------|
| A. 红霉素加二陈汤 | B. 红霉素加三拗汤 |
| C. 青霉素加麻杏石甘汤 | D. 利巴韦林加二陈汤 |
| E. 利巴韦林加银翘散 | |

【答案】C

【解析】下肺固定中细湿啰音,血白细胞总数及中性粒细胞增高是肺炎球菌导致支气管肺炎的特征,青霉素是首选的抗生素。口渴,小便短赤,舌红苔黄是风热闭肺证,首选方是麻杏石甘汤。二陈汤用于痰湿证;三拗汤用于风寒表证,肺气不宣。

涉及考点 | 肺炎的治疗

26. 患儿,10个月,入院时诊断为腺病毒肺炎痰热闭肺证。今突然虚烦不安,额汗不温,口唇发绀。查体:体温38℃,呼吸64次/分,心率165次/分,心音低钝,肝脏比入院时增大2cm,舌暗紫,指纹沉而色青,达于命关。治疗应首选

- A. 西地兰加参附龙牡汤
- B. 青霉素加生脉散
- C. 地塞米松加参附龙牡汤
- D. 西地兰加真武汤
- E. 地塞米松加麻杏石甘汤

【答案】A

【解析】心率165次/分,心音低钝,肝脏比入院时增大2cm是心衰的体征,应抗心衰治疗,使用西地兰。虚烦不安,额汗不温,口唇发绀,指纹沉而色青,达于命关,是心阳虚衰,正气欲脱的表现,治法为温补心阳,救逆固脱,首选参附龙牡汤。

涉及考点 | 肺炎喘咳变证的治疗

27. 患儿,女,3个月。口腔、舌面满布白屑,面赤唇红,烦躁不宁,吮乳啼哭,大便干结,小便短黄。治疗应首选制霉菌素加

- A. 清热泻脾散
- B. 泻黄散
- C. 六味地黄丸
- D. 导赤散
- E. 清胃散

【答案】A

【解析】根据患儿的症状中医辨证为心脾积热,治法是清心泻脾、解毒泻火,清热泻脾散符合这一要求。泻黄散泻脾胃伏火;六味地黄丸滋补肝肾;导赤散清心利水养阴;清胃散清胃凉血。

涉及考点 | 鹅口疮的辨证论治

28. 患儿,3岁。腹痛、腹泻2天。2天前因过食瓜果,出现腹痛欲泻,泻后痛减,腹胀,暖腐,呕吐,吐泻物酸臭,舌苔黄腻,脉滑实。诊断为婴幼儿腹泻,其证型是

- A. 风寒
- B. 湿热
- C. 伤食
- D. 脾虚
- E. 脾肾阳虚

【答案】C

【解析】患儿有饮食不节史,食滞中焦,气机不利则腹胀腹痛;泻后积滞见减,气机一时得畅,故见泻后腹痛暂时减缓。乳食内腐,浊气上冲,胃失和降,故有暖气酸馊,呕吐。舌苔厚腻或微黄,大便酸臭,皆为乳食积滞之证。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

29. 患儿,10个月。腹泻3天,鼻塞流涕,每日腹泻10余次,臭味不甚,尿黄。查体:体温38℃,皮肤弹性尚好,前囟平,哭时有泪。听诊心肺正常,肠鸣音亢进,舌苔薄白,指纹红,达于风关。大便镜检无异常。应首先考虑的诊断是

- A. 细菌性肠炎风寒证
- B. 细菌性肠炎湿热证
- C. 病毒性肠炎风寒证
- D. 病毒性肠炎湿热证
- E. 细菌性肠炎风热证

【答案】C

【解析】大便镜检无异常应首先考虑病毒导致的泄泻;腹泻3天,臭味不甚,发热,鼻塞流涕,苔薄白,指纹红,达于风关均是风寒证的表现;尿黄是泄泻导致小便浓缩而色深,不应作为

热证的考虑。

涉及考点 | 泄泻的辨证

30. 患儿,男,1岁。腹泻2天,泻下急迫,大便呈蛋花样,有黏液及辛臭味,伴阵发啼哭,发热,烦躁,口渴,困倦,小便短赤,肛门灼热发红。其证型是

- A. 伤食
- B. 风寒
- C. 脾虚
- D. 湿热
- E. 脾肾阳虚

【答案】D

【解析】湿热之邪,蕴结脾胃,下注肠道,传化失司,故大便呈蛋花样;湿性黏腻,热性急迫,湿热交蒸,壅阻胃肠气机,故泻下急迫,有黏液及辛臭味,腹痛时作,伴阵发啼哭;湿困脾胃则困倦;发热是伴有外感;热重于湿,则口渴;湿热下注,故小便短赤,均为湿热之征。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

金英杰医学教育

2年 易错考题

1. 足阳明胃经、足太阴脾经在何处交接

- A. 食指端
- B. 目内眦
- C. 胸中
- D. 足大趾内端
- E. 足小趾内端

【答案】D

【解析】相表里的阴经和阳经在手足末端交接，肺经和大肠经交接于食指端，胃经和脾经交接于足大趾内端，膀胱经和肾经交接于足小趾内端；同名的阳经与阳经在头面部交接，小肠经和膀胱经交接于目内眦；相互衔接的阴经和阴经在胸中交接，肾经与心包经交接于胸中。

涉及考点 | 经脉交接

2. 循行“起于中焦，下络大肠”的经络是

- A. 手太阴肺经
- B. 手厥阴心包经
- C. 足阳明胃经
- D. 手阳明大肠经
- E. 手太阳小肠经

【答案】A

【解析】《灵枢·经脉》原文指出：“肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺。”

涉及考点 | 手太阴肺经的循行

3. 既为络穴又为八脉交会穴的腧穴是

- A. 后溪
- B. 外关
- C. 蠡沟
- D. 大钟
- E. 足临泣

【答案】B

【解析】十五络穴歌诀：十五络穴歌诀：肺络列缺偏大肠，脾络公孙胃丰隆；小肠支正心通里，膀胱飞扬肾大钟；心包内关三焦外，肝络蠡沟胆光明；脾之大络是大包，任络鸠尾督长强。

涉及考点 | 特定穴

4. 中府穴与前正中线的距离是

- A. 1 寸
- B. 1.5 寸
- C. 4 寸
- D. 6 寸
- E. 8 寸

【答案】D

【解析】中府为肺之募穴，位于胸前壁外上方，前正中线旁开 6 寸，平第 1 肋间隙处，主治咳嗽、气喘、胸满痛等肺部病证以及肩背痛。

涉及考点 | 中府穴的定位

5. 按照腧穴分经论治规律，足太阳经腧穴的主治特点是

- A. 后头、肩胛、耳病
- B. 后头、背腰痛、脏腑病
- C. 侧头、耳病、胁肋病
- D. 前头、鼻、口、齿病
- E. 前头、口齿、胃肠病

【答案】B

涉及考点 | 足太阳经腧穴的主治特点

6. 悬钟穴位于

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A. 外踝后缘中点上 3 寸, 腓骨前缘 | B. 外踝前缘中点上 3 寸, 腓骨前缘 |
| C. 外踝下缘中点上 3 寸, 腓骨前缘 | D. 外踝高点上 3 寸, 腓骨前缘 |
| E. 外踝上缘中点上 3 寸, 腓骨前缘 | |

【答案】D

【解析】A、B、C、E 处均无十四经穴。悬钟穴位于外踝高点上 3 寸, 腓骨前缘。

涉及考点 | 悬钟穴的定位

7. 手厥阴经腧穴除主治心、心包、胸、神志病外, 还主要用于治疗

- | | |
|-------|-------|
| A. 胃病 | B. 肾病 |
| C. 肝病 | D. 胆病 |
| E. 脾病 | |

【答案】A

【解析】主治概要: ①心胸、神志病, 如心痛, 心悸, 心烦, 胸闷, 癫狂痫等。②胃腑病证, 如胃痛, 呕吐等。③经脉循行部位的其他病证, 如上臂内侧痛, 肘臂挛麻, 腕痛, 掌中热等。

涉及考点 | 手厥阴经腧穴主治病证

8. 患者牙痛隐隐, 时作时止, 牙齿浮动, 口不臭, 脉细数。治疗除主穴外, 还应选取的配穴是

- | | |
|----------|----------|
| A. 外关、风池 | B. 二间、曲池 |
| C. 太冲、劳宫 | D. 内庭、二间 |
| E. 太溪、行间 | |

【答案】E

【解析】辨病是牙痛, 牙痛隐隐, 口不臭, 脉细数, 诊断为虚火牙痛, 阴虚应选用滋阴清热的输穴, 太溪滋阴, 行间清热。

涉及考点 | 牙痛的处方主穴

9. 位于外踝高点上 5 寸, 腓骨前缘的腧穴是

- | | |
|--------|--------|
| A. 足窍阴 | B. 足临泣 |
| C. 条口 | D. 光明 |
| E. 悬钟 | |

【答案】D

【解析】足窍阴位于第 4 趾外侧趾甲根角旁 0.1 寸。足临泣位于第 4 跖趾关节的后方, 足小趾伸肌腱的外侧。条口位于小腿前外侧, 当犊鼻穴下 8 寸, 距胫骨前缘 1 横指。光明位于外踝高点上 5 寸, 腓骨前缘。悬钟位于外踝高点上 3 寸, 腓骨前缘。

涉及考点 | 光明穴的定位

10. 治疗咽喉肿痛, 宜点刺出血的穴位是

- | | |
|-------|-------|
| A. 少商 | B. 鱼际 |
| C. 侠白 | D. 天府 |
| E. 列缺 | |

【答案】A

【解析】少商主治咽喉肿痛、鼻衄、高热等肺系实热证，癫狂、昏迷。宜浅刺，或点刺出血。鱼际主治咳嗽、咯血、咽干、咽喉肿痛失音等肺系病证，以及小儿疳积。宜直刺，小儿疳积可用割治法。侠白主治咳嗽、气短等肺系病证，以及干呕，上臂痛。宜直刺。天府主治咳嗽、气喘、鼻衄等肺系病证，以及瘰气，上臂痛。宜直刺。列缺主治咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病证以及头痛、齿痛等头部疾患。宜向上斜刺。

涉及考点 | 少商穴的操作方法

11. 臂外展或平举时，肩部出现两个凹陷，当肩峰前下方凹陷处的穴位是
- | | |
|--------|--------|
| A. 肩髃 | B. 肩贞 |
| C. 肩髃 | D. 肩中俞 |
| E. 肩外俞 | |

【答案】C

【解析】肩髃：在三角肌区，肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中。简便取穴法：屈臂外展，肩峰外侧缘呈现前后两个凹陷，前下方的凹陷即是本穴；主治：①肩臂挛痛、上肢不遂等肩、上肢病证。②瘾疹，瘰疬。

涉及考点 | 肩髃的定位

12. 听会穴归属于
- | | |
|-----------|----------|
| A. 足太阴脾经 | B. 足阳明胃经 |
| C. 足太阳膀胱经 | D. 足厥阴肝经 |
| E. 足少阳胆经 | |

【答案】E

【解析】听会穴是足少阳胆经的常用腧穴之一，位于耳屏切迹前，下颌骨髁状突的后缘，张口有凹陷处。主治耳鸣、耳聋等耳疾；齿痛，口眼歪斜，面痛。

涉及考点 | 听会穴的经络归属

13. 位于腕背横纹桡侧，当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中的穴位是
- | | |
|-------|-------|
| A. 太渊 | B. 神门 |
| C. 阳池 | D. 阳溪 |
| E. 养老 | |

【答案】D

【解析】阳溪位于腕背横纹桡侧，当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中；太渊位于腕掌侧横纹桡侧端，桡动脉搏动处；神门位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处；阳池位于腕背部横纹中，指伸肌腱的尺侧凹陷处；养老位于前臂背面尺侧，当尺骨小头近端桡侧凹缘中。

涉及考点 | 阳溪穴的定位

14. 患者，女，32岁。行经后小腹部绵绵作痛，喜按，月经色淡，量少。治疗应首选
- | | |
|---------------|---------------|
| A. 三阴交、中极、次髋 | B. 足三里、太冲、中极 |
| C. 丰隆、天枢、气穴 | D. 阴陵泉、中极、阳陵泉 |
| E. 三阴交、足三里、关元 | |

【答案】E

【解析】患者为痛经虚证，治疗应调补气血，温养冲任，取穴应以足太阴、足阳明经为主，主要选取三阴交、足三里、关元。关元为任脉穴，全身强筋要穴，可补益肝肾，温养冲任；足三里补

益气血;三阴交为肝脾肾三经之交会穴,可以健脾益气,调补肝肾。肝脾肾精血充盈,胞脉得养,冲任自调。若为实证,则选用三阴交、中极、次髎。

涉及考点 | 痛经的处方主穴

15. 章门穴位于

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A. 腹侧,腋中线第 8 肋骨端稍下处 | B. 腹侧,腋中线第 9 肋骨端稍下处 |
| C. 腹侧,腋中线第 10 肋骨端稍下处 | D. 腹侧,腋中线第 11 肋骨端稍下处 |
| E. 腹侧,腋中线第 12 肋骨端稍下处 | |

【答案】D

【解析】章门穴属足厥阴肝经,在侧腹部,第 11 肋游离端的下际。6、7 是肝(期门)胆(日月),11、12 是脾(章门)肾(京门)。

涉及考点 | 章门穴的定位

16. 落枕穴位于手背,第二、三掌骨间的

- | | |
|----------------|--------------|
| A. 指掌关节后 0.5 寸 | B. 指掌关节后 1 寸 |
| C. 指掌关节后 1.5 寸 | D. 指掌关节后 2 寸 |
| E. 指掌关节后 2.5 寸 | |

【答案】A

【解析】B、C、D、E 处均无十四经穴位。A 为外劳宫穴的定位,本穴治疗落枕病证有特效,又名落枕穴。

涉及考点 | 外劳宫的定位

17. 化脓灸所属的灸法是

- | | |
|--------|--------|
| A. 直接灸 | B. 间接灸 |
| C. 悬起灸 | D. 实按灸 |
| E. 天灸 | |

【答案】A

【解析】化脓灸属于瘢痕灸,直接灸包括瘢痕灸和无瘢痕灸。

涉及考点 | 艾炷灸

18. 治疗眩晕虚证,应选取

- | | |
|--------------------|-----------------|
| A. 风池、百会、内关、太冲 | B. 百会、行间、侠溪、太冲 |
| C. 风池、气海、脾俞、胃俞 | D. 风池、太溪、悬钟、三阴交 |
| E. 风池、百会、肝俞、肾俞、足三里 | |

【答案】E

涉及考点 | 眩晕的处方

【解析】眩晕虚证的治法为益气养血,填精定眩,以督脉穴及相应背俞穴为主。主穴为百会、风池、肝俞、肾俞、足三里。肝俞、肾俞滋补肝肾、益精填髓、固本培元;足三里补益气血;风池疏调头部气血,百会提升气血,二穴配合以充养脑髓而缓急治标。

46. 自肺开始叩诊肝脏相对浊音界时其叩诊音应是

- A. 由清音转为鼓音
- B. 由清音转为浊音
- C. 由清音转为实音
- D. 由过清音转为实音
- E. 由浊音变为实音

【答案】B

【解析】自肺开始叩诊肝脏浊音界,当由清音转为浊音时,即为肝上界。此处相当于被遮盖的肝顶部,故又称肝相对浊音界。而再向下叩1~2肋间,则浊音变为实音,此处的肝脏不再被肺所遮盖而直接贴近胸壁,称肝绝对浊音界。

涉及考点 | 腹部叩诊

47. 可见匙状甲的疾病是

- A. 支气管扩张症
- B. 发绀型先天性心脏病
- C. 肝硬化
- D. 支气管扩张
- E. 缺铁性贫血

【答案】E

【解析】匙状甲多见于缺铁性贫血,偶见于风湿热、甲癣等。发绀型先天性心脏病、支气管扩张、肝硬化、支气管扩张症可见杵状指。

涉及考点 | 四肢、关节检查

48. 下列各项,符合中枢性瘫痪表现特点的是

- A. 肌张力增高
- B. 肌萎缩明显
- C. 无病理反射
- D. 深反射减弱或消失
- E. 瘫痪范围较局限,以肌群为主

【答案】A

【解析】中枢性瘫痪范围较广,肌张力过高,有病理反射,肌萎缩不明显,深反射亢进;周围性瘫痪范围较局限,以肌群为主,肌张力过低或缺失,无病理反射,肌萎缩明显,深反射减弱或消失。

涉及考点 | 中枢性与周围性瘫痪的鉴别

2年 易错考题

1. 可引起全身性水肿的疾病是

- A. 静脉炎
- B. 丝虫病
- C. 甲状腺功能减退症
- D. 淋巴管炎
- E. 肿瘤压迫

【答案】C

【解析】全身性水肿:①心源性水肿,见于右心衰竭、慢性缩窄性心包炎等。②肾源性水肿,多由各种肾炎、肾病综合征等引起。③肝源性水肿,见于肝硬化、重症肝炎等;④营养不良性水肿,见于低蛋白血症和维生素A缺乏;⑤内分泌源性水肿,见于甲状腺功能减退症、垂体前叶功能减退症等黏液性水肿。A、B、D、E均可见局限性水肿。

涉及考点 | 水肿的病因

2. 出现泪滴形红细胞的疾病是

- A. 乙醇中毒
B. 骨髓纤维化
C. 血红蛋白 S 病
D. 自身免疫性溶血性贫血
E. 缺铁性贫血

【答案】B

【解析】选项 A 可见口形红细胞。选项 B 可见泪滴形红细胞。选项 C 可见镰形红细胞。选项 D 可见球形红细胞。选项 E 可见靶形红细胞。

涉及考点 | 红细胞形态异常

3. 患者,男性,55 岁。40 分钟前因情绪激动突发胸骨后闷痛,疼痛可向左臂放射,舌下含服硝酸甘油未见缓解。心电图检查存在室性心律失常。既往有冠心病病史。首先应考虑

- A. 心绞痛
B. 心肌梗死
C. 急性心功能不全
D. 干性胸膜炎
E. 肺梗死

【答案】B

【解析】本题考查的重点在于心绞痛及心肌梗死的鉴别,心绞痛与心肌梗死疼痛区域均位于胸骨后及心前区,均可由于情绪激动诱发,都能表现出疼痛放射。但心绞痛症状轻、时间短(3~5 min)、含服硝酸甘油有效;心肌梗死症状重,时间长(>30 min),硝酸甘油无效。而选项 C、D、E 其发作与情绪无明显关联,且症状均不相符。

涉及考点 | 心绞痛及心肌梗死

4. 下列不属于代谢性酸中毒原因的是

- A. 肾衰竭
B. 糖尿病酮症
C. 肺通气功能障碍
D. 摄入大量阿司匹林
E. 腹泻

【答案】C

【解析】代谢性酸中毒的原因包括:①酸性物质产生过多,如糖尿病酮症等。②肾脏排酸保碱功能障碍,如肾功能障碍、肾小管性酸中毒、肾上腺皮质功能低下(艾迪生病)等。③肾外失碱,如腹泻、肠漏等;④酸性药物摄入过多,如阿司匹林等;⑤稀释性酸中毒,如大量输入生理盐水。肺通气功能障碍属于呼吸性酸中毒。

涉及考点 | 代谢性酸中毒的病因

5. 下列各项,可出现脉压减小的是

- A. 主动脉瓣关闭不全
B. 甲状腺功能亢进症
C. 动脉导管未闭
D. 缩窄性心包炎
E. 严重贫血

【答案】D

【解析】脉压<30 mmHg 称为脉压减小,见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。A、B、C、E 均见于脉压增大。

涉及考点 | 血压变异的临床意义

6. 下列各项,出现开瓣音的是

- A. 二尖瓣脱垂
B. 二尖瓣狭窄
C. 主动脉瓣狭窄
D. 二尖瓣关闭不全

E. 主动脉瓣关闭不全

【答案】B

【解析】开瓣音(二尖瓣开放拍击音)见于二尖瓣狭窄而瓣膜弹性尚好时,是二尖瓣分离术适应证的重要参考条件,故开瓣音为二尖瓣狭窄病变时出现的病理性杂音,所以本题选B。

涉及考点 | 心音听诊

7. 主动脉瓣关闭不全的杂音是

- A. 舒张期隆隆样杂音
- C. 收缩期吹风样杂音
- E. 连续性机器样杂音

- B. 舒张期叹气样杂音
- D. 乐音样杂音

【答案】B

【解析】选项A可见于二尖瓣狭窄。选项B可见于主动脉瓣关闭不全。选项C可见于二尖瓣关闭不全。选项D可见于感染性心内膜炎及梅毒性主动脉瓣关闭不全。选项E可见于先天性心脏病动脉导管未闭。

涉及考点 | 心脏杂音的特征

8. 库瓦济埃征阳性可见于

- A. 胰头癌
- C. 急性肠炎
- E. 急性胆囊炎

- B. 急性阑尾炎
- D. 腹膜炎

【答案】A

【解析】胰头癌压迫胆总管导致阻塞,出现黄疸进行性加深,胆囊显著肿大,但无压痛,称为库瓦济埃征阳性。

涉及考点 | 腹内脏器触诊

9. 肌力分几级

- A. 7级
- C. 5级
- E. 3级

- B. 6级
- D. 4级

【答案】B

【解析】肌力分为6级,其中0级为全瘫,1~4级为不完全瘫痪(轻瘫),5级为正常肌力。

涉及考点 | 运动功能检查

10. 糖尿病病人糖化血红蛋白的控制范围是

- A. 10%~12%
- C. 5%~8%
- E. 2%~3%

- B. 8%~10%
- D. 4%~6%

【答案】D

【解析】血清糖化血红蛋白不受血糖浓度暂时波动的影响,是糖尿病诊断和监控的重要指标。其正常值为4%~6%。

涉及考点 | 糖类检查

11. 尿沉渣镜检每高倍视野多少个白细胞即视为异常

- A. >10个
- C. >5个

- B. >8个
- D. >3个

E. >1 个

【答案】C

【解析】尿沉渣镜检白细胞或脓细胞计数>5 个/HP,称镜下脓尿多为泌尿系统感染,见于肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎及肾结核等。

涉及考点 | 尿液显微镜检查

12. 心电图检查中代表心室除极、复极时间的是

A. S-T 段

B. T-P 段

C. QRS 波群

D. Q-T 间期

E. P-R 间期

【答案】D

【解析】选项 A 反映心室早期缓慢复极的电位和时间变化。选项 B 反映心室晚期快速复极到下一个心电活动开始的电位和时间变化。选项 C 反映左、右心室除极过程中的电位和时间变化。选项 D 反映左、右心室除极与复极全过程的时间。选项 E 反映电激动过程在房室交界区及其后的希氏束、室内传导系统所产生的微弱变化。

涉及考点 | 心电图各波段的意义

(13~14 题共用备选答案)

A. 十二指肠溃疡

B. 急性胰腺炎

C. 穿孔

D. 输尿管结石

E. 急性肠炎

13. 暴饮暴食后上腹疼痛,向左腰背放散,多见于

【答案】B

14. 腹痛,伴有腹泻,多见于

【答案】E

【解析】腹痛伴有腹泻多见于急性肠炎。胃穿孔腹痛剧烈难忍,多有慢性胃炎病史。输尿管结石出现剧烈下腹痛。急性胰腺炎多于暴饮暴食后出现上腹疼痛,向左腰背放散。十二指肠溃疡腹痛长期有规律。

涉及考点 | 腹痛的问诊要点

(15~16 题共用备选答案)

A. 肺结核

B. 支气管扩张症

C. 胸膜炎

D. 喉头水肿

E. 上呼吸道感染

15. 上述各项,常出现咳嗽、咯血伴低热、盗汗的是

【答案】A

16. 上述各项,常出现咳嗽、咯血伴大量脓痰的是

【答案】B

【解析】上呼吸道感染无咯血;胸膜炎咳嗽伴胸痛,无咯血;喉头水肿可见咳嗽伴呼吸困难,无咯血;支气管扩张症可见咳嗽、咯血伴大量脓痰;肺结核可见咳嗽、咯血伴低热、盗汗。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

(17~18 题共用备选答案)

A. 咳大量脓痰

B. 干咳无痰

- C. 咳铁锈色痰
D. 咯吐大量鲜血
E. 咳粉红色泡沫痰
17. 急性左心功能不全,常伴有

【答案】E

18. 肺炎链球菌肺炎,常伴有

【答案】C

【解析】急性左心功能不全表现为突发严重呼吸困难,强迫坐位,面色灰白,发绀,大汗,烦躁,同时频繁咳嗽,咳粉红色泡沫痰。肺炎链球菌肺炎起病多急骤,高热寒战,全身肌肉酸痛,患侧胸痛,痰少,可带血或呈铁锈色。所以 17 题选 E,18 题选 C。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

(19~20 题共用备选答案)

- A. 深昏迷
B. 浅昏迷
C. 嗜睡
D. 昏睡
E. 谵妄

19. 意识大部分丧失、强刺激也不能唤醒,角膜反射存在的是

【答案】B

20. 意识障碍伴错觉、幻觉、躁动不安、谵语的是

【答案】E

【解析】深昏迷表现为意识全部丧失,对疼痛等各种刺激均无反应,角膜反射消失。浅昏迷表现为意识大部分丧失、强刺激也不能唤醒,角膜反射存在。嗜睡表现为持续性睡眠,轻刺激可被唤醒,醒后能回答简单问题或做简单动作,刺激停止后迅速入睡。昏睡表现为熟睡状态,不易唤醒。谵妄表现为意识障碍伴错觉、幻觉、躁动不安、谵语。

涉及考点 | 意识障碍的临床表现

(21~22 题共用备选答案)

- A. 慢性病面容
B. 二尖瓣面容
C. 伤寒面容
D. 甲亢面容
E. 苦笑面容

21. 消瘦,两眼球突出,兴奋不安,呈惊恐貌,多见于

【答案】D

22. 两颧紫红,口唇发绀,多见于

【答案】B

【解析】苦笑面容见于破伤风;伤寒面容表情淡漠,反应迟钝,呈无欲状态,见于肠伤寒、脑脊髓膜炎、脑炎等高热衰竭患者;慢性病面容憔悴,面色晦暗或苍白无华,目光暗淡,见于慢性消耗性疾病,如恶性肿瘤、肝硬化、严重结核病等。

涉及考点 | 异常面容的特点

(23~24 题共用备选答案)

- A. 颈部淋巴结
B. 右锁骨上窝淋巴结
C. 腋下淋巴结
D. 左锁骨上窝淋巴结
E. 腹股沟淋巴结

23. 胃癌出现淋巴结转移常见的部位是

【答案】D

24. 肺癌出现淋巴结转移常见的部位是

【答案】B

【解析】胃癌常见左锁骨上窝淋巴结转移；肺癌常见右锁骨上窝淋巴结转移；肠癌、卵巢癌可见腹股沟淋巴结转移；头颈部肿瘤可见颈部淋巴结转移；乳腺癌可见腋下线淋巴结转移。

涉及考点 | 局部和全身浅表淋巴结肿大

25. 主动脉瓣关闭不全,多表现为

A. 奇脉

B. 颈静脉搏动

C. 交替脉

D. 水冲脉

E. 脉搏短绌

【答案】D

【解析】奇脉是指吸气时脉搏明显减弱或消失,系左心室搏血量减少所致,见于心脏压塞或心包缩窄。缩窄性心包炎一般心律正常,脉搏细速,有奇脉。颈静脉搏动可见于三尖瓣关闭不全等。交替脉是节律规则而强弱交替的脉搏,必要时嘱患者在呼气中期屏住呼吸,以排除呼吸变化所影响的可能性。常见于高血压性心脏病、急性心肌梗死和主动脉瓣关闭不全等。水冲脉表现为脉搏骤起骤落,犹如潮水涨落,是由于周围血管扩张或存在分流、反流所致。前者常见于甲状腺功能亢进、严重贫血、脚气病等,后者常见于主动脉瓣关闭不全、先天性心脏病动脉导管未闭、动静脉瘘等。主动脉瓣关闭不全时由于出现舒张压下降,脉压加大可出现水冲脉。脉搏短绌见于房颤。

涉及考点 | 血管检查

【解析】异烟肼与利福平合用对肝功有损害,应定期检查肝功能。

涉及考点 | 异烟肼与利福平合用的注意事项

69. 乙胺丁醇的主要不良反应

- | | |
|----------|-----------|
| A. 结晶尿 | B. 球后视神经炎 |
| C. 周围神经炎 | D. 肝脏损害 |
| E. 耳毒性 | |

【答案】B

【解析】乙胺丁醇的不良反应有视神经损伤、末梢神经炎、过敏反应、胃肠道反应和高尿酸血症。

涉及考点 | 乙胺丁醇的不良反应用

2年 易错考题

1. 患者,男,58岁。高血压病史20年,近1年常心慌,气短,昨夜睡眠中突然憋醒,胸痛,咳嗽,气喘,急诊入院,经检查诊断为急性肺水肿,左心衰竭。治疗应选用

- | | |
|---------|-----------|
| A. 肾上腺素 | B. 异丙肾上腺素 |
| C. 山莨菪碱 | D. 吗啡 |
| E. 以上均非 | |

【答案】D

【解析】吗啡能抑制大脑呼吸中枢和咳嗽中枢的活动,使呼吸减慢并产生镇咳作用。肾上腺素用于心脏骤停、支气管哮喘、过敏性休克,也可治疗荨麻疹、花粉症及鼻黏膜或齿龈出血。异丙肾上腺素治疗支气管哮喘、心源性或感染性休克、完全性房室传导阻滞、心搏骤停。山莨菪碱用于感染中毒性休克、血管性疾患、各种神经痛等。

涉及考点 | 吗啡的应用

2. 患者,男,26岁。先天性心脏病致心力衰竭,应用强心苷疗效不显著。可试换用的药物是

- | | |
|-----------|---------|
| A. 氯化钙 | B. 阿托品 |
| C. 卡托普利 | D. 肾上腺素 |
| E. 异丙肾上腺素 | |

【答案】C

【解析】卡托普利利用与肾素-血管紧张-醛固酮系统(RAA系统),一直RAA系统的血管紧张转化酶(ACE)阻止血管紧张I转换成血管紧张素II,并能抑制醛固酮分泌,减少水钠潴留。对多种类型高血压均有明显降压作用,并能改善充血性心力衰竭患者的心脏功能。

涉及考点 | 卡托普利的应用

3. 患者,男,48岁。十二指肠溃疡病史20年,近感头痛,眩晕而就诊。检查:血压160/100 mmHg(21/13 kPa)。下列降压药应慎用的是

- | | |
|---------|---------|
| A. 可乐定 | B. 利血平 |
| C. 胍屈嗪 | D. 氢氯噻嗪 |
| E. 卡托普利 | |

【答案】B

【解析】利血平的降压作用主要通过减少心输出量和降低外周阻力、部分抑制心血管反射

实现。但其不良反应有胃酸分泌增多、胃肠运动亢进等,这与副交感神经功能占优势有关,患者既往有十二指肠溃疡,故不选利血平。

涉及考点 | 利血平的应用

4. 患者,女,60岁。因全身关节疼痛,长期服用某药,昨日出现自发性骨折,导致该不良反应的药物是

- A. 泼尼松
- B. 阿司匹
- C. 消炎痛
- D. 保泰松
- E. 布洛芬

【答案】A

【解析】长期大量服用泼尼松可引起柯兴征,诱发神经精神症状和消化系统溃疡、骨质疏松、生长发育受抑制、并发和加重感染。阿司匹林有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等不良反应。消炎痛会引起口周、舌和四肢麻木,突然心慌、头痛恶心、语言不利、全身颤动、不能自控,甚至晕倒。保泰松有恶心、呕吐、腹痛、便秘等不良反应。布洛芬的不良反应为肠、胃部不适或皮疹、头痛、耳鸣。

涉及考点 | 泼尼松的不良反应

5. 患者,男,21岁。呼吸困难,咳嗽,汗出1小时而就诊。查体:端坐呼吸,呼吸急促,口唇微绀,心率114次/分,律齐,双肺满布哮鸣音。为迅速缓解症状,应立即采取的最佳治法是

- A. 口服氨茶碱
- B. 肌注氨茶碱
- C. 喷吸沙丁胺醇
- D. 口服泼尼松
- E. 肌注阿托品

【答案】C

【解析】沙丁胺醇为选择性 β_2 受体激动剂,能选择性激动支气管平滑肌的 β_2 受体,有较强的支气管扩张作用。对于哮喘患者,其支气管扩张作用至少与异丙肾上腺素相等。

涉及考点 | 沙丁胺醇的应用

6. 患者,女,45岁。因急腹症入院,诊断为化脓性胆囊炎穿孔并发绿脓杆菌性腹膜炎。既往有青霉素过敏史。抗感染治疗应选用

- A. 羟苄青霉素
- B. 头孢氨苄
- C. 红霉素
- D. 氯林可霉素
- E. 环丙沙星

【答案】E

【解析】环丙沙星主要用于敏感菌所致的呼吸道、泌尿系、消化道、皮肤软组织的感染及胆囊炎、胆管炎、中耳炎、副鼻窦炎、淋球菌性尿道炎等。

涉及考点 | 环丙沙星的应用

7. 患者,女,30岁。患系统性红斑狼疮,长期大量服用糖皮质激素治疗。其不良反应是

- A. 血糖降低
- B. 血压降低
- C. 红细胞数目减少
- D. 淋巴细胞增多
- E. 体内脂肪重新分布

【答案】E

【解析】长期大量使用糖皮质激素易出现皮质功能亢进综合征(体脂重新分布的满月脸、水牛背),诱发或加重感染(白细胞减少),诱发或加重溃疡病,诱发高血糖、高血压和动脉硬化、骨质疏松、肌肉萎缩、伤口愈合延缓,诱发精神病和癫痫。

涉及考点 | 糖皮质激素的不良反应

(8~9 题共用备选答案)

- A. 副作用
B. 毒性反应
C. 过敏反应
D. 耐受性
E. 成瘾性
8. 巴比妥类药物引起皮疹、发热,属于

【答案】C

9. 巴比妥类药物引起呼吸抑制,属于

【答案】B

【解析】毒性反应是由化学物质与生物系统的化学成分进行可逆或不可逆的相互作用,而干扰机体正常代谢及自稳机制,以致引起细胞死亡、细胞氧化、突变、恶性变、变态反应或炎症反应,主要是一个分子过程。过敏反应是指已免疫的机体再次接受相同物质的刺激时所发生的反应,反应的特点是发作迅速、反应强烈、消退较快,一般不会破坏组织细胞,也不会引起组织损伤,有明显的遗传倾向和个体差异。所以巴比妥类药物引起皮疹、发热,属于过敏反应;引起呼吸抑制,属于毒性反应。

涉及考点 | 药物不良反应的定义

(10~11 题共用备选答案)

- A. 耐受性
B. 成瘾性
C. 反跳现象
D. 戒断症状
E. 急性中毒
10. 长期应用地西洋须加大量才产生原有的催眠效果,这是产生了

【答案】A

11. 连续久服地西洋突然停药出现的焦虑、激动、震颤等症状称之为

【答案】D

【解析】耐受性是指人体对药物反应性降低的一种状态,按其性质有先天性和后天获得性之分。戒断症状指停止使用药物或减少使用剂量或使用拮抗剂占据受体后所出现的特殊心理生理症状群,表现为兴奋、失眠、流泪、流涕、出汗、震颤、呕吐、腹泻,甚至虚脱、意识丧失等。

涉及考点 | 药物不良反应的应用

(12~13 题共用备选答案)

- A. 青光眼
B. 阵发性室上性心动过速
C. 有机磷酸酯类中毒
D. 琥珀胆碱过量中毒
E. 房室传导阻滞
12. 毛果芸香碱可治疗

【答案】A

13. 新斯的明可治疗

【答案】B

【解析】毛果芸香碱主要用于青光眼、虹膜睫状体炎。新斯的明的临床用途是重症肌无力、术后腹气胀和尿潴留、阵发性室上性心动过速、非去极化型肌松药的解救。

涉及考点 | 毛果芸香碱、新斯的明的应用

(14~15 题共用备选答案)

- A. 阿托品
B. 托吡卡胺

- C. 普鲁苯辛
E. 东莨菪碱

14. 治疗晕动病,应选用

【答案】E

15. 治疗感染性休克,应选用

【答案】D

【解析】山莨菪碱用于治疗感染性休克、血管性疾患、各种神经痛、平滑肌痉挛、眩晕病、眼底疾患、突发性耳聋。东莨菪碱用于晕动病、麻醉前给药、中药麻醉、帕金森病。

涉及考点 | 山莨菪碱与东莨菪碱的应用

(16~18 题共用备选答案)

- A. 酚妥拉明
B. 异丙肾上腺素
C. 酚苄明
D. 普萘洛尔
E. 噻吗洛尔

16. 用于去甲肾上腺素静脉滴注外漏时的药物是

【答案】A

17. 控制支气管哮喘急性发作的药物是

【答案】B

18. 用于治疗 II 级高血压伴有冠心病的药物是

【答案】D

【解析】①酚妥拉明具有扩张外周局部小血管的作用,正好可以对抗去甲肾上腺素的收缩血管作用。②异丙肾上腺素主要激动 β 受体,对 α 受体几乎无作用,其可通过激活支气管中的 β_2 受体,发挥扩张支气管的作用。③普萘洛尔是 α 受体阻断药,可以适用于 I、II 级高血压,对伴有心输出量偏高或血浆肾素活性增高者以及伴有冠心病、脑血管病变者更适宜。

涉及考点 | 酚妥拉明、异丙肾上腺素、普萘洛尔的应用



配套名师高清视频

(19~21 题共用备选答案)

- A. 肾上腺素
B. 去甲肾上腺素
C. 异丙肾上腺素
D. 多巴胺
E. 麻黄碱

19. 加入局麻药液中可延长局麻药作用时间的药物是

【答案】A

20. 中毒性休克伴有少尿的首选药是

【答案】D

21. 上消化道出血止血可选用的药物是

【答案】B

【解析】肾上腺素加入局麻药液中可延长其作用时间。中毒性休克伴有少尿治疗首选多巴胺。上消化道出血止血可选用去甲肾上腺素。

涉及考点 | 肾上腺素、多巴胺、去甲肾上腺素的应用

(22~23 题共用备选答案)

- A. 诱发或加重支气管哮喘
B. 诱发或加重溃疡病
C. 便秘
D. 凝血障碍
E. 锥体外系症状

22. 吗啡和阿司匹林共有的不良反应是

【答案】A

23. 吗啡和阿司匹林均不具有的反应是

【答案】E

【解析】吗啡的不良反应：①呼吸抑制。②胃肠道症状。③尿潴留。④成瘾。阿司匹林的不良反应：①过敏反应。②上腹不适、恶心、食欲不振。③上消化道出血。④皮肤出血点；⑤对外科手术的影响；⑥诱发“阿司匹林哮喘”。

涉及考点 | 吗啡和阿司匹林的不良反应

(24~25 题共用备选答案)

A. 治疗神经官能症的药物

B. 治疗精神分裂症的药物

C. 治疗帕金森的药物

D. 治疗抑郁症的药物

E. 治疗焦虑症的药物

24. 氯丙嗪

【答案】B

25. 丙咪嗪

【答案】D

【解析】氯丙嗪为中枢多巴胺受体阻断剂，用于精神分裂症的躁狂症状。丙咪嗪为三环类抗抑郁药之一，起效缓慢，一般需连续服用 2~3 周才能显效，适用于用于内源性抑郁症，伴有躁狂状态的抑郁症。

涉及考点 | 氯丙嗪与丙咪嗪的应用

(26~28 题共用备选答案)

A. 呋喃唑酮

B. 甲氧苄啶

C. 氧氟沙星

D. 磺胺嘧啶

E. 甲硝唑

26. 能引起儿童软骨发育不良的药物是

【答案】C

27. 服用后应多喝水，防止尿内结晶形成的药物是

【答案】D

28. 能增强磺胺类药物抗菌作用的药物是

【答案】B

【解析】氧氟沙星为氟喹诺酮类抗菌药物，不良反应有软骨损害，可引起儿童软骨发育不良。磺胺嘧啶易形成尿结晶。甲氧苄啶辅助增强磺胺类药物抗菌的作用。

涉及考点 | 各种抗生素的药理作用

(29~30 题共用备选答案)

A. 青霉素 G

B. 头孢氨苄

C. 林可霉素

D. 链霉素

E. 四环素

29. 治疗败血症，应选用

【答案】C

30. 治疗结核病，应选用

【答案】D

【解析】四环素为广谱抗生素,对多数立克次体属敏感,立克次体病包括流行性斑疹伤寒等。青霉素 G 对大多数革兰阳性球菌、杆菌有效。头孢氨苄用于敏感菌所致的呼吸道感染、泌尿系统感染、妇产科感染、皮肤及软组织感染、淋病等。林可霉素用于葡萄球菌、链球菌、肺炎链球菌引起的呼吸道感染、骨髓炎、关节和软组织感染、胆道感染及败血症。链霉素可杀灭或者抑制结核杆菌生长的作用。

涉及考点 | 林可霉素与链霉素的应用

金英杰医学教育

兰阴性杆菌活性高,细菌对其产生突发耐药的发生率低,体内分布广,组织体液中药物浓度高,可达有效抑菌或杀菌水平,大多品种系口服制剂。目前常用的该类药物有氧氟沙星、环丙沙星和依诺沙星等。

涉及考点 | 伤寒的治疗

50. 细菌性痢疾的主要预防措施是

- A. 隔离及治疗现症患者
- B. 流行季节预防服药
- C. 及时发现、治疗带菌者
- D. 口服痢疾活菌苗
- E. 切断传播途径

【答案】E

【解析】切断传播途径是控制细菌性疾病的重要措施。从事餐饮、维修、水务等工作的人员,需要长期跟踪,必要时临时离职。注意饮水、粪便和饮食,排除苍蝇,养成饭前和大便后洗手的习惯。

涉及考点 | 细菌性痢疾的预防

2年 易错考题

1. 潜伏期是指

- A. 自病原体侵入机体至典型症状出现
- B. 自病原体侵入机体至排出体外
- C. 自病原体侵入机体至临床症状开始出现
- D. 自接触传染源至患者开始出现症状
- E. 自接触传染源至典型症状出现

【答案】C

【解析】指从病原体侵入机体至出现临床症状前的一段时间。各种传染病的潜伏期不同,数小时、数天、数月甚至数年不等。

涉及考点 | 潜伏期的概念

2. 下列关于慢性重型肝炎临床表现的叙述,不正确的是

- A. 蜘蛛痣
- B. 颅内出血
- C. 腹腔积液
- D. 脾脏肿大
- E. 肝掌

【答案】B

【解析】慢性重型肝炎有明显或持续的肝炎症状,伴肝病面容、肝掌、蜘蛛痣、脾大,ALT和(或)AST反复或持续升高,白蛋白降低、丙种球蛋白明显升高。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

3. HIV 中要侵犯的靶细胞是

- A. CD38 细胞
- B. CD4 细胞
- C. CD8 细胞
- D. CD3 细胞
- E. CD27 细胞

【答案】B

【解析】HIV 主要侵犯人体免疫系统,包括 CD4 细胞、巨噬细胞和树突状细胞,主要表现为 CD4 淋巴细胞数量不断减少,导致免疫功能缺陷。

涉及考点 | 艾滋病的发病机制

4. 下列各项, 艾滋病早期诊断的临床表现中不包含

- A. 腹泻
- B. 体重减轻
- C. 盗汗
- D. 便血
- E. 发热

【答案】D

【解析】艾滋病临床表现以发热最为常见, 可伴盗汗、腹泻和体重减轻, 无便血。

涉及考点 | 艾滋病的临床表现

5. 艾滋病可出现持续全身淋巴结肿大的时期是

- A. 任何病期
- B. 艾滋病期
- C. 无症状感染期
- D. 恢复期
- E. 急性 HIV 感染期

【答案】B

【解析】艾滋病期临床表现为持续 1 个月以上的发热、盗汗、腹泻、体重减轻 10% 以上, 部分患者表现精神症状, 还可出现持续性全身淋巴结肿大。

涉及考点 | 艾滋病的临床表现

6. 可经母婴途径传播的疾病是

- A. 伤寒
- B. 艾滋病
- C. 霍乱
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 细菌性痢疾

【答案】B

【解析】细菌性痢疾主要通过“粪-口”传播, 传播途径包括: 接触传播、食物媒介传播、水媒传播、蝇媒传播; 流行性脑脊髓膜炎主要传播途径为病原菌借咳嗽、喷嚏、说话等飞沫直接从空气中传播; 霍乱、伤寒主要传播途径是通过水、食物、日常生活接触和苍蝇传播; 艾滋病传播方式主要有性触摸传播, 血液传播, 母婴传播。

涉及考点 | 细菌性痢疾、流行性脑脊髓膜炎、霍乱、艾滋病、伤寒的传播途径

7. 乙型脑炎(简称乙脑)的主要传染源是

- A. 蚊虫
- B. 乙脑病毒携带者
- C. 乙脑患者
- D. 猪
- E. 野鼠

【答案】D

【解析】流行性乙型脑炎主要分布在亚洲远东和东南亚地区, 经蚊传播, 多见于夏秋季, 临床上急起发病, 有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等, 重型患者病后往往留有后遗症。猪是本病主要传染源, 蚊虫叮咬是主要传播途径。野鼠是流行性出血热的传染源。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的流行病学

8. 中毒型菌痢区别于流行性乙型脑炎最主要的是

- A. 起病急
- B. 粪便镜检可见大量脓、白细胞
- C. 10 岁以下儿童发病率高
- D. 高热、抽搐、昏迷
- E. 多见于春、夏季

【答案】B

【解析】乙脑与中毒型菌痢均多见于夏、秋季, 且 10 岁以下儿童发病率较高。中毒型菌痢

起病较乙脑更急,常于发病 24 h 内出现高热、抽搐、昏迷等,一般无脑膜刺激征,脑脊液多正常,粪便镜检可见大量脓、白细胞,中毒型菌痢与流行性乙型脑炎最主要区别为粪便镜检可见大量脓、白细胞。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的鉴别诊断

9. 流行性脑脊髓膜炎的病原菌是

- A. 抗酸杆菌
- B. 革兰氏阴性杆菌
- C. 革兰氏阴性弧菌
- D. 革兰氏阳性球菌
- E. 革兰氏阴性球菌

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。病原学为脑膜炎双球菌,属奈瑟菌属,革兰氏染色阴性。临床表现为发热,头痛,呕吐,皮肤黏膜瘀点、瘀斑及颈项强直等脑膜刺激征。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的病原学

10. 流行性脑脊髓膜炎常见的皮疹是

- A. 单纯疱疹
- B. 玫瑰色斑丘疹
- C. 坏疽
- D. 脓疱疹
- E. 淤点、淤斑

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎败血症期出现皮肤黏膜瘀点、瘀斑,初呈鲜红色,迅速增多,扩大。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的临床表现

11. 下列各项,不支持流行性脑脊髓膜炎诊断的脑脊液检查是

- A. 氯化物含量减少
- B. 蛋白质含量高
- C. 糖含量明显减少
- D. 细胞计数 $<0.5 \times 10^9/L$,以单个核细胞为主
- E. 外观混浊呈脓性

【答案】D

【解析】蛋白质含量增高,糖及氯化物含量均减少,排除 A、B、C。脑脊液检查是流脑明确诊断的重要依据。发病过程中,脑脊液压力升高,外观浑浊呈脓性,排除 E。白细胞计数常高达 $20 \times 10^9/L$,以中性粒细胞为主。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的实验室检查

12. 下列关于人感染高致病性禽流感的叙述,不正确的是

- A. 传染源主要为病禽
- B. 暴发流行多在秋季
- C. 夏季发病少
- D. 人类普遍缺乏免疫力
- E. 传播途径主要经呼吸道

【答案】B

【解析】禽流感一年四季均可发生,冬、春季节多暴发流行,夏季发病较少,多呈散发,症状也较轻。

涉及考点 | 高致病性禽流感流行病学

13. 伤寒的主要病变部位在

- A. 乙状结肠
- B. 小肠上段
- C. 直肠
- D. 小肠下段

E. 十二指肠

【答案】D

【解析】伤寒的主要病理特征是全身网状内皮系统的增生反应,以回肠(小肠分为空肠与回肠,空肠位于小肠上半段,回肠位于小肠下半段)下段淋巴组织的病变最为显著。

涉及考点 | 伤寒的病理

14. 伤寒最严重的并发症是

A. 急性胆囊炎

B. 中毒性心肌炎

C. 肠出血

D. 中毒性肝炎

E. 肠穿孔

【答案】E

【解析】肠穿孔是伤寒最严重的并发症,多见于病程第 2~3 周。多发生于回肠末端,表现为右下腹剧痛,伴有恶心、呕吐、冷汗、呼吸急促、体温与血压下降,经 1~2 小时腹痛及其他症状暂时缓解,不久体温又迅速上升并出现腹膜炎征象,表现为腹胀、腹痛、腹壁紧张,压痛和反跳痛,肠鸣音减弱,白细胞计数增高伴核左移。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

15. 肠穿孔是伤寒最严重的并发症,多发于

A. 空肠末端

B. 直肠末端

C. 回肠末端

D. 横结肠末端

E. 乙状结肠末端

【答案】C

【解析】肠穿孔为伤寒最严重并发症,常发生于病程第 2~3 周,穿孔部位多发生在回肠末端,成人比小儿多见。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

16. 伤寒最具诊断价值的是

A. 肥达反应阴性

B. 白细胞计数减少或正常

C. 仅有“H”抗体效价增高,而“O”抗体效价不高

D. 只有“O”抗体效价的升高

E. “O”效价 $\geq 1:80$,“H”效价 $\geq 1:160$

【答案】E

【解析】肥达试验阳性有辅助诊断意义;“O”效价 $\geq 1:80$,“H”效价 $\geq 1:160$,或“O”抗体效价有 4 倍以上的升高,才有辅助诊断意义;“O”抗体升高只能支持沙门菌感染,不能区分伤寒或副伤寒;单独出现“H”抗体升高,对伤寒的诊断帮助不大;白细胞计数不可诊断伤寒。

涉及考点 | 伤寒的诊断

17. 细菌性痢疾慢性期 X 线钡灌肠可见的肠道变

A. 肠道动力增强

B. 肠道痉挛,结肠袋出现

C. 肠道痉挛,结肠袋消失

D. 肠黏膜变薄

E. 肠腔增宽

【答案】C

【解析】慢性菌痢 X 线钡剂可见肠道痉挛,动力改变,结肠袋消失,肠腔狭窄,肠黏膜增厚,

肠动力减弱。

涉及考点 | 细菌性痢疾的临床表现

18. 根据禽流感病毒的致病性, 禽流感病毒可分为

- A. 高致病性、中致病性、低致病性
- B. 高致病性、中致病性、低致病性、非致病性
- C. 高致病性、低致病性、非致病性
- D. 高致病性、低致病性
- E. 有致病性、无致病性

【答案】C

【解析】根据禽流感病毒的致病性, 禽流感病毒可分为高致病性、低致病性、非致病性三大类。

涉及考点 | 禽流感病毒的分型

19. 霍乱重型患者补液量为

- A. >15 000 mL/d
- B. 8 000~12 000 mL/d
- C. 4 000~8 000 mL/d
- D. 3 000~4 000 mL/d
- E. <3 000 mL/d

【答案】B

【解析】补液量应根据失水程度决定, 轻型脱水者 3 000~4 000 mL/d, 中型脱水者 4 000~8 000 mL/d, 重型脱水者 8 000~12 000 mL/d。

涉及考点 | 霍乱的治疗

20. 下列关于流行性乙型脑炎临床分型的叙述, 正确的是

- A. 不典型、典型、暴发型
- B. 轻型、普通型、危重型
- C. 轻型、中型、重型
- D. 轻型、普通型、重型、极重型
- E. 不典型、典型、重型

【答案】D

【解析】流行性乙型脑炎临床分型: 轻型、普通型、重型、极重型, 流行期间以轻型和普通型患者多见。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的临床表现

(21~22 题共用备选答案)

- A. 出血性炎
- B. 增生性炎
- C. 化脓性炎
- D. 变质性炎
- E. 假膜性炎

21. 流行性脑脊髓膜炎, 病理变化为

【答案】C

22. 流行性乙型脑炎, 其病理变化为

【答案】D

【解析】选项 A 是渗出性炎症的一个类型, 因炎症灶的血管损伤严重, 致使渗出物中含大量红细胞, 常见于流行性出血热、钩端螺旋体病和鼠疫等易发生于黏膜、浆膜和肺组织。发生于黏膜者渗出的纤维蛋白原形成的纤维素、坏死组织和中性粒细胞共同形成假膜, 又称假膜性炎, 见于白喉。选项 B 的病变特点: ①浸润的细胞主要是淋巴细胞、浆细胞和单核细胞。②局

部组织破坏主要是由炎细胞引起。③常有较明显的结缔组织、血管和上皮细胞、腺体等实质细胞的增生,在黏膜可形成息肉,在肺常形成炎性假瘤,在管道性脏器可引起狭窄和梗阻。选项 C 为流行性脑脊髓膜炎的病理变化。选项 D 为流行性乙型脑炎的病理改变。所以 21 题选 C, 22 题选 D。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎的病理

23. 感染 HIV 后,临床无明显症状,但血中可检出病毒及抗体,此期的持续时间一般是

- A. 12~15 年
- B. 6~8 年
- C. 4~5 年
- D. 1~2 年
- E. 3~4 年

【答案】B

【解析】艾滋病无症状感染期:所有的 HIV 感染者均有这一期。此期病毒处于低水平复制状态,患者无任何临床症状,但血清中可检出病毒及抗体,有传染性,可持续 2~10 年或更久。

涉及考点 | 艾滋病无症状感染期

24. 肺结核患者的哪种标本传染性最强

- A. 痰液
- B. 血液
- C. 尿液
- D. 汗液
- E. 泪液

【答案】A

【解析】肺结核患者,即常说的痰菌阳性的肺结核。它主要是经过飞沫传播的,即痰菌阳性的肺结核患者在说话、咳嗽、打喷嚏的时候,其空气飞沫中会含有大量的结核杆菌,被正常人群所吸入导致的感染。

涉及考点 | 肺结核的传播途径

25. 下列有关狂犬病毒的叙述,正确的是

- A. 属弹状病毒科
- B. DNA 病毒
- C. 野毒株毒力弱
- D. 固定株毒力强
- E. 60℃ 10 分钟可灭活

【答案】A

【解析】狂犬病毒属于弹状病毒科、狂犬病毒属,外形呈弹状,呈螺旋对称,表面具有包膜。

涉及考点 | 狂犬病的病原学

【解析】医学辅助检查是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。但所有的方法都有其适用范围,并非是诊断所必需的主要的依赖条件,对疾病的诊断还是需要结合疾病的特点。

涉及考点 | 辅助检查的道德要求

2年 易错考题

1. 对无伤原则的解释,正确的是
- A. 对肿瘤患者进行化疗意味着绝对伤害
 - B. 无伤原则就是要求医生对患者丝毫不能伤害
 - C. 无伤原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡,把可控伤害控制在最低限度之内
 - D. 因绝大多数医疗行为都存在着不同程度的伤害,所以无伤原则是做不到的
 - E. 无伤原则就是消除任何医疗伤害

【答案】C

【解析】无伤原则是指在医疗活动中,应该避免对患者的任何身心伤害。从严格意义上讲,无伤害是相对而言的,医疗过程也是一把双刃剑,几乎所有的诊疗措施或治疗手段都有两面性,都难以避免对患者的身心造成不同程度的损伤。这里所说的无伤是医务人员面对患者的治疗要时刻谨记的是考虑以最小的损伤为代价去获取最好的治疗效果。

涉及考点 | 无伤原则

2. 生命价值论指的是
- A. 生命神圣与人道论的统一
 - B. 生命神圣与生命质量的统一
 - C. 美德论与义务论的统一
 - D. 生命质量与生命价值论的统一
 - E. 义务论与公益论的统一

【答案】B

【解析】生命价值论最突出的一点就在于它能够将生命的内在价值(生命神圣论)和外在此价值(生命质量论)统一起来。并以此来评价生命的价值。

涉及考点 | 生命价值论

(21~22 题共用备选答案)

- A. 承担责任范围内的传染病监测管理工作
- B. 对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚
- C. 对甲类传染病疫区实施封锁管理
- D. 在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
- E. 承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作

21. 各级各类卫生防疫机构按照专业分工应

【答案】A

22. 各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应

【答案】E

【解析】《传染病防治法实施办法》第四条规定,各级各类卫生防疫机构按照专业分工承担传染病监测管理的责任和范围,由省级政府卫生行政部门确定。第十三条规定,各级各类医疗保健机构的预防保健组织或者人员,在本单位及责任地段内承担下列工作:①传染病疫情报告和管理。②传染病预防和控制工作。③卫生行政部门指定的卫生防治机构交付的传染病防治和监测任务。所以 21 题选 A,22 题选 E。

涉及考点 | 各级医疗机构在传染病预防控制中的职责

(23~24 题共用备选答案)

- A. 非处方用药
- B. 保健药品
- C. 假药
- D. 劣药
- E. 特殊药品

23. 药品所含成分的名称与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

【答案】C

24. 药品成分的含量与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

【答案】D

【解析】按照《药品管理法》规定,药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的,以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的为假药。药品成分的含量不符合国家药品标准的,为劣药。所以 23 题选 C,24 题选 D。

涉及考点 | 禁止生产、销售假药、劣药

2年 易错考题

1. 下列各项,属于行政处罚的是

- A. 降级
- B. 赔礼道歉
- C. 罚款
- D. 赔偿损失
- E. 撤职

【答案】C

【解析】行政处罚的种类:①警告。②罚款。③没收违法所得。④没收非法财物。⑤责令停产、停业整顿。⑥暂扣或者吊销执照有关许可证等。

涉及考点 | 卫生行政处罚的种类

2. 依照《麻醉药品管理办法》的规定,麻醉药品的处方剂量,每张处方注射剂不得超过多少日的常用量

- A. 14 日
B. 7 日
C. 5 日
D. 3 日
E. 2 日

【答案】E

【解析】对麻醉药品的规定,①对普通患者:每张处方最大量注射剂不得超过2日常用量,片剂、酞剂、糖浆剂等不得超过3日常用量。②对领有麻醉药品专用卡患者:每张处方最大量注射剂不得超过3日用量,片剂、酞剂、糖浆剂等不得超过7日用量,控释缓释剂不得超过15日用量。

涉及考点 | 麻醉药品管理的相关规定

3. 除特殊需要外,第一类精神药品的处方,每次不得超过多少日的常用量

- A. 14 日
B. 7 日
C. 5 日
D. 3 日
E. 1 日

【答案】D

【解析】《处方管理办法》第二十三条规定,为门(急)诊患者开具的第一类精神药品注射剂,每张处方为1次常用量;控缓释制剂,每张处方不得超过7日常用量;其他剂型,每张处方不得超过3日常用量。哌甲酯用于治疗儿童多动症时,每张处方不得超过15日常用量。

涉及考点 | 精神药品管理的相关规定

4. 为保证儿童及时接受预防接种,医疗机构与儿童的监护人员应当

- A. 先由监护人提出
B. 相互配合
C. 先由医疗机构提出
D. 订立合同
E. 共同协商

【答案】B

【解析】《传染病防治法》第十五条规定,国家对儿童实行预防接种证制度。国家免疫规划项目的预防接种实行免费。医疗机构、疾病预防控制机构与儿童的监护人应当相互配合,保证儿童及时接受预防接种。具体办法由国务院制定。

涉及考点 | 国家建立传染病预防的相关制度

(5~6 题共用备选答案)

- A. 6 个月以上 1 年以下
B. 1 个月以上 6 个月以下
C. 3 个月以上 6 个月以下
D. 1 年以上 3 年以下
E. 3 个月以上 6 个月以下

5. 医疗机构擅改、伪造、隐匿、毁灭病历资料的,对有关医务人员责令暂停执业活动

【答案】A

6. 医务人员未按照规定告知患者病情、医疗措施、医疗风险等,情节严重的,对有关医务人员可以责令暂停执业活动

【答案】B

【解析】医疗机构擅改、伪造、隐匿、毁灭病历资料的,对有关医务人员责令暂停执业活动6个月以上1年以下,对直接负责的主管人员和其他直接负责人员,由县级以上人民政府卫生主

管部门给予或者责令给予降低等级或者降职的处分。医务人员未按照规定告知患者病情、医疗措施、医疗风险等,情节严重的,对有关医务人员可以责令暂停执业活动 1 个月以上 6 个月以下。

涉及考点 | 医疗机构的法律责任

金英杰医学教育